

Mat-alkmat szak, első évfolyam, első félév

RÉSZLETES VIZSGATEMATIKA (1993 ÓSZE)

A vizsga anyaga az, ami az előadáson, és részben a gyakorlaton elhangzott. A tanuláshoz hasznosak a gyakorlatokon szerepelt feladatsorok is! A klasszikus algebrai részből a kiosztott Hermann-Kiss jegyzet (<http://www.cs.elte.hu/~ewkiss/bboard/algebrabook/>) szellemében is és tartalmában is szorosan kapcsolódik az előadáshoz. Lineáris algebrából Freud Róbert: *Lineáris algebra* (egyetemi tankönyv) a leginkább ajánlott segédanyag, mert ez elemi szinten tárgyalja a fogalmakat, és bőséges példaanyaggal rendelkezik. Az alábbi tematikában az L betű a Freud-könyvre, minden más hivatkozás a Hermann-Kiss jegyzetre utal. Az NB jelentése: a bizonyítást nem kell tudni.

Az anyagot a gyakorlaton, az ottani feladatok segítségével kell megérteni, és utána sokszor át kell venni! Először a legegyszerűbb módon, a legkonkrétabb esetekben értsük meg a fogalmakat, számolásokat. A későbbi ismétlések során egyre magasabbról láthatjuk az állításokat, egyre mélyebb összefüggéseket fedezhetünk fel. Például a polinomokra, mátrixokra, determinánsokra vonatkozó tételeket először konkrét testek (\mathbb{C} , \mathbb{R} , \mathbb{Q}) fölött gondoljuk végig. Ha egy absztrakt fogalmat akarunk megérteni, akkor előbb konkrét eseteket vizsgáljunk (például a determináns képletét $n = 3$ -ra, és valós fölött).

Az anyagban számos rutinbizonyítás van (például: a polinomok gyűrűt alkotnak, vagy: a determináns mindegyik oszlopában összegtartó). Ezeket nem célszerű külön-külön megtanulni, hanem *az ilyen bizonyítások kitalálásának a módszerét kell elsajátítani*. Általában mindössze azt kell tenni, hogy az új fogalmakat a definíciójuk segítségével kiküszöböljük. A legtöbb esetben egyetlen olyan irány van, amerre továbbléphetünk, és a végén automatikusan kijön az állítás. Ezt a készséget úgy lehet elsajátítani, hogy az ilyen állítások közül belátunk annyit, amennyi szükséges ahhoz, hogy a dolog magától menjen.

A nehezebb tételeket úgy tanuljuk, hogy próbáljuk meg az állítást magunk bebizonyítani. A rutinlépéseket megtéve valahol elakadunk: ez a megoldás első ötlete. Miután ezt megtaláltuk a jegyzetünkben, folytassuk a próbálkozást. Amikor a bizonyítás végére értünk, előttünk áll az ötletek listája, elég ezeket megtanulni. Pár nap múlva ismét próbáljuk meg felidézni a bizonyítást, ekkor kibuknak azok a részletek, amiket elsőre nem értettünk meg rendesen. Mindez egy fontos lépcső ahhoz, hogy megtanuljuk, hogyan kell *tetszőleges, extra előismeretet nem igénylő matematika-könyvet önállóan megemészteni*.

A vizsgák, általában szerdán és pénteken, reggel negyed kilenckor kezdődnek a szobában (Déli épület, 3. emelet, 202/A). Akkorra négy ember jöjjön, azután fél tíztől 15 percenként egyvalaki. Egy nap maximum 15 ember vizsgázhat. Halasztani szabad, a faliújságra kitett jelentkezési lista áteditálásával, de a halasztások miatt nem lesz új vizsganap, tehát csak oda írtátok be magatokat, ahol van hely! A vizsgázás sorrendjét, és azt, hogy ki hányra jöjjön, ez a lista dönti el (de ha keletkezik egy luk például egy halasztás miatt, akkor bárki előrecsúszhat, sőt, *mindannyiunk érdeke, hogy ezt tegye*). Kérem, hogy az ETR-ben mindenki tartsa naprakészen a vizsgázási szándékát: ha egy adott napon akar jönni, akkor mihamarább iratkozzon fel ott is, ha pedig halasztani akar, törölje magát. **Konzultáció** a vizsganapok délutánján automatikusan lesz, 2 óra körül (pontosabban amikor a vizsga véget ér). A többi konzultációs időpontot ki fogom írni.

TOVÁBBI HÁROM OLDAL!

Typeset by $\mathcal{A}\mathcal{M}\mathcal{S}$ - $\mathcal{T}\mathcal{E}\mathcal{X}$

Absztrakt algebrai alapfogalmak. (Lásd 2.2. Szakasz.) Művelet, asszociativitás, kommutativitás. Asszociatív művelet esetén a szorzat nem függ a zárójelezéstől (NB). Kommutatív művelet esetén a szorzat nem függ a sorrendtől (NB). Neutrális elem, inverz, ezek egyértelműsége. Egész kitevőjű hatványok és tulajdonságaik. Művelettartó leképezés.

Csoport, kommutatív vagy Abel-csoport. Gyűrű; kommutatív, egységelemes, nullosztómentes gyűrű; ferdetest, test. Elemi számolási szabályok. Gyűrűelem egész számszorosa, tulajdonságok. Invertálható elem, gyűrű additív és multiplikatív csoportja. Nullosztómentes gyűrűben szabad egyszerűsíteni. Minden test nullosztómentes.

Összeadás és szorzás mod m (1.1. Szakasz). A \mathbb{Z}_m invertálható elemei pontosan az m -hez relatív prím elemek. A \mathbb{Z}_m^+ és \mathbb{Z}_m^\times csoportok. A \mathbb{Z}_m gyűrű akkor és csak akkor nullosztómentes ha test, akkor és csak akkor, ha m prím. A mod m maradékképzés művelettartó \mathbb{Z} -ből \mathbb{Z}_m -be, és az együtthatókra végezve $\mathbb{Z}[x]$ -ből $\mathbb{Z}_m[x]$ -be is (2.3.4. Gyakorlat).

A binomiális együtthatók alaptulajdonságai, a binomiális tétel (2.2.17. Gyakorlat). Ha minden elem p -szerese nulla egy gyűrűben (p prím), akkor itt tagonként lehet p -edik hatványra emelni. Következmény: a kis-Fermat tétel (3.3.8. Feladat).

A permutáció fogalma (mint bijektív leképezés). Permutációk kompozíciója, inverze, a szimmetrikus csoport (S_n). Az inverzió fogalma, permutáció paritása (előjele). Szorzat előjele az előjelek szorzata. Következmények: inverz előjele, minden transzpozíció páratlan permutáció, a páros permutációk száma.

Komplex számok. (Lásd 1. Fejezet.) A komplex számok (mint $a + bi$ alakú formális kifejezések, ahol $i^2 = -1$). Az $a + bi$ előállítás egyértelmű, valós és képzetes rész. Összeadás, kivonás, szorzás a „szokásos” tulajdonságokkal. Konjugált, abszolút érték, tulajdonságaik, kapcsolatuk. Minden nem nulla komplex számmal lehet osztani, nullosztómentesség. Négyzetgyökvonás, a másodfokú egyenlet megoldása (1.2.1. Kérdés). A komplex számsík, komplex szám argumentuma (szöge) és trigonometrikus alakja. Összeadás, mint vektorösszeadás. Szorzás és osztás trigonometrikus alakban. Egyes geometriai transzformációk kifejezése komplex számokkal. A háromszög-egyenlőtlenség (geometriai bizonyítással).

Komplex szám rendje: a különböző hatványainak a száma (1.5. Szakasz). Ha nem minden hatvány különböző, akkor a rend véges, és a hatványok periodikusan ismétlődnek. A rend a legkisebb pozitív egész, melyre a számot emelve 1-et kapunk. Egy szám két hatványa akkor és csak akkor egyenlő, ha a kitevők különbsége a rendnek többsége. Végtelen rendű szám hatványai páronként különbözők. Képlet a hatvány rendjére.

A komplex egységgyökök, mint \mathbb{C} véges rendű elemei. Trigonometrikus alakjuk, számuk. Az n -ed rendű elemek neve: primitív n -edik egységgyök. Ezek éppen azok a számok, melyek hatványai pontosan az összes n -edik egységgyököt adják. Jellemzésük a trigonometrikus alak segítségével, számuk. Gyökvonás komplex számból, az n -edik gyökök meghatározása és geometriai elhelyezkedése.

Polinomok. Kommutatív, egységelemes gyűrű fölötti polinom, mint formális kifejezés. Polinomok egyenlősége, együtthatói, főegyütthatója, normált polinom. Összeadás, nulla-polinom, kivonás, szorzás. Polinomgyűrű, ez is kommutatív, egységelemes gyűrű. Nem nulla polinom foka, a fokszám változása a műveleteknél. Ha R nullosztómentes, kommutatív, egységelemes gyűrű, akkor $R[x]$ is az (2.1 és 2.3. Szakasz).

A polinomfüggvény fogalma, a polinomfüggvények gyűrűje. Polinom gyöke, a Horner-elrendezés, a gyöktényező kiemelhetősége. Nullosztómentes gyűrű fölött a különböző gyö-

kökhöz tartozó gyöktényezők egyszerre is kiemelhetők, a gyöktényező alak egyértelműsége, a gyökök maximális száma, a polinomok azonossági tétele. Végtelen gyűrű fölött a polinomfüggvények és a polinomok kapcsolata kölcsönösen egyértelmű, de véges gyűrű fölött nem. Példa kommutatív, nem nullosztómentes gyűrű fölötti polinomra, melynek több gyöke van, mint a foka. Az algebra alaptétele (NB): \mathbb{C} fölött minden nem konstans polinomnak van gyöke. Gyök multiplicitása, ez egyértelmű. Egy n -edfokú komplex együtthatós polinomnak multiplicitásokkal számolva pontosan n komplex gyöke van (2.4 és 2.5. Szakasz). A racionális gyökteszt (3.3.9. Tétel). A Lagrange-interpoláció (2.4.4. Gyakorlat).

Az egységelemes, kommutatív gyűrű fölötti többhatározatlanú polinom fogalma. Fok, homogén polinom, felbontás homogén polinomok összegére. A tagok lexikografikus rendezése. Nullosztómentesség, a szorzat foka (2.6 Szakasz). A gyökök és együtthatók összefüggése, az elemi szimmetrikus polinomok. A szimmetrikus polinomok alaptétele, egyértelműség. Hatványösszegek, a Newton-Girard formulák (2.7. Szakasz).

A számelmélet alaptétele. Számelméleti fogalmak egységelemes, kommutatív, nullosztómentes gyűrűben: oszthatóság, egység, asszociált, felbonthatatlan, prímelem, kitüntetett közös osztó és többszörös, ezek egyértelműsége (3.1. Szakasz).

A polinomgyűrű egységei (3.1.7. Gyakorlat). Egységelemes, kommutatív, nullosztómentes gyűrű fölött minden olyan polinommal lehet maradékosan osztani, amelynek a főegyütthatója invertálható. A maradékos osztás egyértelmű. Test fölötti polinomgyűrűben a \mathbb{Z} mintájára belátható a számelmélet alaptétele: euklideszi algoritmus, a lineáris diofantikus egyenlet megoldhatósága, a kitüntetett közös osztó kiemelési tulajdonsága, a felbonthatatlan (irreducibilis) és a prímtulajdonságú elemek viszonya (3.2. Szakasz).

Test fölött az irreducibilis polinomok azok a nem konstans polinomok, melyek nem bonthatók alacsonyabb fokúak szorzatára. Minden elsőfokú polinom irreducibilis; a másod- és harmadfokúak pontosan akkor irreducibilisek, ha nincs az alaptestben gyökük. Ha egy legalább másodfokú polinomnak van az alaptestben gyöke, akkor nem irreducibilis (de ha nincs gyöke, lehet reducibilis). Az irreducibilis polinomok \mathbb{C} fölött az elsőfokúak. Egy \mathbb{R} fölötti polinomnak minden komplex szám ugyanannyiszoros gyöke, mint a konjugáltja. Páratlan fokú valós együtthatós polinomnak van valós gyöke. Az \mathbb{R} fölötti irreducibilis polinomok az elsőfokúak, és azok a másodfokúak, melyeknek diszkriminánsa negatív (3.3. Szakasz).

$R[x]$ számelmélete alaptételes R esetén (3.4. Szakasz). Gauss Lemma I: ha $p \in R$ prím, akkor $R[x]$ -ben is prím, mint konstans polinom. A primitív polinom fogalma, primitív polinomok szorzata is primitív. Gauss Lemma II: egész együtthatós polinom R hányados-
teste fölötti felbontása R fölötti felbontássá módosítható. $R[x]$ -ben az irreducibilis polinomok az R -ben felbonthatatlan konstansok, valamint az R hányados-
teste fölött irreducibilis primitív polinomok. Ha R alaptételes, akkor $R[x]$ is az. Következmény: $\mathbb{Z}[x_1, \dots, x_n]$ és $T[x_1, \dots, x_n]$ alaptételes, ahol T test. A Schönemann-Eisenstein kritérium R hányados-
teste fölötti irreducibilitásra. Következmény: \mathbb{Q} fölött akárhányad fokú irreducibilis polinom létezik. Módszerek az irreducibilitás eldöntésére (3.5. Szakasz).

A körosztási polinom definíciója, rekurzív képlete, kiszámítása, ez egész együtthatós. A körosztási polinom irreducibilitása \mathbb{Z} és \mathbb{Q} fölött (3.9. Szakasz, és az ezt követő feladatok).

Polinom formális deriváltja, összeg, szorzat deriváltja, láncszabály. Ha az f polinomnak egy elem k -szoros gyöke (ahol $k \geq 1$), akkor a deriváltjának legalább $k - 1$ -szeres gyöke. Ezért f többszörös gyökei éppen (f, f') gyökei. Egy polinomnak pontosan akkor nincs


többszörös gyöke \mathbb{C} -ben, ha relatív prím a deriváltjához. A derivált \mathbb{Z}_p fölött (3.6. Szakasz).

A rezultáns és a diszkrimináns. A diszkrimináns felírása a gyökök segítségével, többszörös gyökök. Valós együtthatók esetén kapcsolat a diszkrimináns előjele és a valós gyökök száma között. A harmadfokú egyenlet, Cardano képlete, a köbgyökvonás helyes elvégzése, Casus Irreducibilis (NB). A negyedfokú egyenlet (3.7 és 3.8. Szakasz).

A determináns. (Lásd L1.2-1.5). Paralelogrammák előjeles területének kiszámítása. Előjeles mérték létezése és egyértelműsége T^n -en, képlet (L9.8). A determináns definíciója a kapott képlet segítségével, ez az oszlopainak előjeles mértéke. Következmény: a determináns oszlopcsere-nél előjelet vált, egy oszlophoz egy másik oszlop skalárszorását adva a determináns értéke nem változik. A transzponált mátrix determinánsa megegyezik az eredeti mátrix determinánsával, így az oszlopokra bizonyított tulajdonságok sorokra is érvényesek. Felső háromszögmátrix determinánsa, a determináns kiszámítása Gauss-eliminációval. Az előjeles aldetermináns fogalma, a kifejtési tétel (NB). A Vandermonde-determináns. A determinánsok szorzástétele (LF9.8.4). A determináns eltűnésének jellemzése. A Laplace-féle kifejtés (NB). A Cauchy-Binet formulák (NB).

Lineáris algebra. A lineáris egyenletrendszer fogalma és megoldása Gauss-eliminációval. Vezéregyesek, tilos sorok, szabad és kötött változók, a megoldások általános képlete és száma. Az egyetlen összefüggés az ismeretlenek száma, az egyenletek száma, és a megoldások száma között: ha kevesebb egyenlet van, mint ismeretlen, akkor nem lehet egyértelmű a megoldás. Homogén lineáris egyenletrendszer, triviális megoldás, ha kevesebb egyenlet van, mint ismeretlen, akkor van nemtriviális megoldás. A Cramer-szabály. (L3.1.)

A sík vektorai, helyvektorok, összeadás és skalárral szorzás. Egy T test fölötti oszlopvektorok, összeadás, skalárral szorzás. A sík origót fixáló egybevágósági (és hasonlósági) transzformációi összeg- és skalárszoros-tartók (NB). A sík lineáris transzformációinak megadása mátrix segítségével. Vektor képének kiszámítása, mátrix és vektor szorzata. Kompozíció mátrixa, mátrixok szorzása. A mátrixszorzás asszociativitása (annak következménye, hogy a leképezések kompozíciója asszociatív). Az egységmátrix és az inverz mátrix fogalma. Mátrixok összeadása, és skalárral szorzása. A mátrix-műveletek tulajdonságai, az $n \times n$ -es mátrixok egységelemes gyűrűt alkotnak. A ferde kifejtési tétel, az inverz mátrix képlete. Egy mátrix pontosan akkor invertálható, ha determinánsa nem nulla. Következmény: $MN = I$ akkor és csak akkor, ha $NM = I$. Invertálás Gauss-eliminációval (L2.1, 2.2.).



Békés karácsonyi ünnepeket,
és boldog új esztendőt!