

Mat-alkmat gyakorlat, második évfolyam, első félév

Harmadik alkalom (2004. szeptember 28.)

- Az alábbiak végrehajtásával határozzuk meg a $\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})$ test összes résztestét.
 - Normális-e a $\mathbb{Q} \leq \mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})$ bővítés?
 - Normális-e a $\mathbb{Q} \leq \mathbb{Q}(i, \sqrt[4]{2})$ bővítés?
 - Legyen G a b)-beli bővítés Galois-csoportja, és $\varphi \in G$. Mi lehet $\varphi(i)$ és $\varphi(\sqrt[4]{2})$?
 - Mutassuk meg, hogy ha $\varphi, \psi \in G$, $\varphi(i) = \psi(i)$, és $\varphi(\sqrt[4]{2}) = \psi(\sqrt[4]{2})$, akkor $\varphi = \psi$.
 - Az előző két pont alapján igazoljuk, hogy G elemszáma legfeljebb 8.
 - A főtétel alapján mennyi G elemszáma?
 - Legyen $\alpha_1 = \sqrt[4]{2}$, $\alpha_2 = i\alpha_1$, $\alpha_3 = -\alpha_1$, $\alpha_4 = -i\alpha_1$. Igazoljuk, hogy ha φ és ψ megegyezik az α_1 és α_2 helyeken, akkor $\varphi = \psi$.
 - Mi az összefüggés $\varphi(\alpha_1)$ és $\varphi(\alpha_3)$ között?
 - Mutassuk meg, hogy ha az $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ számokat ebben a sorrendben egy négyzet csúcsaira írjuk, akkor G minden eleme a négyzetnek szimmetriája lesz, és így $G \cong D_4$.
 - Legyen $\varphi \in G$ az (13) permutációnak megfelelő eleme G -nek. Írjuk fel $\mathbb{Q}(i, \sqrt[4]{2})$ egy bázisát \mathbb{Q} felett, egy általános elem képét φ -nél, és φ fixpontjainak halmazát.
 - Legyen $H = \{\text{id}, (24)\}$. Mely testek felelnek meg a H -t tartalmazó részcsoporthoz?
 - Igazoljuk, hogy $\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})$ minden részteste tartalmazza \mathbb{Q} -t.
 - A II/15. feladat bővítéseinél mik a Galois-csoportok és a közbülső testek?
 - Legyenek p_1, \dots, p_k páronként különböző pozitív prímszámok. Határozzuk meg a $\mathbb{Q}(\sqrt{p_1}, \dots, \sqrt{p_n})$ Galois-csoportját \mathbb{Q} felett.
 - *. Mutassuk meg, hogy ha $K \leq L \leq \mathbb{C}$, és K/L negyedfokú, akkor ennek a bővítésnek kettő, három, vagy öt közbülső teste lehet.
 - *. Adjuk meg \mathbb{Q} -nak egy harmadfokú, normális bővítését.
- ∞ *****. Igaz-e, hogy minden véges G csoporthoz van \mathbb{Q} -nak olyan normális bővítése, melynek Galois-csoportja G -vel izomorf? (Ez híres **megoldatlan probléma**, az állítást Safarevics belátta akkor, ha G feloldható).
-
- Készítsük el az alábbi gyűrűk műveleti tábláit, majd osztályozzuk őket izomorfia szerint. $\mathbb{Z}_8/\{0, 4\}$, $\mathbb{Z}_{16}/\{0, 4, 8, 12\}$, $2\mathbb{Z}/(8)$, $2\mathbb{Z}_{16}/(8)$, $\mathbb{Z}/(4)$, $4\mathbb{Z}/(16)$, $\mathbb{Z}[x]/(4, x)$. (Ha n egész, akkor nR az R gyűrű $\{nr \mid r \in R\}$ részgyűrűjét jelöli.)
 - Tekintsük azt az $\mathbb{R}[x]/(x^2 + 1) \cong \mathbb{C}$ izomorfizmust, amelyet úgy kapunk, hogy a homomorfizmus-tételt alkalmazzuk az $f \mapsto f(i)$ homomorfizmusra. Mi az $x + 1$, x^2 , $ax + b$ polinomok maradékosztályainak a képe?
 - Igazak-e az alábbi gyűrű-izomorfizmusok? $\mathbb{R}[x]/(x^2 + 2) \cong \mathbb{C}$; $\mathbb{R}[x]/(x^2 - 1) \cong \mathbb{C}$ illetve $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$; $\mathbb{G}/(5) \cong \mathbb{Z}_5 \times \mathbb{Z}_5$; $\mathbb{G}/(3)$ és a kilenc elemű test. (Itt \mathbb{G} a Gauss-egészek gyűrűje.)
 - A $\mathbb{Q}[x]/(x^2 + x + 1)$ gyűrűben mi az $x + (x^2 + x + 1)$ inverze?
 - Legyen $L = \mathbb{Z}_2[x]/(x^2 + x + 1)$. Határozzuk meg az L elemszámát, írjuk fel a műveleti tábláit, igazoljuk, hogy testet kaptunk, keressünk benne \mathbb{Z}_2 -vel izomorf $\{E, O\}$ résztestet, és adjuk meg L -ben az $Ex^2 + Ex + E$ polinom gyökeit. Oldjuk meg az analóg feladatot $x^3 + x + 1$ -re is. Keressünk ezzel a módszerrel kilenc elemű testet.