

Mat-alkmat szak, első évfolyam, első félév

Első zárthelyi C (2005. okt. 25) — megoldásvázlatok

1. Ha $x^{2005} + bx^{10} - 1 = (x^2 + 1)q(x) + (2x - 1)$, akkor $x = i$ helyettesítéssel $i - b - 1 = 2i - 1$, ahonnan $b = -i$ (3 pont). Ha viszont $x = -i$, akkor hasonlóan $b = i$ adódik (2 pont). A keresett b tehát nem létezik (1 pont).
2. A feltétel azt jelenti, hogy a $z - 1$ vektort i -vel szorozva, azaz pozitív irányba 90 fokkal elforgatva a $z - i$ vektorral párhuzamos, és egyenlő állású vektort kapunk (3 pont). Ezért a zi háromszögben z -nél derékszög van, és a keresett alakzat az i 1 szakaszra rajzolt Thálész-körnek az 1 és i közötti „alsó” íve (3 pont). (A félkörhöz egyik végpontja sem tartozik hozzá.) *Második megoldás:* Legyen $z = x + iy$. A megadott tört képzetes része nulla, azaz $x^2 - x + y^2 - y = 0$ (3 pont), valós része pedig pozitív, azaz $-x - y + 1 > 0$ (1 pont). A kapott egyenlet $(x - (1/2))^2 + (y - (1/2))^2 = (1/2)$ alakban írható, ami az első megoldásban leírt kört adja (1 pont). Az $y < -x + 1$ egyenlőtlenség fejezi ki, hogy ennek a körnek az $y = -x + 1$ egyenes alsó félsíkjába eső félköríve lesz csak megoldás (1 pont).
3. Az $x_i^4 - 3x_i + d = 0$ egyenleteket adjuk össze az $i = 1, 2, 3, 4$ értékekre. Azt kapjuk, hogy $x_1^4 + x_2^4 + x_3^4 + x_4^4 = 3(x_1 + x_2 + x_3 + x_4) - 4d$ (3 pont, ugyanez a Newton-Girard-féle formulából is következik). A gyökök és együtthatók összefüggése miatt $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0$ (1 pont). A negyedik hatványok összege tehát akkor és csak akkor nulla, ha $d = 0$ (1 pont). Ekkor azonban az egyenletnek gyöke a nulla, tehát a válasz igenlő (1 pont).
4. Ha $\varepsilon\eta^2$ rendje 10, akkor a 30-adik hatványa is 1 (2 pont). De $\eta^{30} = 1$, és így $\varepsilon^{30} = 1$ (2 pont). Ez ellentmondás, mert ε rendje 75, ami nem osztója 30-nak (2 pont). *Második megoldás:* Az ε szöge 2π -nek $p/75$ -szöröse, ahol p a 75-höz relatív prím egész szám (1 pont). Hasonlóan η szöge $2\pi q/6$, ahol $(q, 6) = 1$ és q egész (1 pont). Ekkor $\varepsilon\eta^2$ szöge 2π -nek $(p/75) + (2q/6) = (2p + 50q)/150$ -szerese (2 pont). Ha $\varepsilon\eta^2$ rendje 10 lenne, akkor ezt a törtet lehetne úgy egyszerűsíteni, hogy a nevező 10 legyen. Ez a tört azonban már 5-tel sem egyszerűsíthető, mert $(p, 75) = 1$ miatt a számlálója nem osztható öttel. Ilyen számok tehát nem léteznek (2 pont).
5. A polinom deriváltja $16x^{15} + 16i$ (1 pont). Ennek gyökei a $-i$ tizenötödik gyökei, azaz (trigonometrikus alakban számolva) $z_k = \cos(18^\circ + k24^\circ) + i \sin(18^\circ + k24^\circ)$, ahol $0 \leq k < 15$ (2 pont). Ezek akkor lesznek többszörös gyökei az eredeti polinomnak, ha gyökei is, tehát a c lehetséges értékei $c_k = -z_k^{16} - 16iz_k$ (1 pont). Mivel $z_k^{15} = -i$, így $c_k = z_k(-16i - z_k^{15}) = z_k(-16i + i) = -15iz_k$ (1 pont). E szám szöge $288^\circ + k24^\circ$, ami $k = 3$ esetén 360° , vagyis $c_3 = 15$ valós megoldás (1 pont). Megjegyezzük, hogy k többi értékére c_k nem valós. Természetesen a kapott kétszeres gyök a $z_3 = i$ szám. *Második megoldás:* Ha z többszörös gyök, akkor a deriválnak is gyöke, azaz $z^{15} = -i$ (1 pont). Ezt az eredeti egyenletbe visszahelyettesítve $0 = z^{16} + 16iz + c = z(z^{15} + 16i) + c = 15iz + c$ (2 pont). Átrendezve és ötödik hatványra emelve $c^{15} = -15^{15}iz^{15} = 15^{15}$ (1 pont). Mivel c valós, c csak 15 lehet (1 pont). Innen $z = -15/(15i) = i$, ami az eredeti polinomnak és a deriváltjának is gyöke, és ezért a $c = 15$ tényleg megoldás (1 pont).
6. Legyen $z = \cos \alpha + i \sin \alpha$, ekkor $T(v) = vz - 1$ (1 pont). Ezért ha T -t n -szer alkalmazzuk, akkor (a Horner-elrendezés alapján) $vz^n - z^{n-1} - \dots - z - 1$ adódik (2 pont). A mértani sor összegképletét is felhasználva ez akkor egyenlő v -vel, ha $-(z^n - 1)/(z - 1) = v(1 - z^n)$. Innen $z^n = 1$ vagy $v = -1/(1 - z)$, feltéve, hogy $z \neq 1$ (2 pont). Ezért az alábbi lehetőségek vannak. Ha $z = 1$ (vagyis $\alpha = k360^\circ$), akkor egyik pont sem lesz fehér. Ha $z \neq 1$, de z egységgyök (vagyis α fokokban mérve racionális szög), akkor minden pont fehér lesz. A fennmaradó esetben $v = 1/(z - 1)$ az egyetlen fehér pont, ez már egy lépésben visszatér önmagába, vagyis T -nek fixpontja (1 pont).