

BSc algebra1 alap- és középszintű gyakorlat

Első zárthelyi (2006. okt. 24.) — eredmények (Φ_{68} -as változat)

1. a) A szokásos osztási eljárással számolva a hányados $(1/2)x^2 + (1/4)$, a maradék $-3/4$ (3 pont).
b) A négyzetösszeg $\sigma_1^2 - 2\sigma_2$ (0 pont). A gyökök és együtthatók összefüggése alapján $\sigma_1 = 2i/2 = i$ (1 pont) és $\sigma_2 = 2c/2 = c$ (1 pont). Ezért a négyzetösszeg akkor nulla, ha $i^2 = 2c$, azaz $c = -1/2$ (1 pont).
2. a) A $+30$ fokkal való elforgatás a $\cos 30^\circ + i \sin 30^\circ = \sqrt{3}/2 + i/2$ számmal való szorzás (1+1 pont). Az eredmény $(1 - \sqrt{3})/2 + i(-1 - \sqrt{3})/2$ képzetes része, azaz $(-1 - \sqrt{3})/2$ (1 pont).
b) Legyen $z = x + iy$, ekkor $|z+3i|^2 = x^2 + (y+3)^2$ és $\operatorname{Re}(z+2i) = x$ (1 pont). Ezért $x^2 + (y+3)^2 = x^2$, ahonnan $y+3 = 0$ (1 pont). Az eredeti egyenletbe visszahelyettesítve $|z+3i| = |x| = \operatorname{Re}(z+2i) = x$, ami akkor teljesül, ha $x \geq 0$. Ezért a keresett halmaz a valós tengellyel párhuzamos, a $-3i$ pontból a pozitív irányba induló félegyenes (1 pont).
3. A trigonometrikus alak $(-1 - i\sqrt{3})/2 = \cos 240^\circ + i \sin 240^\circ$ (2 pont). E szám hatodik gyökeinek hossza 1, a szögek rendre $40^\circ, 100^\circ, 160^\circ, 220^\circ, 280^\circ, 340^\circ$ (2 pont, hibáncént 1 pont levonás). Az első esetben $40/360 = 1/9$, ezért a rend 9. A többi szám rendje ugyanilyen számolással rendre 18, 9, 18, 9, 18 (2 pont, hibáncént 1 pont levonás).
4. a) A racionális gyökteszt alapján a lehetséges gyökök $\pm 1, \pm 1/5, \pm 1/25$ (1 pont). Hornerrel végigpróbálgatva az $1/5$ gyök (1 pont), amelyhez tartozó gyöktényező kétszer emelhető ki, és az eredmény $(x - (1/5))^2(25x^2 + 25x + 25)$ (1+1 pont). A másodfokú egyenlet megoldóképletével számolva $x^2 + x + 1$ gyökei $(-1 \pm i\sqrt{3})/2$ (1 pont). Ezért a gyöktényezőzős alak:

$$25x^4 + 15x^3 + 16x^2 - 9x + 1 = 25\left(x - \frac{1}{5}\right)^2 \left(x - \frac{-1 + i\sqrt{3}}{2}\right) \left(x - \frac{-1 - i\sqrt{3}}{2}\right) \quad (1 \text{ pont}).$$

5. a) A rekurziós képlettel számolva

$$\Phi_{68}(x) = \frac{x^{68} - 1}{\Phi_1 \Phi_2 \Phi_4 \Phi_{17} \Phi_{34}} = \frac{x^{34} + 1}{\Phi_4(x)} = \frac{(x^2)^{17} + 1}{x^2 + 1} = x^{32} - x^{30} + \dots + 1.$$

Ezért a keresett együtthatók rendre 0, 1, 0, 1 (6 pont). *Második megoldás:* a Φ_{68} polinom foka $\varphi(68) = \varphi(4)\varphi(17) = 32$ (1 pont), ezért x^{68} együtthatója nulla, és x^{32} együtthatója a főegyüttható, ami 1 (1 pont). A konstans tag a primitív 68-adik egységgyökök szorzata, ami 1 (párosítsuk mindegyiket az inverzével, 2 pont), az x^{11} együtthatója pedig azért nulla, mert egy 68 rendű szám ellentettjének a rendje is 68 (lásd 1.5.19), és így a primitív 68-adik egységgyökök összege nulla (2 pont).

6. A feladatban szereplő szimmetrikus polinom legyen g . A tagjainak száma $20 = 5 \cdot 4$, hiszen ötféleképpen választhatjuk ki azt az x_i -t, ami a négyzeten szerepel, és ettől függetlenül négyféleképpen azt az x_m -et, ami az adott tagban nem szerepel (2 pont). A főtag $x_1^2 x_2 x_3 x_4$, ezért az első lépésben $\sigma_1 \sigma_4$ -et kell kivonni (1 pont). A beszorzást elvégezve $\sigma_1 \sigma_4 = g + 5x_1 x_2 x_3 x_4 x_5$. Ezért $g = \sigma_1 \sigma_4 - 5\sigma_5$ (3 pont). A gyökök és együtthatók összefüggése alapján a végeredmény 25 (1 pont). *Második megoldás:* Nyilván g/σ_5 az összes x_i/x_j összege, ahol $i \neq j$. De ez a hányados 1-től különböző ötödik egységgyök (hiszen az $x^5 + 2$ gyökei egymásnak ötödik egységgyökszörősei). Ezeknek az egységgyököknek az összege -1 . A szimmetria miatt a 20 tagú összegben mind a négy ilyen egységgyök ötször szerepel. Ezért g/σ_5 értéke -5 .