

BSc algebra1 alap- és középszintű gyakorlat

Második zárthelyi (2006. dec. 12.) — eredmények (főátló 19-es változat)

1. a) $\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2 \\ 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -7 \\ 2 \end{bmatrix}$. A mátrix mindkét oszlopa és a végeredmény is 1 pont.

b) $a_{13}a_{25}a_{34}a_{42}a_{51}$, a második indexek sorrendjében 8 inverzió van, az előjel +.

2. a) Bármelyik módszerrel számolva a determináns $c - 11$, ezért $c = 9$ (1 pont). Az inverz képletéből az előjeles aldetermináns $-\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 2 \end{vmatrix} = 10$, tehát az eredmény $10/(-2) = -5$ (2 pont).

b) A 2 gyök, például Hornerrel kiemelve $(x - 2)(2x^2 + x + 1)$ adódik (2 pont). A második tényező is irreducibilis, mert másodfokú és 0, 1, 2 nem gyöke (1 pont).

3. Az eliminált mátrix $\begin{bmatrix} \boxed{1} & 14 & 0 & 1 \\ 0 & -9 & \boxed{1} & 0 \end{bmatrix}$ (2 pont), y az egyetlen szabad változó, a megoldás $(x, y, z) = (1 - 14y, y, 9y)$ (1 pont). Mivel két vezéregyes van, a mátrix rangja 2, ezért a három sor nem lehet független (3 pont). *Második megoldás:* az első két sor összege a harmadik, ezért

nem függetlenek (3 pont). *Harmadik (rutin)megoldás:* az $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 5 & 1 & 6 \\ 1 & 3 & 4 \end{bmatrix}$ mátrixra is elvégezzük az eliminációt.

4. a) Ha a mátrix köbe nulla, akkor $d = 3$, mert alsó háromszögmátrix köbre emelésénél a főátló megfelelő elemei összeszorzódnak (1 pont). Ha $d = 3$, akkor szigorú alsó háromszögmátrixot kapunk, amelynek a köbe nulla (2 pont).

b) $\begin{bmatrix} 2 & -2 \\ 2 & -2 \end{bmatrix}$ (3 pont).

5. $f(x) = x^5 + 5x^4 + 7x^3 + 4x^2 - x + 1$ a \mathbb{Z}_2 fölött $x^5 + x^4 + x^3 + x + 1$, ami irreducibilis. Ugyanis nem gyöke a 0 és az 1, így csak másod- és harmadfokú irreducibilis polinom szorzata lehetne, de $(x^2 + x + 1)(x^3 + x + 1) = x^5 + x^4 + 1$, és $(x^2 + x + 1)(x^3 + x^2 + 1) = x^5 + x + 1$ egyike sem a fenti polinom (3 pont).

Mivel $f(x - 1) = x^5 - 3x^3 + 3x^2 - 3x + 3$ -ra alkalmazható a Schönemann-Eisenstein, ha $p = 3$, ezért az eredeti f is irreducibilis \mathbb{Q} fölött.

Második megoldás: Ha az eredeti polinom felbomlana $\mathbb{Q}[x]$ -ben, akkor a második Gauss-lemma miatt felbomlana gh alakban \mathbb{Z} fölött is, ahol g és h foka 5-nél kisebb (1 pont). Vegyük ezt a felbontást mod 2. Mivel f irreducibilis és ötödfokú \mathbb{Z}_2 fölött, ezért triviális felbontást kapunk, így g és h egyike mod 2 ötödfokú (1 pont). De akkor a megfelelő eredeti g , illetve h is ötödfokú, ami ellentmondás (1 pont).

6. Az első sorból emeljük ki 3-at. Ezután az első sor 6-szorosát vonjuk ki a másodikból. Ekkor a második sor második eleme 1 lesz. Vonjuk ki a második sor 6-szorosát a harmadik sorból, és így tovább, mindegyik 6-ost a felette frissen keletkezett 1 ejti ki. A végén felső háromszögmátrixot kapunk, amelynek főátlója 1, így a végeredmény 3.