

BSc algebra1 alap- és középszintű gyakorlat

Második zárthelyi (2006. dec. 12.) — eredmények (főátló 49-es változat)

1. a) $\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2 \\ 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -8 \\ -2 \end{bmatrix}$. A mátrix mindkét oszlopa és a végeredmény is 1 pont.
b) $a_{13}a_{22}a_{31}a_{45}a_{54}$, a második indexek sorrendjében 4 inverzió van, az előjel +.
2. a) Bármelyik módszerrel számolva a determináns $9 - c$, ezért $c = 11$ (1 pont). Az inverz képletéből az előjeles aldetermináns $-\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 5$, tehát az eredmény $5/(-2) = -(5/2)$ (2 pont).
b) A 2 gyök, például Hornerrel kiemelve $(x - 2)(x^2 + x + 2)$ adódik (2 pont). A második tényező is irreducibilis, mert másodfokú és 0, 1, 2 nem gyöke (1 pont).
3. Az eliminált mátrix $\begin{bmatrix} \boxed{1} & 36 & 0 & 5 \\ 0 & -15 & \boxed{1} & -2 \end{bmatrix}$ (2 pont), y az egyetlen szabad változó, a megoldás $(x, y, z) = (5 - 36y, y, -2 + 15y)$ (1 pont). Mivel két vezéregyes van, a mátrix rangja 2, ezért a három sor nem lehet független (3 pont). *Második megoldás:* az első két sor összege a harmadik, ezért nem függetlenek (3 pont). *Harmadik (rutin)megoldás:* az $\begin{bmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 6 & 3 & 9 \\ 2 & 7 & 9 \end{bmatrix}$ mátrixra is elvégezzük az eliminációt.
4. a) Ha a mátrix köbe nulla, akkor $d = -4$, mert alsó háromszögmátrix köbre emelésénél a főátló megfelelő elemei összeszorzódnak (1 pont). Ha $d = -4$, akkor szigorú alsó háromszögmátrixot kapunk, amelynek a köbe nulla (2 pont).
b) $\begin{bmatrix} -3 & 3 \\ -3 & 3 \end{bmatrix}$ (3 pont).
5. $f(x) = x^5 + 5x^4 + 3x^3 - 11x^2 - 16x + 1$ a \mathbb{Z}_2 fölött $x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + 1$, ami irreducibilis. Ugyanis nem gyöke a 0 és az 1, így csak másod- és harmadfokú irreducibilis polinom szorzata lehetne, de $(x^2 + x + 1)(x^3 + x + 1) = x^5 + x^4 + 1$, és $(x^2 + x + 1)(x^3 + x^2 + 1) = x^5 + x + 1$ egyike sem a fenti polinom (3 pont).
Mivel $f(x - 1) = x^5 - 7x^3 + 7$ -re alkalmazható a Schönemann-Eisenstein, ha $p = 7$, ezért az eredeti f is irreducibilis \mathbb{Q} fölött.
Második megoldás: Ha az eredeti polinom felbomlana $\mathbb{Q}[x]$ -ben, akkor a második Gauss-lemma miatt felbomlana gh alakban \mathbb{Z} fölött is, ahol g és h foka 5-nél kisebb (1 pont). Vegyük ezt a felbontást mod 2. Mivel f irreducibilis és **ötödfokú** \mathbb{Z}_2 fölött, ezért triviális felbontást kapunk, így g és h egyike mod 2 ötödfokú (1 pont). De akkor a megfelelő eredeti g , illetve h is ötödfokú, ami ellentmondás (1 pont).
6. Az első sorból emeljük ki 3-at. Ezután az első sor 12-szeresét vonjuk ki a másodikból. Ekkor a második sor második eleme 1 lesz. Vonjuk ki a második sor 12-szeresét a harmadik sorból, és így tovább, mindegyik 12-est a felette frissen keletkezett 1 ejti ki. A végén felső háromszögmátrixot kapunk, amelynek főátlója 1, így a végeredmény 3.