

## Bsc algebra3 elemző gyakorlat

Harmadik alkalom (2007. szeptember 25)

- 2.2.35.** Igazoljuk, hogy az  $a + b\sqrt{2}$  ( $a, b \in \mathbb{Q}$ ) alakú számok résztestet alkotnak  $\mathbb{C}$ -ben.
- 6.1.24.** Igaz-e, hogy  $\sqrt{3} \in \mathbb{Q}(\sqrt{2})$ ?
- 6.1.2.** Hozzuk két  $a + b\sqrt[3]{2} + c\sqrt[3]{4}$  alakú szám szorzatát is ugyanilyen alakra ( $a, b, c \in \mathbb{Q}$ ).
- 6.1.3.** Írjuk fel az  $1 + \sqrt[3]{2} + \sqrt[3]{4}$  és a  $2 + \sqrt[3]{2} + \sqrt[3]{4}$  szám reciprokát  $a + b\sqrt[3]{2} + c\sqrt[3]{4}$  alakban, ahol  $a, b, c \in \mathbb{Q}$ .
- 6.1.15.** Legyen  $\theta$  az  $x^3 + 3x + 1$  polinom (egyetlen) valós gyöke. Írjuk fel a  $\theta^5 + 2\theta^3$  és a  $\theta/(\theta - 3)$  számokat  $a + b\theta + c\theta^2$  alakban, ahol  $a, b, c \in \mathbb{Q}$ . Mi  $\theta$  minimálpolinomja  $\mathbb{Q}$  fölött?
- 5.10.15.** Határozzuk meg az alábbi számok minimálpolinomját a racionális test fölött:  $\pi, 1 + i, \sqrt{2} + i, \sqrt{2} + \sqrt{3}, \sqrt[3]{2}, 1 + \sqrt[3]{2}, \sqrt[3]{2 + \sqrt{2}}, \sqrt[3]{7 + 5\sqrt{2}} + \sqrt[3]{7 - 5\sqrt{2}}, \cos 20^\circ$ , egy primitív  $n$ -edik egységgyök, ahol  $n = 2, 3, 4, 5, 6$ , illetve tetszőleges prímszám.
- 6.1.7, 6.1.25.** Igazoljuk az alábbiakat:  $\mathbb{Q}(\sqrt{6}) \subseteq \mathbb{Q}(\sqrt{3}, \sqrt{2} + 1)$ ,  $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt[3]{2}) = \mathbb{Q}(\sqrt[6]{2})$ ,  $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}) = \mathbb{Q}(\sqrt{2} + \sqrt{3})$ .
- 6.1.23.** Független-e  $\{1, i, \sqrt{2} + 3i\}$   $\mathbb{Q}$  fölött;  $\{1, i, \sqrt{2} + 3i\}$   $\mathbb{R}$  fölött;  $\{1, \pi, 1/\pi\}$   $\mathbb{Q}$  fölött?
- 6.2.1.** Tegyük föl, hogy  $V$  vektortér  $\mathbb{C}$  fölött. Mutassuk meg, hogy ha  $b_1, \dots, b_n$  bázisa, akkor  $V$  vektortér  $\mathbb{R}$  fölött is ugyanazokra a műveletekre, és  $b_1, \dots, b_n, ib_1, \dots, ib_n$  bázis lesz  $\mathbb{R}$  fölött. Vagyis az  $\mathbb{R}$  fölötti dimenzió a  $\mathbb{C}$  fölötti dimenziónak a kétszerese.
- 6.1.24.** Felírható-e  $a + b\sqrt[3]{2} + c\sqrt[3]{4}$  alakban a  $\sqrt[6]{2}$  illetve a  $\sqrt{2}$ , ahol  $a, b, c$  racionális számok?
- 6.2.15.** Számítsuk ki az alábbi fokszámokat:  $\sqrt[4]{2}$  foka  $\mathbb{Q}$  és  $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$  fölött;  $|\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}) : \mathbb{Q}|$ ;  $|\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt[3]{2}) : \mathbb{Q}|$ ;  $|\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt[3]{3}) : \mathbb{Q}|$ ;  $\sqrt[4]{2}$  foka  $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{7})$  fölött;  $\sqrt[4]{2}$  foka  $\mathbb{Q}(\sqrt{8})$  fölött;  $i$  foka  $\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})$  fölött;  $\sqrt[4]{2}$  foka  $\mathbb{Q}(i)$  fölött;  $\sqrt{2} + \sqrt[4]{2}$  foka  $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$  fölött;  $\sqrt{2} + \sqrt[4]{2}$  foka  $\mathbb{Q}$  fölött;  $\sqrt{\pi}$  foka  $\mathbb{Q}(\pi)$  fölött.
- 6.2.11.** Mutassuk meg, hogy ha  $K \leq L$  egy testbővítés,  $\alpha, \beta \in L$ , és  $\text{gr}_K(\alpha)$  és  $\text{gr}_K(\beta)$  relatív prímek, akkor  $|\mathbb{Q}(\alpha, \beta) : \mathbb{Q}| = \text{gr}_K(\alpha)\text{gr}_K(\beta)$ .
- 6.2.6.** Legyen  $K \leq L$  testbővítés, és tegyük föl, hogy az  $\alpha \in L$  elem gyöke egy  $n$ -edfokú,  $K[x]$ -beli polinomnak. Igazoljuk, hogy  $\text{gr}_K(\alpha) \leq n$ . Fennáll-e itt a  $\leq$  helyett oszthatóság?
- 6.2.9.** Legyen  $\theta$  nem valós gyöke az  $x^3 - 2$  polinomnak. Határozzuk meg  $\theta$  fokát  $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$  fölött, és a  $\mathbb{Q}(\theta) \cap \mathbb{R}$  testet. Igaz-e, hogy ha  $K \leq L \leq M$ , és  $\alpha \in M$ , akkor  $\text{gr}_L(\alpha) \mid \text{gr}_K(\alpha)$ ?
- 6.2.17.** Igazoljuk, hogy ha  $a$  és  $b$  valós, akkor  $a + bi$  pontosan akkor algebrai ( $\mathbb{Q}$  fölött), ha  $a$  is és  $b$  is az.
- 6.2.18.** Az alábbi számok közül melyek algebraiak, és melyek transzcendensek:  $\pi + 3, 5\pi + 6, \pi + \sqrt{2}, \pi^2 + 2\pi + 2, \sqrt{\pi}$ .
- 6.2.19.** Egy algebrai szám és egy transzcendens szám összege mikor algebrai? És a szorzatuk? Egy algebrai szám négyzete lehet-e transzcendens? És a négyzetgyöke?
- 6.2.20, 2.5.18.** Igazoljuk, hogy  $\mathbb{Q}$  egyetlen véges bővítése sem algebrailag zárt. Mutassuk meg, hogy a  $\mathbb{Z}_p$  test nem algebrailag zárt. Melyek az algebrailag zárt véges testek?