

Algebra2, alapszint

ELTE Algebra és Számelmélet Tanszék

Előadó: Kiss Emil
ewkiss@cs.elte.hu

1. előadás

A félév anyaga

- **Lineáris algebra**

A félév anyaga

- **Lineáris algebra**
 - Vektorterek, alterek

A félév anyaga

- **Lineáris algebra**
 - Vektorterek, alterek
 - Függés, függetlenség, bázis, dimenzió

A félév anyaga

- **Lineáris algebra**
 - Vektorterek, alterek
 - Függés, függetlenség, bázis, dimenzió
 - Skaláris szorzat \mathbb{R}^n -ben, vektorok hossza és szöge

A félév anyaga

- **Lineáris algebra**
 - Vektorterek, alterek
 - Függés, függetlenség, bázis, dimenzió
 - Skaláris szorzat \mathbb{R}^n -ben, vektorok hossza és szöge
 - Lineáris leképezések, mátrixuk, bázistranszformáció

A félév anyaga

- **Lineáris algebra**
 - Vektorterek, alterek
 - Függés, függetlenség, bázis, dimenzió
 - Skaláris szorzat \mathbb{R}^n -ben, vektorok hossza és szöge
 - Lineáris leképezések, mátrixuk, bázistranszformáció
 - Képtér, magtér, dimenziótétel, rang, invertálhatóság

A félév anyaga

- **Lineáris algebra**
 - Vektorterek, alterek
 - Függés, függetlenség, bázis, dimenzió
 - Skaláris szorzat \mathbb{R}^n -ben, vektorok hossza és szöge
 - Lineáris leképezések, mátrixuk, bázistranszformáció
 - Képtér, magtér, dimenziótétel, rang, invertálhatóság
 - Sajátérték, karakterisztikus polinom, diagonalizálás

A félév anyaga

- **Lineáris algebra**
 - Vektorterek, alterek
 - Függés, függetlenség, bázis, dimenzió
 - Skaláris szorzat \mathbb{R}^n -ben, vektorok hossza és szöge
 - Lineáris leképezések, mátrixuk, bázistranszformáció
 - Képtér, magtér, dimenziótétel, rang, invertálhatóság
 - Sajátérték, karakterisztikus polinom, diagonalizálás
 - Minimálpolinom, invariáns alterek, Jordan normálalak

A félév anyaga

- **Lineáris algebra**
 - Vektorterek, alterek
 - Függés, függetlenség, bázis, dimenzió
 - Skaláris szorzat \mathbb{R}^n -ben, vektorok hossza és szöge
 - Lineáris leképezések, mátrixuk, bázistranszformáció
 - Képtér, magtér, dimenziótétel, rang, invertálhatóság
 - Sajátérték, karakterisztikus polinom, diagonalizálás
 - Minimálpolinom, invariáns alterek, Jordan normálalak
- **Csoportelmélet**

A félév anyaga

- **Lineáris algebra**

- Vektorterek, alterek
- Függés, függetlenség, bázis, dimenzió
- Skaláris szorzat \mathbb{R}^n -ben, vektorok hossza és szöge
- Lineáris leképezések, mátrixuk, bázistranszformáció
- Képtér, magtér, dimenziótétel, rang, invertálhatóság
- Sajátérték, karakterisztikus polinom, diagonalizálás
- Minimálpolinom, invariáns alterek, Jordan normálalak

- **Csoportelmélet**

- Példák: permutációk, mátrixok, geometriai transzformációk

A félév anyaga

● Lineáris algebra

- Vektorterek, alterek
- Függés, függetlenség, bázis, dimenzió
- Skaláris szorzat \mathbb{R}^n -ben, vektorok hossza és szöge
- Lineáris leképezések, mátrixuk, bázistranszformáció
- Képtér, magtér, dimenziótétel, rang, invertálhatóság
- Sajátérték, karakterisztikus polinom, diagonalizálás
- Minimálpolinom, invariáns alterek, Jordan normálalak

● Csoportelmélet

- Példák: permutációk, mátrixok, geometriai transzformációk
- Részcsoport, mellékosztály, Lagrange tétele

A félév anyaga

● Lineáris algebra

- Vektorterek, alterek
- Függés, függetlenség, bázis, dimenzió
- Skaláris szorzat \mathbb{R}^n -ben, vektorok hossza és szöge
- Lineáris leképezések, mátrixuk, bázistranszformáció
- Képtér, magtér, dimenziótétel, rang, invertálhatóság
- Sajátérték, karakterisztikus polinom, diagonalizálás
- Minimálpolinom, invariáns alterek, Jordan normálalak

● Csoportelmélet

- Példák: permutációk, mátrixok, geometriai transzformációk
- Részcsoport, mellékosztály, Lagrange tétele
- Elemrend, ciklikus csoportok, generált részcsoport

A félév anyaga

● Lineáris algebra

- Vektorterek, alterek
- Függés, függetlenség, bázis, dimenzió
- Skaláris szorzat \mathbb{R}^n -ben, vektorok hossza és szöge
- Lineáris leképezések, mátrixuk, bázistranszformáció
- Képtér, magtér, dimenziótétel, rang, invertálhatóság
- Sajátérték, karakterisztikus polinom, diagonalizálás
- Minimálpolinom, invariáns alterek, Jordan normálalak

● Csoportelmélet

- Példák: permutációk, mátrixok, geometriai transzformációk
- Részcsoport, mellékosztály, Lagrange tétele
- Elemrend, ciklikus csoportok, generált részcsoport
- Permutációcsoportok, pálya és stabilizátor

A félév anyaga

● Lineáris algebra

- Vektorterek, alterek
- Függés, függetlenség, bázis, dimenzió
- Skaláris szorzat \mathbb{R}^n -ben, vektorok hossza és szöge
- Lineáris leképezések, mátrixuk, bázistranszformáció
- Képtér, magtér, dimenziótétel, rang, invertálhatóság
- Sajátérték, karakterisztikus polinom, diagonalizálás
- Minimálpolinom, invariáns alterek, Jordan normálalak

● Csoportelmélet

- Példák: permutációk, mátrixok, geometriai transzformációk
- Részcsoport, mellékosztály, Lagrange tétele
- Elemrend, ciklikus csoportok, generált részcsoport
- Permutációcsoportok, pálya és stabilizátor
- Izomorfizmus, homomorfizmus, normálosztó, faktorcsoport

A félév anyaga

● Lineáris algebra

- Vektorterek, alterek
- Függés, függetlenség, bázis, dimenzió
- Skaláris szorzat \mathbb{R}^n -ben, vektorok hossza és szöge
- Lineáris leképezések, mátrixuk, bázistranszformáció
- Képtér, magtér, dimenziótétel, rang, invertálhatóság
- Sajátérték, karakterisztikus polinom, diagonalizálás
- Minimálpolinom, invariáns alterek, Jordan normálalak

● Csoportelmélet

- Példák: permutációk, mátrixok, geometriai transzformációk
- Részcsoport, mellékosztály, Lagrange tétele
- Elemrend, ciklikus csoportok, generált részcsoport
- Permutációcsoportok, pálya és stabilizátor
- Izomorfizmus, homomorfizmus, normálosztó, faktorcsoport
- Egyszerű csoportok, Feit–Thompson-tétel, klasszifikáció

A félév anyaga

● Lineáris algebra

- Vektorterek, alterek
- Függés, függetlenség, bázis, dimenzió
- Skaláris szorzat \mathbb{R}^n -ben, vektorok hossza és szöge
- Lineáris leképezések, mátrixuk, bázistranszformáció
- Képtér, magtér, dimenziótétel, rang, invertálhatóság
- Sajátérték, karakterisztikus polinom, diagonalizálás
- Minimálpolinom, invariáns alterek, Jordan normálalak

● Csoportelmélet

- Példák: permutációk, mátrixok, geometriai transzformációk
- Részcsoport, mellékosztály, Lagrange tétele
- Elemrend, ciklikus csoportok, generált részcsoport
- Permutációcsoportok, pálya és stabilizátor
- Izomorfizmus, homomorfizmus, normálosztó, faktorcsoport
- Egyszerű csoportok, Feit–Thompson-tétel, klasszifikáció
- Direkt szorzat, véges Abel-csoportok

Irodalom

- <http://www.cs.elte.hu/~ewkiss/bboard/>

Irodalom

- <http://www.cs.elte.hu/~ewkiss/bboard/>
 - Az előadáson látott prezentáció, és nyomtatható változata

Irodalom

- <http://www.cs.elte.hu/~ewkiss/bboard/>
 - Az előadáson látott prezentáció, és nyomtatható változata
 - A gyakorlatokon szereplő feladatsorok

Irodalom

- <http://www.cs.elte.hu/~ewkiss/bboard/>
 - Az előadáson látott prezentáció, és nyomtatható változata
 - A gyakorlatokon szereplő feladatsorok
 - Információk a vizsgákról, zárthelyikről

Irodalom

- <http://www.cs.elte.hu/~ewkiss/bboard/>
 - Az előadáson látott prezentáció, és nyomtatható változata
 - A gyakorlatokon szereplő feladatsorok
 - Információk a vizsgákról, zárthelyikről
 - Tematikák, oktatási anyagok, ajánlott irodalom

Irodalom

- <http://www.cs.elte.hu/~ewkiss/bboard/>
 - Az előadáson látott prezentáció, és nyomtatható változata
 - A gyakorlatokon szereplő feladatsorok
 - Információk a vizsgákról, zárthelyikről
 - Tematikák, oktatási anyagok, ajánlott irodalom
- **Freud Róbert: Lineáris algebra**

Irodalom

- <http://www.cs.elte.hu/~ewkiss/bboard/>
 - Az előadáson látott prezentáció, és nyomtatható változata
 - A gyakorlatokon szereplő feladatsorok
 - Információk a vizsgákról, zárthelyikről
 - Tematikák, oktatási anyagok, ajánlott irodalom
- **Freud Róbert: Lineáris algebra**
 - A mostani és a következő félév lineáris algebra anyaga

Irodalom

- <http://www.cs.elte.hu/~ewkiss/bboard/>
 - Az előadáson látott prezentáció, és nyomtatható változata
 - A gyakorlatokon szereplő feladatsorok
 - Információk a vizsgákról, zárthelyikről
 - Tematikák, oktatási anyagok, ajánlott irodalom
- **Freud Róbert: Lineáris algebra**
 - A mostani és a következő félév lineáris algebra anyaga
 - Feladatok megoldásokkal

Irodalom

- <http://www.cs.elte.hu/~ewkiss/bboard/>
 - Az előadáson látott prezentáció, és nyomtatható változata
 - A gyakorlatokon szereplő feladatsorok
 - Információk a vizsgákról, zárthelyikről
 - Tematikák, oktatási anyagok, ajánlott irodalom
- **Freud Róbert: Lineáris algebra**
 - A mostani és a következő félév lineáris algebra anyaga
 - Feladatok megoldásokkal
- **Kiss Emil: Bevezetés az algebrába**
(remélhetőleg a félév közben megjelenik)

Irodalom

- <http://www.cs.elte.hu/~ewkiss/bboard/>
 - Az előadáson látott prezentáció, és nyomtatható változata
 - A gyakorlatokon szereplő feladatsorok
 - Információk a vizsgákról, zárthelyikről
 - Tematikák, oktatási anyagok, ajánlott irodalom
- **Freud Róbert: Lineáris algebra**
 - A mostani és a következő félév lineáris algebra anyaga
 - Feladatok megoldásokkal
- **Kiss Emil: Bevezetés az algebrába**
(remélhetőleg a félév közben megjelenik)
 - A csoportelméleti anyagrész

Irodalom

- <http://www.cs.elte.hu/~ewkiss/bboard/>
 - Az előadáson látott prezentáció, és nyomtatható változata
 - A gyakorlatokon szereplő feladatsorok
 - Információk a vizsgákról, zárthelyikről
 - Tematikák, oktatási anyagok, ajánlott irodalom
- **Freud Róbert: Lineáris algebra**
 - A mostani és a következő félév lineáris algebra anyaga
 - Feladatok megoldásokkal
- **Kiss Emil: Bevezetés az algebrába**
(remélhetőleg a félév közben megjelenik)
 - A csoportelméleti anyagrész
 - A későbbi félévek anyaga

Irodalom

- <http://www.cs.elte.hu/~ewkiss/bboard/>
 - Az előadáson látott prezentáció, és nyomtatható változata
 - A gyakorlatokon szereplő feladatsorok
 - Információk a vizsgákról, zárthelyikről
 - Tematikák, oktatási anyagok, ajánlott irodalom
- **Freud Róbert: Lineáris algebra**
 - A mostani és a következő félév lineáris algebra anyaga
 - Feladatok megoldásokkal
- **Kiss Emil: Bevezetés az algebrába**
(remélhetőleg a félév közben megjelenik)
 - A csoportelméleti anyagrész
 - A későbbi félévek anyaga
 - A gyakorlatokon szereplő feladatok megoldásai

Irodalom

- <http://www.cs.elte.hu/~ewkiss/bboard/>
 - Az előadáson látott prezentáció, és nyomtatható változata
 - A gyakorlatokon szereplő feladatsorok
 - Információk a vizsgákról, zárthelyikről
 - Tematikák, oktatási anyagok, ajánlott irodalom
- **Freud Róbert: Lineáris algebra**
 - A mostani és a következő félév lineáris algebra anyaga
 - Feladatok megoldásokkal
- **Kiss Emil: Bevezetés az algebrába**
(remélhetőleg a félév közben megjelenik)
 - A csoportelméleti anyagrész
 - A későbbi félévek anyaga
 - A gyakorlatokon szereplő feladatok megoldásai
- **További feladatgyűjtemény**

Irodalom

- <http://www.cs.elte.hu/~ewkiss/bboard/>
 - Az előadáson látott prezentáció, és nyomtatható változata
 - A gyakorlatokon szereplő feladatsorok
 - Információk a vizsgákról, zárthelyikről
 - Tematikák, oktatási anyagok, ajánlott irodalom
- **Freud Róbert: Lineáris algebra**
 - A mostani és a következő félév lineáris algebra anyaga
 - Feladatok megoldásokkal
- **Kiss Emil: Bevezetés az algebrába**
(remélhetőleg a félév közben megjelenik)
 - A csoportelméleti anyagrész
 - A későbbi félévek anyaga
 - A gyakorlatokon szereplő feladatok megoldásai
- **További feladatgyűjtemény**
 - Czédli-Szendrei-Szendrei: Absztrakt algebrai feladatok

A számonkérés módja

- **A gyakorlati jegy:**

A számonkérés módja

- **A gyakorlati jegy:**
 - Csak három hiányzás megengedett.

A számonkérés módja

- **A gyakorlati jegy:**
 - Csak három hiányzás megengedett.
 - Minden gyakorlaton röpdolgozat: összesen 10%;

A számonkérés módja

- **A gyakorlati jegy:**
 - Csak három hiányzás megengedett.
 - Minden gyakorlaton röpdolgozat: összesen 10%;
 - az előző előadáson elhangzott tételekből, definíciókból;

A számonkérés módja

- **A gyakorlati jegy:**
 - Csak három hiányzás megengedett.
 - Minden gyakorlaton röpdolgozat: összesen 10%;
 - az előző előadáson elhangzott tételekből, definíciókból;
 - az előző heti gyakorlaton tanult készségekből.

A számonkérés módja

- **A gyakorlati jegy:**
 - Csak három hiányzás megengedett.
 - Minden gyakorlaton röpdolgozat: összesen 10%;
 - az előző előadáson elhangzott tételekből, definíciókból;
 - az előző heti gyakorlaton tanult készségekből.
 - Írásbeli házi feladatok: összesen további 10%.
Kötelező számítógépes házi feladat.

A számonkérés módja

- **A gyakorlati jegy:**
 - Csak három hiányzás megengedett.
 - Minden gyakorlaton röpdolgozat: összesen 10%;
 - az előző előadáson elhangzott tételekből, definíciókból;
 - az előző heti gyakorlaton tanult készségekből.
 - Írásbeli házi feladatok: összesen további 10%.
Kötelező számítógépes házi feladat.
 - Két évfolyamzárthelyi: 40 – 40%;

A számonkérés módja

- **A gyakorlati jegy:**
 - Csak három hiányzás megengedett.
 - Minden gyakorlaton röpdolgozat: összesen 10%;
 - az előző előadáson elhangzott tételekből, definíciókból;
 - az előző heti gyakorlaton tanult készségekből.
 - Írásbeli házi feladatok: összesen további 10%.
Kötelező számítógépes házi feladat.
 - Két évfolyamzárthelyi: 40 – 40%;
 - az elégtelen zárthelyiket ki kell javítani;

A számonkérés módja

- **A gyakorlati jegy:**
 - Csak három hiányzás megengedett.
 - Minden gyakorlaton röpdolgozat: összesen 10%;
 - az előző előadáson elhangzott tételekből, definíciókból;
 - az előző heti gyakorlaton tanult készségekből.
 - Írásbeli házi feladatok: összesen további 10%.
Kötelező számítógépes házi feladat.
 - Két évfolyamzárthelyi: 40 – 40%;
 - az elégtelen zárthelyiket ki kell javítani;
 - javító a félév végén, a gyakorlatvezető döntése alapján;

A számonkérés módja

- **A gyakorlati jegy:**
 - Csak három hiányzás megengedett.
 - Minden gyakorlaton röpdolgozat: összesen 10%;
 - az előző előadáson elhangzott tételekből, definíciókból;
 - az előző heti gyakorlaton tanult készségekből.
 - Írásbeli házi feladatok: összesen további 10%.
Kötelező számítógépes házi feladat.
 - Két évfolyamzárthelyi: 40 – 40%;
 - az elégtelen zárthelyiket ki kell javítani;
 - javító a félév végén, a gyakorlatvezető döntése alapján;
 - Ha nem sikerül: gyakorlati jegy utóvizsga.

A számonkérés módja

- **A gyakorlati jegy:**
 - Csak három hiányzás megengedett.
 - Minden gyakorlaton röpdolgozat: összesen 10%;
 - az előző előadáson elhangzott tételekből, definíciókból;
 - az előző heti gyakorlaton tanult készségekből.
 - Írásbeli házi feladatok: összesen további 10%.
Kötelező számítógépes házi feladat.
 - Két évfolyamzárthelyi: 40 – 40%;
 - az elégtelen zárthelyiket ki kell javítani;
 - javító a félév végén, a gyakorlatvezető döntése alapján;
 - Ha nem sikerül: gyakorlati jegy utóvizsga.
- **A vizsgajegy:**

A számonkérés módja

- **A gyakorlati jegy:**
 - Csak három hiányzás megengedett.
 - Minden gyakorlaton röpdolgozat: összesen 10%;
 - az előző előadáson elhangzott tételekből, definíciókból;
 - az előző heti gyakorlaton tanult készségekből.
 - Írásbeli házi feladatok: összesen további 10%.
Kötelező számítógépes házi feladat.
 - Két évfolyamzárthelyi: 40 – 40%;
 - az elégtelen zárthelyiket ki kell javítani;
 - javító a félév végén, a gyakorlatvezető döntése alapján;
 - Ha nem sikerül: gyakorlati jegy utóvizsga.
- **A vizsgajegy:**
 - Csak érvényes gyakorlati jeggyel lehet vizsgázni.

A számonkérés módja

- **A gyakorlati jegy:**
 - Csak három hiányzás megengedett.
 - Minden gyakorlaton röpdolgozat: összesen 10%;
 - az előző előadáson elhangzott tételekből, definíciókból;
 - az előző heti gyakorlaton tanult készségekből.
 - Írásbeli házi feladatok: összesen további 10%.
Kötelező számítógépes házi feladat.
 - Két évfolyamzárthelyi: 40 – 40%;
 - az elégtelen zárthelyiket ki kell javítani;
 - javító a félév végén, a gyakorlatvezető döntése alapján;
 - Ha nem sikerül: gyakorlati jegy utóvizsga.
- **A vizsgajegy:**
 - Csak érvényes gyakorlati jeggyel lehet vizsgázni.
 - Írásbeli vizsga, az anyag megértését is méri;

A számonkérés módja

● A gyakorlati jegy:

- Csak három hiányzás megengedett.
- Minden gyakorlaton röpdolgozat: összesen 10%;
 - az előző előadáson elhangzott tételekből, definíciókból;
 - az előző heti gyakorlaton tanult készségekből.
- Írásbeli házi feladatok: összesen további 10%.
Kötelező számítógépes házi feladat.
- Két évfolyamzárthelyi: 40 – 40%;
 - az elégtelen zárthelyiket ki kell javítani;
 - javító a félév végén, a gyakorlatvezető döntése alapján;
 - Ha nem sikerül: gyakorlati jegy utóvizsga.

● A vizsgajegy:

- Csak érvényes gyakorlati jeggyel lehet vizsgázni.
- Írásbeli vizsga, az anyag megértését is méri;
- Összesen három alkalom;
egyre kell eljőnni, kivéve ha az nem sikerül.

A zárthelyik

- Első zárthelyi

A zárthelyik

- Első zárthelyi
 - Március 23, péntek, 14:00-16:00,

A zárthelyik

- **Első zárthelyi**
 - Március 23, péntek, 14:00-16:00,
 - északi tömb, -1.75 Konferenciaterem és 0.81 Ortway-terem.

A zárthelyik

- **Első zárthelyi**

- Március 23, péntek, 14:00-16:00,
- északi tömb, -1.75 Konferenciaterem és 0.81 Ortvay-terem.
- Cserébe elmarad az utolsó héten az előadás (május 15).

A zárthelyik

- **Első zárthelyi**
 - Március 23, péntek, 14:00-16:00,
 - északi tömb, -1.75 Konferenciaterem és 0.81 Ortvay-terem.
 - Cserébe elmarad az utolsó héten az előadás (május 15).
- **Második zárthelyi**

A zárthelyik

- **Első zárthelyi**

- Március 23, péntek, 14:00-16:00,
- északi tömb, -1.75 Konferenciaterem és 0.81 Ortvay-terem.
- Cserébe elmarad az utolsó héten az előadás (május 15).

- **Második zárthelyi**

- Május 9, szerda, 16:00-18:00,

A zárthelyik

● Első zárthelyi

- Március 23, péntek, 14:00-16:00,
- északi tömb, -1.75 Konferenciaterem és 0.81 Ortvay-terem.
- Cserébe elmarad az utolsó héten az előadás (május 15).

● Második zárthelyi

- Május 9, szerda, 16:00-18:00,
- déli tömb, 0-821 Bolyai János és 0-803 Szabó József terem.

A zárthelyik

● Első zárthelyi

- Március 23, péntek, 14:00-16:00,
- északi tömb, -1.75 Konferenciaterem és 0.81 Ortvay-terem.
- Cserébe elmarad az utolsó héten az előadás (május 15).

● Második zárthelyi

- Május 9, szerda, 16:00-18:00,
- déli tömb, 0-821 Bolyai János és 0-803 Szabó József terem.
- Cserébe elmaradnak az utolsó heti gyakorlatok (május 14–18).

A zárthelyik

- **Első zárthelyi**

- Március 23, péntek, 14:00-16:00,
- északi tömb, -1.75 Konferenciaterem és 0.81 Ortway-terem.
- Cserébe elmarad az utolsó héten az előadás (május 15).

- **Második zárthelyi**

- Május 9, szerda, 16:00-18:00,
- déli tömb, 0-821 Bolyai János és 0-803 Szabó József terem.
- Cserébe elmaradnak az utolsó heti gyakorlatok (május 14–18).

- **Javító zárthelyi**

A zárthelyik

● Első zárthelyi

- Március 23, péntek, 14:00-16:00,
- északi tömb, -1.75 Konferenciaterem és 0.81 Ortway-terem.
- Cserébe elmarad az utolsó héten az előadás (május 15).

● Második zárthelyi

- Május 9, szerda, 16:00-18:00,
- déli tömb, 0-821 Bolyai János és 0-803 Szabó József terem.
- Cserébe elmaradnak az utolsó heti gyakorlatok (május 14–18).

● Javító zárthelyi

- Május 21, hétfő, 9:00-12:00,

A zárthelyik

● Első zárthelyi

- Március 23, péntek, 14:00-16:00,
- északi tömb, -1.75 Konferenciaterem és 0.81 Ortvay-terem.
- Cserébe elmarad az utolsó héten az előadás (május 15).

● Második zárthelyi

- Május 9, szerda, 16:00-18:00,
- déli tömb, 0-821 Bolyai János és 0-803 Szabó József terem.
- Cserébe elmaradnak az utolsó heti gyakorlatok (május 14–18).

● Javító zárthelyi

- Május 21, hétfő, 9:00-12:00,
- déli tömb, 0-822 Mogyoródi József terem.

A zárthelyik

● Első zárthelyi

- Március 23, péntek, 14:00-16:00,
- északi tömb, -1.75 Konferenciaterem és 0.81 Ortvyay-terem.
- Cserébe elmarad az utolsó héten az előadás (május 15).

● Második zárthelyi

- Május 9, szerda, 16:00-18:00,
- déli tömb, 0-821 Bolyai János és 0-803 Szabó József terem.
- Cserébe elmaradnak az utolsó heti gyakorlatok (május 14–18).

● Javító zárthelyi

- Május 21, hétfő, 9:00-12:00,
- déli tömb, 0-822 Mogyoródi József terem.

● Gyakorlati jegy utóvizsga

A zárthelyik

● Első zárthelyi

- Március 23, péntek, 14:00-16:00,
- északi tömb, -1.75 Konferenciaterem és 0.81 Ortvyay-terem.
- Cserébe elmarad az utolsó héten az előadás (május 15).

● Második zárthelyi

- Május 9, szerda, 16:00-18:00,
- déli tömb, 0-821 Bolyai János és 0-803 Szabó József terem.
- Cserébe elmaradnak az utolsó heti gyakorlatok (május 14–18).

● Javító zárthelyi

- Május 21, hétfő, 9:00-12:00,
- déli tömb, 0-822 Mogyoródi József terem.

● Gyakorlati jegy utóvizsga

- Május 24, csütörtök, 9:00-11:00,

A zárthelyik

● Első zárthelyi

- Március 23, péntek, 14:00-16:00,
- északi tömb, -1.75 Konferenciaterem és 0.81 Ortway-terem.
- Cserébe elmarad az utolsó héten az előadás (május 15).

● Második zárthelyi

- Május 9, szerda, 16:00-18:00,
- déli tömb, 0-821 Bolyai János és 0-803 Szabó József terem.
- Cserébe elmaradnak az utolsó heti gyakorlatok (május 14–18).

● Javító zárthelyi

- Május 21, hétfő, 9:00-12:00,
- déli tömb, 0-822 Mogyoródi József terem.

● Gyakorlati jegy utóvizsga

- Május 24, csütörtök, 9:00-11:00,
- déli tömb, 0-803 Szabó József terem.

Szintválasztás

- Csak az első tanítási hét végéig váltható szint!

Szintválasztás

- **Csak az első tanítási hét végéig váltható szint!**
 - Hármasnál kisebb algebra átlaggal alapszint,

Szintválasztás

- **Csak az első tanítási hét végéig váltható szint!**
 - Hármasnál kisebb algebra átlaggal alapszint,
 - legalább négyes algebra átlaggal középszint javasolt.

Szintválasztás

- **Csak az első tanítási hét végéig váltható szint!**
 - Hármasnál kisebb algebra átlaggal alapszint,
 - legalább négyes algebra átlaggal középszint javasolt.
 - Alapszinten: fogalmak, tételek, eljárások megértése.

Szintválasztás

- **Csak az első tanítási hét végéig váltható szint!**
 - Hármasnál kisebb algebra átlaggal alapszint,
 - legalább négyes algebra átlaggal középszint javasolt.
 - Alapszinten: fogalmak, tételek, eljárások megértése.
 - Középszinten: absztrakt fogalmak, bizonyítások is.

Szintválasztás

- **Csak az első tanítási hét végéig váltható szint!**
 - Hármasnál kisebb algebra átlaggal alapszint,
 - legalább négyes algebra átlaggal középszint javasolt.
 - Alapszinten: fogalmak, tételek, eljárások megértése.
 - Középszinten: absztrakt fogalmak, bizonyítások is.
 - A középszintű anyag részletei kellene

Szintválasztás

- **Csak az első tanítási hét végéig váltható szint!**
 - Hármasnál kisebb algebra átlaggal alapszint,
 - legalább négyes algebra átlaggal középszint javasolt.
 - Alapszinten: fogalmak, tételek, eljárások megértése.
 - Középszinten: absztrakt fogalmak, bizonyítások is.
 - A középszintű anyag részletei kellene
 - matematikus

Szintválasztás

- **Csak az első tanítási hét végéig váltható szint!**
 - Hármasnál kisebb algebra átlaggal alapszint,
 - legalább négyes algebra átlaggal középszint javasolt.
 - Alapszinten: fogalmak, tételek, eljárások megértése.
 - Középszinten: absztrakt fogalmak, bizonyítások is.
 - A középszintű anyag részletei kellene
 - matematikus
 - alkalmazott matematikus

Szintválasztás

- **Csak az első tanítási hét végéig váltható szint!**
 - Hármasnál kisebb algebra átlaggal alapszint,
 - legalább négyes algebra átlaggal középszint javasolt.
 - Alapszinten: fogalmak, tételek, eljárások megértése.
 - Középszinten: absztrakt fogalmak, bizonyítások is.
 - A középszintű anyag részletei kellene
 - matematikus
 - alkalmazott matematikus
 - matematika tanári szakirányon.

Szintválasztás

- **Csak az első tanítási hét végéig váltható szint!**
 - Hármasnál kisebb algebra átlaggal alapszint,
 - legalább négyes algebra átlaggal középszint javasolt.
 - Alapszinten: fogalmak, tételek, eljárások megértése.
 - Középszinten: absztrakt fogalmak, bizonyítások is.
 - A középszintű anyag részletei kellene
 - matematikus
 - alkalmazott matematikus
 - matematika tanári szakirányon.
 - Aki alapszintre jár, de ezekre a szakirányokra készül, az kövesse a középszintű anyagrészeket is a két ajánlott tankönyv segítségével.

Szintválasztás

- **Csak az első tanítási hét végéig váltható szint!**
 - Hármasnál kisebb algebra átlaggal alapszint,
 - legalább négyes algebra átlaggal középszint javasolt.
 - Alapszinten: fogalmak, tételek, eljárások megértése.
 - Középszinten: absztrakt fogalmak, bizonyítások is.
 - A középszintű anyag részletei kellene
 - matematikus
 - alkalmazott matematikus
 - matematika tanári szakirányon.
 - Aki alapszintre jár, de ezekre a szakirányokra készül, az kövesse a középszintű anyagrészeket is a két ajánlott tankönyv segítségével.
- A számonkérés közös lesz alap- és középszinten.

Szintválasztás

- **Csak az első tanítási hét végéig váltható szint!**
 - Hármasnál kisebb algebra átlaggal alapszint,
 - legalább négyes algebra átlaggal középszint javasolt.
 - Alapszinten: fogalmak, tételek, eljárások megértése.
 - Középszinten: absztrakt fogalmak, bizonyítások is.
 - A középszintű anyag részletei kellene
 - matematikus
 - alkalmazott matematikus
 - matematika tanári szakirányon.
 - Aki alapszintre jár, de ezekre a szakirányokra készül, az kövesse a középszintű anyagrészeket is a két ajánlott tankönyv segítségével.
- A számonkérés közös lesz alap- és középszinten.
- Másodévtől már nincsenek szintek.

Oszlopvektorok

Definíció

Legyen T test.

Oszlopvektorok

Definíció

Legyen T test. A T fölötti n magasságú **oszlopvektorok** az

$$\begin{bmatrix} a_1 \\ \dots \\ a_n \end{bmatrix}$$

alakú „táblázatok”,

Oszlopvektorok

Definíció

Legyen T test. A T fölötti n magasságú **oszlopvektorok** az

$$\begin{bmatrix} a_1 \\ \dots \\ a_n \end{bmatrix}$$

alakú „táblázatok”, ahol $a_1, \dots, a_n \in T$.

Oszlopvektorok

Definíció

Legyen T test. A T fölötti n magasságú **oszlopvektorok** az

$$\begin{bmatrix} a_1 \\ \dots \\ a_n \end{bmatrix}$$

alakú „táblázatok”, ahol $a_1, \dots, a_n \in T$. Ezek halmaza T^n .

Oszlopvektorok

Definíció

Legyen T test. A T fölötti n magasságú **oszlopvektorok** az

$$\begin{bmatrix} a_1 \\ \dots \\ a_n \end{bmatrix}$$

alakú „táblázatok”, ahol $a_1, \dots, a_n \in T$. Ezek halmaza T^n .

Definíció

Legyen T test, és értelmezzük T^n -en az

Oszlopvektorok

Definíció

Legyen T test. A T fölötti n magasságú **oszlopvektorok** az

$$\begin{bmatrix} a_1 \\ \dots \\ a_n \end{bmatrix}$$

alakú „táblázatok”, ahol $a_1, \dots, a_n \in T$. Ezek halmaza T^n .

Definíció

Legyen T test, és értelmezzük T^n -en az

összeadást

Oszlopvektorok

Definíció

Legyen T test. A T fölötti n magasságú **oszlopvektorok** az

$$\begin{bmatrix} a_1 \\ \dots \\ a_n \end{bmatrix}$$

alakú „táblázatok”, ahol $a_1, \dots, a_n \in T$. Ezek halmaza T^n .

Definíció

Legyen T test, és értelmezzük T^n -en az

$$\begin{bmatrix} a_1 \\ \dots \\ a_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b_1 \\ \dots \\ b_n \end{bmatrix} =$$

összeadást

Oszlopvektorok

Definíció

Legyen T test. A T fölötti n magasságú **oszlopvektorok** az

$$\begin{bmatrix} a_1 \\ \dots \\ a_n \end{bmatrix}$$

alakú „táblázatok”, ahol $a_1, \dots, a_n \in T$. Ezek halmaza T^n .

Definíció

Legyen T test, és értelmezzük T^n -en az

$$\begin{bmatrix} a_1 \\ \dots \\ a_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b_1 \\ \dots \\ b_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 + b_1 \\ \dots \\ a_n + b_n \end{bmatrix}$$

összeadást

Oszlopvektorok

Definíció

Legyen T test. A T fölötti n magasságú **oszlopvektorok** az

$$\begin{bmatrix} a_1 \\ \dots \\ a_n \end{bmatrix}$$

alakú „táblázatok”, ahol $a_1, \dots, a_n \in T$. Ezek halmaza T^n .

Definíció

Legyen T test, és értelmezzük T^n -en az

$$\begin{bmatrix} a_1 \\ \dots \\ a_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b_1 \\ \dots \\ b_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 + b_1 \\ \dots \\ a_n + b_n \end{bmatrix}$$

összeadást és a λ skalárral szorzást.

Oszlopvektorok

Definíció

Legyen T test. A T fölötti n magasságú **oszlopvektorok** az

$$\begin{bmatrix} a_1 \\ \dots \\ a_n \end{bmatrix}$$

alakú „táblázatok”, ahol $a_1, \dots, a_n \in T$. Ezek halmaza T^n .

Definíció

Legyen T test, és értelmezzük T^n -en az

$$\begin{bmatrix} a_1 \\ \dots \\ a_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b_1 \\ \dots \\ b_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 + b_1 \\ \dots \\ a_n + b_n \end{bmatrix} \quad \text{és} \quad \lambda \begin{bmatrix} a_1 \\ \dots \\ a_n \end{bmatrix} =$$

összeadást és a λ **skalárral szorzást**.

Oszlopvektorok

Definíció

Legyen T test. A T fölötti n magasságú **oszlopvektorok** az

$$\begin{bmatrix} a_1 \\ \dots \\ a_n \end{bmatrix}$$

alakú „táblázatok”, ahol $a_1, \dots, a_n \in T$. Ezek halmaza T^n .

Definíció

Legyen T test, és értelmezzük T^n -en az

$$\begin{bmatrix} a_1 \\ \dots \\ a_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b_1 \\ \dots \\ b_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 + b_1 \\ \dots \\ a_n + b_n \end{bmatrix} \quad \text{és} \quad \lambda \begin{bmatrix} a_1 \\ \dots \\ a_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda a_1 \\ \dots \\ \lambda a_n \end{bmatrix}$$

képletekkel az **összeadást** és a λ **skalárral szorzást**.

Oszlopvektorok

Definíció

Legyen T test. A T fölötti n magasságú **oszlopvektorok** az

$$\begin{bmatrix} a_1 \\ \dots \\ a_n \end{bmatrix}$$

alakú „táblázatok”, ahol $a_1, \dots, a_n \in T$. Ezek halmaza T^n .

Definíció

Legyen T test, és értelmezzük T^n -en az

$$\begin{bmatrix} a_1 \\ \dots \\ a_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b_1 \\ \dots \\ b_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 + b_1 \\ \dots \\ a_n + b_n \end{bmatrix} \quad \text{és} \quad \lambda \begin{bmatrix} a_1 \\ \dots \\ a_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda a_1 \\ \dots \\ \lambda a_n \end{bmatrix}$$

képletekkel az **összeadást** és a λ **skalárral szorzást**.

Azaz összeadni és skalárral szorozni **komponensenként** kell.

Az összeadás tulajdonságai

Tétel (HF ellenőrizni)

Tetszőleges $u, v, w \in T^n$ vektorokra

Az összeadás tulajdonságai

Tétel (HF ellenőrizni)

Tetszőleges $u, v, w \in T^n$ vektorokra

(1) $(u + v) + w = u + (v + w)$ (az összeadás **asszociatív**).

Az összeadás tulajdonságai

Tétel (HF ellenőrizni)

Tetszőleges $u, v, w \in T^n$ vektorokra

- (1) $(u + v) + w = u + (v + w)$ (az összeadás **asszociatív**).
- (2) $u + v = v + u$ (az összeadás **kommutatív**).

Az összeadás tulajdonságai

Tétel (HF ellenőrizni)

Tetszőleges $u, v, w \in T^n$ vektorokra

- (1) $(u + v) + w = u + (v + w)$ (az összeadás **asszociatív**).
- (2) $u + v = v + u$ (az összeadás **kommutatív**).

A **nullvektor**

Az összeadás tulajdonságai

Tétel (HF ellenőrizni)

Tetszőleges $u, v, w \in T^n$ vektorokra

- (1) $(u + v) + w = u + (v + w)$ (az összeadás **asszociatív**).
- (2) $u + v = v + u$ (az összeadás **kommutatív**).

A **nullvektor** $0 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dots \\ 0 \end{bmatrix}$

Az összeadás tulajdonságai

Tétel (HF ellenőrizni)

Tetszőleges $u, v, w \in T^n$ vektorokra

- (1) $(u + v) + w = u + (v + w)$ (az összeadás **asszociatív**).
- (2) $u + v = v + u$ (az összeadás **kommutatív**).

A **nullvektor** $0 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dots \\ 0 \end{bmatrix}$

(minden komponens T nulleleme)

Az összeadás tulajdonságai

Tétel (HF ellenőrizni)

Tetszőleges $u, v, w \in T^n$ vektorokra

- (1) $(u + v) + w = u + (v + w)$ (az összeadás **asszociatív**).
- (2) $u + v = v + u$ (az összeadás **kommutatív**).
- (3) $u + 0 = 0 + u = u$ (0 a **nullvektor**).

A **nullvektor** $0 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dots \\ 0 \end{bmatrix}$

(minden komponens T nulleleme)

Az összeadás tulajdonságai

Tétel (HF ellenőrizni)

Tetszőleges $u, v, w \in T^n$ vektorokra

- (1) $(u + v) + w = u + (v + w)$ (az összeadás **asszociatív**).
- (2) $u + v = v + u$ (az összeadás **kommutatív**).
- (3) $u + 0 = 0 + u = u$ (0 a **nullvektor**).

A **nullvektor** $0 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dots \\ 0 \end{bmatrix}$ és az **ellentett**:

(minden komponens T nulleleme)

Az összeadás tulajdonságai

Tétel (HF ellenőrizni)

Tetszőleges $u, v, w \in T^n$ vektorokra

- (1) $(u + v) + w = u + (v + w)$ (az összeadás **asszociatív**).
- (2) $u + v = v + u$ (az összeadás **kommutatív**).
- (3) $u + 0 = 0 + u = u$ (0 a **nullvektor**).

A **nullvektor** $0 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dots \\ 0 \end{bmatrix}$ és az **ellentett**: $-\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \dots \\ a_n \end{bmatrix} =$

(minden komponens T nulleleme)

Az összeadás tulajdonságai

Tétel (HF ellenőrizni)

Tetszőleges $u, v, w \in T^n$ vektorokra

- (1) $(u + v) + w = u + (v + w)$ (az összeadás **asszociatív**).
- (2) $u + v = v + u$ (az összeadás **kommutatív**).
- (3) $u + 0 = 0 + u = u$ (0 a **nullvektor**).

A **nullvektor** $0 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dots \\ 0 \end{bmatrix}$ és az **ellentett**: $-\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \dots \\ a_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -a_1 \\ -a_2 \\ \dots \\ -a_n \end{bmatrix}$
(minden komponens T nulleleme)

Az összeadás tulajdonságai

Tétel (HF ellenőrizni)

Tetszőleges $u, v, w \in T^n$ vektorokra

- (1) $(u + v) + w = u + (v + w)$ (az összeadás **asszociatív**).
- (2) $u + v = v + u$ (az összeadás **kommutatív**).
- (3) $u + 0 = 0 + u = u$ (0 a **nullvektor**).

A **nullvektor** $0 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dots \\ 0 \end{bmatrix}$ és az **ellentett**: $-\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \dots \\ a_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -a_1 \\ -a_2 \\ \dots \\ -a_n \end{bmatrix}$
(minden komponens T nulleleme) (komponensenkénti ellentett)

Az összeadás tulajdonságai

Tétel (HF ellenőrizni)

Tetszőleges $u, v, w \in T^n$ vektorokra

- (1) $(u + v) + w = u + (v + w)$ (az összeadás **asszociatív**).
- (2) $u + v = v + u$ (az összeadás **kommutatív**).
- (3) $u + 0 = 0 + u = u$ (0 a **nullvektor**).
- (4) $u + (-u) = (-u) + u = 0$ ($-u$ az u **ellentettje**).

A **nullvektor** $0 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dots \\ 0 \end{bmatrix}$ és az **ellentett**: $-\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \dots \\ a_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -a_1 \\ -a_2 \\ \dots \\ -a_n \end{bmatrix}$

(minden komponens T nulleleme) (komponensenkénti ellentett)

A skalárral szorzás tulajdonságai

Tétel (HF ellenőrizni)

Tetszőleges $u, v \in T^n$ vektorokra, és λ, μ skalárokra

A skalárral szorzás tulajdonságai

Tétel (HF ellenőrizni)

Tetszőleges $u, v \in T^n$ vektorokra, és λ, μ skalárokra

$$(5) (\lambda + \mu)u = \lambda u + \mu u.$$

A skalárral szorzás tulajdonságai

Tétel (HF ellenőrizni)

Tetszőleges $u, v \in T^n$ vektorokra, és λ, μ skalárokra

$$(5) (\lambda + \mu)u = \lambda u + \mu u.$$

$$(6) \lambda(u + v) = \lambda u + \lambda v.$$

A skalárral szorzás tulajdonságai

Tétel (HF ellenőrizni)

Tetszőleges $u, v \in T^n$ vektorokra, és λ, μ skalárokra

$$(5) \quad (\lambda + \mu)u = \lambda u + \mu u.$$

$$(6) \quad \lambda(u + v) = \lambda u + \lambda v.$$

$$(7) \quad (\lambda\mu)u = \lambda(\mu u).$$

A skalárral szorzás tulajdonságai

Tétel (HF ellenőrizni)

Tetszőleges $u, v \in T^n$ vektorokra, és λ, μ skalárokra

$$(5) \quad (\lambda + \mu)u = \lambda u + \mu u.$$

$$(6) \quad \lambda(u + v) = \lambda u + \lambda v.$$

$$(7) \quad (\lambda\mu)u = \lambda(\mu u).$$

$$(8) \quad 1 \cdot u = u \text{ (ahol } 1 \text{ a } T \text{ test } \textbf{egységeleme}).$$

A skalárral szorzás tulajdonságai

Tétel (HF ellenőrizni)

Tetszőleges $u, v \in T^n$ vektorokra, és λ, μ skalárokra

$$(5) (\lambda + \mu)u = \lambda u + \mu u.$$

$$(6) \lambda(u + v) = \lambda u + \lambda v.$$

$$(7) (\lambda\mu)u = \lambda(\mu u).$$

$$(8) 1 \cdot u = u \text{ (ahol } 1 \text{ a } T \text{ test } \textbf{egységeleme}).$$

További példák ilyen tulajdonságú műveletekre.

A skalárral szorzás tulajdonságai

Tétel (HF ellenőrizni)

Tetszőleges $u, v \in T^n$ vektorokra, és λ, μ skalárokra

$$(5) (\lambda + \mu)u = \lambda u + \mu u.$$

$$(6) \lambda(u + v) = \lambda u + \lambda v.$$

$$(7) (\lambda\mu)u = \lambda(\mu u).$$

$$(8) 1 \cdot u = u \text{ (ahol } 1 \text{ a } T \text{ test } \textbf{egységeleme}).$$

További példák ilyen tulajdonságú műveletekre.

- A $T^{n \times m}$ -beli mátrixok.

A skalárral szorzás tulajdonságai

Tétel (HF ellenőrizni)

Tetszőleges $u, v \in T^n$ vektorokra, és λ, μ skalárookra

$$(5) (\lambda + \mu)u = \lambda u + \mu u.$$

$$(6) \lambda(u + v) = \lambda u + \lambda v.$$

$$(7) (\lambda\mu)u = \lambda(\mu u).$$

$$(8) 1 \cdot u = u \text{ (ahol } 1 \text{ a } T \text{ test } \textbf{egységeleme}).$$

További példák ilyen tulajdonságú műveletekre.

- A $T^{n \times m}$ -beli mátrixok.
- A $T[x]$ polinomjai.

A skalárral szorzás tulajdonságai

Tétel (HF ellenőrizni)

Tetszőleges $u, v \in T^n$ vektorokra, és λ, μ skalárookra

$$(5) (\lambda + \mu)u = \lambda u + \mu u.$$

$$(6) \lambda(u + v) = \lambda u + \lambda v.$$

$$(7) (\lambda\mu)u = \lambda(\mu u).$$

$$(8) 1 \cdot u = u \text{ (ahol } 1 \text{ a } T \text{ test } \textbf{egységeleme}).$$

További példák ilyen tulajdonságú műveletekre.

- A $T^{n \times m}$ -beli mátrixok.
- A $T[x]$ polinomjai.
- Valós függvények, egyenletek.

A skalárral szorzás tulajdonságai

Tétel (HF ellenőrizni)

Tetszőleges $u, v \in T^n$ vektorokra, és λ, μ skalárookra

$$(5) (\lambda + \mu)u = \lambda u + \mu u.$$

$$(6) \lambda(u + v) = \lambda u + \lambda v.$$

$$(7) (\lambda\mu)u = \lambda(\mu u).$$

$$(8) 1 \cdot u = u \text{ (ahol } 1 \text{ a } T \text{ test } \textbf{egységeleme}).$$

További példák ilyen tulajdonságú műveletekre.

- A $T^{n \times m}$ -beli mátrixok.
- A $T[x]$ polinomjai.
- Valós függvények, egyenletek.

Mind összeadhatók és (a megfelelő) skalárokkal szorozhatók.

A vektortér fogalma

Definíció

T test (elemei a **skalárok**),

A vektortér fogalma

Definíció

T test (elemei a **skalárok**), V halmaz (elemei a **vektorok**).

A vektortér fogalma

Definíció

T test (elemei a **skalárok**), V halmaz (elemei a **vektorok**).
 V **vektortér** T fölött, ha értelmezett a V -beli $+$ összeadás,

A vektortér fogalma

Definíció

T test (elemei a **skalárok**), V halmaz (elemei a **vektorok**).
 V **vektortér** T fölött, ha értelmezett a V -beli $+$ összeadás,
továbbá a skalárral szorzás

A vektortér fogalma

Definíció

T test (elemei a **skalárok**), V halmaz (elemei a **vektorok**).
 V **vektortér** T fölött, ha értelmezett a V -beli $+$ összeadás,
továbbá a skalárral szorzás (skalárszor vektor = vektor)

A vektortér fogalma

Definíció

T test (elemei a **skalárok**), V halmaz (elemei a **vektorok**).
 V **vektortér** T fölött, ha értelmezett a V -beli $+$ összeadás,
továbbá a skalárral szorzás (skalárszor vektor = vektor) úgy,
hogy tetszőleges $u, v, w \in V$ és $\lambda, \mu \in T$ esetén

A vektortér fogalma

Definíció

T test (elemei a **skalárok**), V halmaz (elemei a **vektorok**).
 V **vektortér** T fölött, ha értelmezett a V -beli $+$ összeadás, továbbá a skalárral szorzás (skalárszor vektor = vektor) úgy, hogy tetszőleges $u, v, w \in V$ és $\lambda, \mu \in T$ esetén

(1) $(u + v) + w = u + (v + w)$ (az összeadás **asszociatív**).

A vektortér fogalma

Definíció

T test (elemei a **skalárok**), V halmaz (elemei a **vektorok**).
 V **vektortér** T fölött, ha értelmezett a V -beli $+$ összeadás, továbbá a skalárral szorzás (skalárszor vektor = vektor) úgy, hogy tetszőleges $u, v, w \in V$ és $\lambda, \mu \in T$ esetén

- (1) $(u + v) + w = u + (v + w)$ (az összeadás **asszociatív**).
- (2) $u + v = v + u$ (az összeadás **kommutatív**).

A vektortér fogalma

Definíció

T test (elemei a **skalárok**), V halmaz (elemei a **vektorok**).
 V **vektortér** T fölött, ha értelmezett a V -beli $+$ összeadás, továbbá a skalárral szorzás (skalárszor vektor = vektor) úgy, hogy tetszőleges $u, v, w \in V$ és $\lambda, \mu \in T$ esetén

- (1) $(u + v) + w = u + (v + w)$ (az összeadás **asszociatív**).
- (2) $u + v = v + u$ (az összeadás **kommutatív**).
- (3) $u + 0 = 0 + u = u$ (**LÉTEZIK** 0 **nullvektor**).

A vektortér fogalma

Definíció

T test (elemei a **skalárok**), V halmaz (elemei a **vektorok**).
 V **vektortér** T fölött, ha értelmezett a V -beli $+$ összeadás, továbbá a skalárral szorzás (skalárszor vektor = vektor) úgy, hogy tetszőleges $u, v, w \in V$ és $\lambda, \mu \in T$ esetén

- (1) $(u + v) + w = u + (v + w)$ (az összeadás **asszociatív**).
- (2) $u + v = v + u$ (az összeadás **kommutatív**).
- (3) $u + 0 = 0 + u = u$ (**LÉTEZIK** 0 **nullvektor**).
- (4) $u + (-u) = (-u) + u = 0$ (**LÉTEZIK** $-u$, az u **ellentettje**).

A vektortér fogalma

Definíció

T test (elemei a **skalárok**), V halmaz (elemei a **vektorok**).
 V **vektortér** T fölött, ha értelmezett a V -beli $+$ összeadás, továbbá a skalárral szorzás (skalárszor vektor = vektor) úgy, hogy tetszőleges $u, v, w \in V$ és $\lambda, \mu \in T$ esetén

- (1) $(u + v) + w = u + (v + w)$ (az összeadás **asszociatív**).
- (2) $u + v = v + u$ (az összeadás **kommutatív**).
- (3) $u + 0 = 0 + u = u$ (**LÉTEZIK** 0 **nullvektor**).
- (4) $u + (-u) = (-u) + u = 0$ (**LÉTEZIK** $-u$, az u **ellentettje**).
- (5) $(\lambda + \mu)u = \lambda u + \mu u$.

A vektortér fogalma

Definíció

T test (elemei a **skalárok**), V halmaz (elemei a **vektorok**).
 V **vektortér** T fölött, ha értelmezett a V -beli $+$ összeadás, továbbá a skalárral szorzás (skalárszor vektor = vektor) úgy, hogy tetszőleges $u, v, w \in V$ és $\lambda, \mu \in T$ esetén

- (1) $(u + v) + w = u + (v + w)$ (az összeadás **asszociatív**).
- (2) $u + v = v + u$ (az összeadás **kommutatív**).
- (3) $u + 0 = 0 + u = u$ (**LÉTEZIK** 0 **nullvektor**).
- (4) $u + (-u) = (-u) + u = 0$ (**LÉTEZIK** $-u$, az u **ellentettje**).
- (5) $(\lambda + \mu)u = \lambda u + \mu u$.
- (6) $\lambda(u + v) = \lambda u + \lambda v$.

A vektortér fogalma

Definíció

T test (elemei a **skalárok**), V halmaz (elemei a **vektorok**).
 V **vektortér** T fölött, ha értelmezett a V -beli $+$ összeadás, továbbá a skalárral szorzás (skalárszor vektor = vektor) úgy, hogy tetszőleges $u, v, w \in V$ és $\lambda, \mu \in T$ esetén

- (1) $(u + v) + w = u + (v + w)$ (az összeadás **asszociatív**).
- (2) $u + v = v + u$ (az összeadás **kommutatív**).
- (3) $u + 0 = 0 + u = u$ (**LÉTEZIK** 0 **nullvektor**).
- (4) $u + (-u) = (-u) + u = 0$ (**LÉTEZIK** $-u$, az u **ellentettje**).
- (5) $(\lambda + \mu)u = \lambda u + \mu u$.
- (6) $\lambda(u + v) = \lambda u + \lambda v$.
- (7) $(\lambda\mu)u = \lambda(\mu u)$.

A vektortér fogalma

Definíció

T test (elemei a **skalárok**), V halmaz (elemei a **vektorok**).
 V **vektortér** T fölött, ha értelmezett a V -beli $+$ összeadás, továbbá a skalárral szorzás (skalárszor vektor = vektor) úgy, hogy tetszőleges $u, v, w \in V$ és $\lambda, \mu \in T$ esetén

- (1) $(u + v) + w = u + (v + w)$ (az összeadás **asszociatív**).
- (2) $u + v = v + u$ (az összeadás **kommutatív**).
- (3) $u + 0 = 0 + u = u$ (**LÉTEZIK** 0 **nullvektor**).
- (4) $u + (-u) = (-u) + u = 0$ (**LÉTEZIK** $-u$, az u **ellentettje**).
- (5) $(\lambda + \mu)u = \lambda u + \mu u$.
- (6) $\lambda(u + v) = \lambda u + \lambda v$.
- (7) $(\lambda\mu)u = \lambda(\mu u)$.
- (8) $1 \cdot u = u$ (ahol 1 a T test **egységeleme**).

Elemi következmények

Tétel (Freud, 4.1.2. Tétel)

Legyen V vektortér a T test fölött, $\lambda \in T$, $v \in V$.

Elemi következmények

Tétel (Freud, 4.1.2. Tétel)

Legyen V vektortér a T test fölött, $\lambda \in T$, $v \in V$.

(1) A V nulleleme egyértelműen meghatározott.

Elemi következmények

Tétel (Freud, 4.1.2. Tétel)

Legyen V vektortér a T test fölött, $\lambda \in T$, $v \in V$.

- (1) A V nulleleme egyértelműen meghatározott.
- (2) Minden vektor ellentettje egyértelműen meghatározott.

Elemi következmények

Tétel (Freud, 4.1.2. Tétel)

Legyen V vektortér a T test fölött, $\lambda \in T$, $v \in V$.

- (1) A V nulleleme egyértelműen meghatározott.
- (2) Minden vektor ellentettje egyértelműen meghatározott.
- (3) Minden v vektorra $0v = 0$ (itt 0 a nulla skalár).

Elemi következmények

Tétel (Freud, 4.1.2. Tétel)

Legyen V vektortér a T test fölött, $\lambda \in T$, $v \in V$.

- (1) A V nulleleme egyértelműen meghatározott.
- (2) Minden vektor ellentettje egyértelműen meghatározott.
- (3) Minden v vektorra $0v = 0$ (itt 0 a nulla skalár).
- (4) Minden λ skalárra $\lambda 0 = 0$ (itt 0 a nullvektor).

Elemi következmények

Tétel (Freud, 4.1.2. Tétel)

Legyen V vektortér a T test fölött, $\lambda \in T$, $v \in V$.

- (1) A V nulleleme egyértelműen meghatározott.
- (2) Minden vektor ellentettje egyértelműen meghatározott.
- (3) Minden v vektorra $0v = 0$ (itt 0 a nulla skalár).
- (4) Minden λ skalárra $\lambda 0 = 0$ (itt 0 a nullvektor).
- (5) Ha $\lambda v = 0$, akkor $\lambda = 0$ vagy $v = 0$.

Elemi következmények

Tétel (Freud, 4.1.2. Tétel)

Legyen V vektortér a T test fölött, $\lambda \in T$, $v \in V$.

- (1) A V nulleleme egyértelműen meghatározott.
- (2) Minden vektor ellentettje egyértelműen meghatározott.
- (3) Minden v vektorra $0v = 0$ (itt 0 a nulla skalár).
- (4) Minden λ skalárra $\lambda 0 = 0$ (itt 0 a nullvektor).
- (5) Ha $\lambda v = 0$, akkor $\lambda = 0$ vagy $v = 0$.
- (6) Minden v vektorra $(-1)v = -v$ (a v ellentettje).

Elemi következmények

Tétel (Freud, 4.1.2. Tétel)

Legyen V vektortér a T test fölött, $\lambda \in T$, $v \in V$.

- (1) A V nulleleme egyértelműen meghatározott.
- (2) Minden vektor ellentettje egyértelműen meghatározott.
- (3) Minden v vektorra $0v = 0$ (itt 0 a nulla skalár).
- (4) Minden λ skalárra $\lambda 0 = 0$ (itt 0 a nullvektor).
- (5) Ha $\lambda v = 0$, akkor $\lambda = 0$ vagy $v = 0$.
- (6) Minden v vektorra $(-1)v = -v$ (a v ellentettje).

Mintabizonyítás (5)-re

Ha $\lambda v = 0$, de $\lambda \neq 0$, akkor létezik λ^{-1} .

Elemi következmények

Tétel (Freud, 4.1.2. Tétel)

Legyen V vektortér a T test fölött, $\lambda \in T$, $v \in V$.

- (1) A V nulleleme egyértelműen meghatározott.
- (2) Minden vektor ellentettje egyértelműen meghatározott.
- (3) Minden v vektorra $0v = 0$ (itt 0 a nulla skalár).
- (4) Minden λ skalárra $\lambda 0 = 0$ (itt 0 a nullvektor).
- (5) Ha $\lambda v = 0$, akkor $\lambda = 0$ vagy $v = 0$.
- (6) Minden v vektorra $(-1)v = -v$ (a v ellentettje).

Mintabizonyítás (5)-re

Ha $\lambda v = 0$, de $\lambda \neq 0$, akkor létezik λ^{-1} .

Így $0 = \lambda^{-1}0 =$

Elemi következmények

Tétel (Freud, 4.1.2. Tétel)

Legyen V vektortér a T test fölött, $\lambda \in T$, $v \in V$.

- (1) A V nulleleme egyértelműen meghatározott.
- (2) Minden vektor ellentettje egyértelműen meghatározott.
- (3) Minden v vektorra $0v = 0$ (itt 0 a nulla skalár).
- (4) Minden λ skalárra $\lambda 0 = 0$ (itt 0 a nullvektor).
- (5) Ha $\lambda v = 0$, akkor $\lambda = 0$ vagy $v = 0$.
- (6) Minden v vektorra $(-1)v = -v$ (a v ellentettje).

Mintabizonyítás (5)-re

Ha $\lambda v = 0$, de $\lambda \neq 0$, akkor létezik λ^{-1} .

Így $0 = \lambda^{-1}0 =$

A fenti (4) miatt.

Elemi következmények

Tétel (Freud, 4.1.2. Tétel)

Legyen V vektortér a T test fölött, $\lambda \in T$, $v \in V$.

- (1) A V nulleleme egyértelműen meghatározott.
- (2) Minden vektor ellentettje egyértelműen meghatározott.
- (3) Minden v vektorra $0v = 0$ (itt 0 a nulla skalár).
- (4) Minden λ skalárra $\lambda 0 = 0$ (itt 0 a nullvektor).
- (5) Ha $\lambda v = 0$, akkor $\lambda = 0$ vagy $v = 0$.
- (6) Minden v vektorra $(-1)v = -v$ (a v ellentettje).

Mintabizonyítás (5)-re

Ha $\lambda v = 0$, de $\lambda \neq 0$, akkor létezik λ^{-1} .

Így $0 = \lambda^{-1}0 = \lambda^{-1}(\lambda v) =$

Elemi következmények

Tétel (Freud, 4.1.2. Tétel)

Legyen V vektortér a T test fölött, $\lambda \in T$, $v \in V$.

- (1) A V nulleleme egyértelműen meghatározott.
- (2) Minden vektor ellentettje egyértelműen meghatározott.
- (3) Minden v vektorra $0v = 0$ (itt 0 a nulla skalár).
- (4) Minden λ skalárra $\lambda 0 = 0$ (itt 0 a nullvektor).
- (5) Ha $\lambda v = 0$, akkor $\lambda = 0$ vagy $v = 0$.
- (6) Minden v vektorra $(-1)v = -v$ (a v ellentettje).

Mintabizonyítás (5)-re

Ha $\lambda v = 0$, de $\lambda \neq 0$, akkor létezik λ^{-1} .

$$\text{Így } 0 = \lambda^{-1}0 = \lambda^{-1}(\lambda v) = (\lambda^{-1}\lambda)v =$$

Elemi következmények

Tétel (Freud, 4.1.2. Tétel)

Legyen V vektortér a T test fölött, $\lambda \in T$, $v \in V$.

- (1) A V nulleleme egyértelműen meghatározott.
- (2) Minden vektor ellentettje egyértelműen meghatározott.
- (3) Minden v vektorra $0v = 0$ (itt 0 a nulla skalár).
- (4) Minden λ skalárra $\lambda 0 = 0$ (itt 0 a nullvektor).
- (5) Ha $\lambda v = 0$, akkor $\lambda = 0$ vagy $v = 0$.
- (6) Minden v vektorra $(-1)v = -v$ (a v ellentettje).

Mintabizonyítás (5)-re

Ha $\lambda v = 0$, de $\lambda \neq 0$, akkor létezik λ^{-1} .

$$\text{Így } 0 = \lambda^{-1}0 = \lambda^{-1}(\lambda v) = (\lambda^{-1}\lambda)v =$$

A (7) vektortéraxióma miatt.

Elemi következmények

Tétel (Freud, 4.1.2. Tétel)

Legyen V vektortér a T test fölött, $\lambda \in T$, $v \in V$.

- (1) A V nulleleme egyértelműen meghatározott.
- (2) Minden vektor ellentettje egyértelműen meghatározott.
- (3) Minden v vektorra $0v = 0$ (itt 0 a nulla skalár).
- (4) Minden λ skalárra $\lambda 0 = 0$ (itt 0 a nullvektor).
- (5) Ha $\lambda v = 0$, akkor $\lambda = 0$ vagy $v = 0$.
- (6) Minden v vektorra $(-1)v = -v$ (a v ellentettje).

Mintabizonyítás (5)-re

Ha $\lambda v = 0$, de $\lambda \neq 0$, akkor létezik λ^{-1} .

$$\text{Így } 0 = \lambda^{-1}0 = \lambda^{-1}(\lambda v) = (\lambda^{-1}\lambda)v = 1v =$$

Elemi következmények

Tétel (Freud, 4.1.2. Tétel)

Legyen V vektortér a T test fölött, $\lambda \in T$, $v \in V$.

- (1) A V nulleleme egyértelműen meghatározott.
- (2) Minden vektor ellentettje egyértelműen meghatározott.
- (3) Minden v vektorra $0v = 0$ (itt 0 a nulla skalár).
- (4) Minden λ skalárra $\lambda 0 = 0$ (itt 0 a nullvektor).
- (5) Ha $\lambda v = 0$, akkor $\lambda = 0$ vagy $v = 0$.
- (6) Minden v vektorra $(-1)v = -v$ (a v ellentettje).

Mintabizonyítás (5)-re

Ha $\lambda v = 0$, de $\lambda \neq 0$, akkor létezik λ^{-1} .

$$\text{Így } 0 = \lambda^{-1}0 = \lambda^{-1}(\lambda v) = (\lambda^{-1}\lambda)v = 1v = v$$

Elemi következmények

Tétel (Freud, 4.1.2. Tétel)

Legyen V vektortér a T test fölött, $\lambda \in T$, $v \in V$.

- (1) A V nulleleme egyértelműen meghatározott.
- (2) Minden vektor ellentettje egyértelműen meghatározott.
- (3) Minden v vektorra $0v = 0$ (itt 0 a nulla skalár).
- (4) Minden λ skalárra $\lambda 0 = 0$ (itt 0 a nullvektor).
- (5) Ha $\lambda v = 0$, akkor $\lambda = 0$ vagy $v = 0$.
- (6) Minden v vektorra $(-1)v = -v$ (a v ellentettje).

Mintabizonyítás (5)-re

Ha $\lambda v = 0$, de $\lambda \neq 0$, akkor létezik λ^{-1} .

$$\text{Így } 0 = \lambda^{-1}0 = \lambda^{-1}(\lambda v) = (\lambda^{-1}\lambda)v = 1v = v$$

A (8) vektortéraxióma miatt.

Elemi következmények

Tétel (Freud, 4.1.2. Tétel)

Legyen V vektortér a T test fölött, $\lambda \in T$, $v \in V$.

- (1) A V nulleleme egyértelműen meghatározott.
- (2) Minden vektor ellentettje egyértelműen meghatározott.
- (3) Minden v vektorra $0v = 0$ (itt 0 a nulla skalár).
- (4) Minden λ skalárra $\lambda 0 = 0$ (itt 0 a nullvektor).
- (5) Ha $\lambda v = 0$, akkor $\lambda = 0$ vagy $v = 0$.
- (6) Minden v vektorra $(-1)v = -v$ (a v ellentettje).

Mintabizonyítás (5)-re

Ha $\lambda v = 0$, de $\lambda \neq 0$, akkor létezik λ^{-1} .

Így $0 = \lambda^{-1}0 = \lambda^{-1}(\lambda v) = (\lambda^{-1}\lambda)v = 1v = v$. □

Az altér fogalma

Definíció

Legyen V vektortér a T test fölött.

Az altér fogalma

Definíció

Legyen V vektortér a T test fölött. A $W \subseteq V$ részhalmaz **altér**,

Az altér fogalma

Definíció

Legyen V vektortér a T test fölött. A $W \subseteq V$ részhalmaz **altér**, ha maga is vektortér V műveleteire nézve.

Az altér fogalma

Definíció

Legyen V vektortér a T test fölött. A $W \subseteq V$ részhalmaz **altér**, ha maga is vektortér V műveleteire nézve.

Példák

(1) V a sík vektorai \mathbb{R} fölött.

Az altér fogalma

Definíció

Legyen V vektortér a T test fölött. A $W \subseteq V$ részhalmaz **altér**, ha maga is vektortér V műveleteire nézve.

Példák

- (1) V a sík vektorai \mathbb{R} fölött.
 W az x -tengellyel párhuzamos vektorok.

Az altér fogalma

Definíció

Legyen V vektortér a T test fölött. A $W \subseteq V$ részhalmaz **altér**, ha maga is vektortér V műveleteire nézve.

Példák

- (1) V a sík vektorai \mathbb{R} fölött.
 W az x -tengellyel párhuzamos vektorok.
- (2) $V = \mathbb{Q}[x]$ a \mathbb{Q} fölött.

Az altér fogalma

Definíció

Legyen V vektortér a T test fölött. A $W \subseteq V$ részhalmaz **altér**, ha maga is vektortér V műveleteire nézve.

Példák

- (1) V a sík vektorai \mathbb{R} fölött.
 W az x -tengellyel párhuzamos vektorok.
- (2) $V = \mathbb{Q}[x]$ a \mathbb{Q} fölött.
 W azok a polinomok, amelyeknek az 1 gyöke.

Az altér fogalma

Definíció

Legyen V vektortér a T test fölött. A $W \subseteq V$ részhalmaz **altér**, ha maga is vektortér V műveleteire nézve.

Példák

- (1) V a sík vektorai \mathbb{R} fölött.
 W az x -tengellyel párhuzamos vektorok.
- (2) $V = \mathbb{Q}[x]$ a \mathbb{Q} fölött.
 W azok a polinomok, amelyeknek az 1 gyöke.
- (3) V a valós függvények \mathbb{R} fölött.

Az altér fogalma

Definíció

Legyen V vektortér a T test fölött. A $W \subseteq V$ részhalmaz **altér**, ha maga is vektortér V műveleteire nézve.

Példák

- (1) V a sík vektorai \mathbb{R} fölött.
 W az x -tengellyel párhuzamos vektorok.
- (2) $V = \mathbb{Q}[x]$ a \mathbb{Q} fölött.
 W azok a polinomok, amelyeknek az 1 gyöke.
- (3) V a valós függvények \mathbb{R} fölött.
 W a folytonos függvények.

Az altér fogalma

Definíció

Legyen V vektortér a T test fölött. A $W \subseteq V$ részhalmaz **altér**, ha maga is vektortér V műveleteire nézve.

Példák

- (1) V a sík vektorai \mathbb{R} fölött.
 W az x -tengellyel párhuzamos vektorok.
- (2) $V = \mathbb{Q}[x]$ a \mathbb{Q} fölött.
 W azok a polinomok, amelyeknek az 1 gyöke.
- (3) V a valós függvények \mathbb{R} fölött.
 W a folytonos függvények.
- (4) V a kétszer kettes komplex mátrixok \mathbb{C} fölött.

Az altér fogalma

Definíció

Legyen V vektortér a T test fölött. A $W \subseteq V$ részhalmaz **altér**, ha maga is vektortér V műveleteire nézve.

Példák

- (1) V a sík vektorai \mathbb{R} fölött.
 W az x -tengellyel párhuzamos vektorok.
- (2) $V = \mathbb{Q}[x]$ a \mathbb{Q} fölött.
 W azok a polinomok, amelyeknek az 1 gyöke.
- (3) V a valós függvények \mathbb{R} fölött.
 W a folytonos függvények.
- (4) V a kétszer kettes komplex mátrixok \mathbb{C} fölött.
 W a felső háromszögmátrixok.

Az altér jellemzése

Tétel (Freud, 4.2.2. Tétel)

Legyen V vektortér a T test fölött.

Az altér jellemzése

Tétel (Freud, 4.2.2. Tétel)

Legyen V vektortér a T test fölött.

A $W \subseteq V$ nem üres részhalmaz akkor és csak akkor altér, ha

Az altér jellemzése

Tétel (Freud, 4.2.2. Tétel)

Legyen V vektortér a T test fölött.

A $W \subseteq V$ nem üres részhalmaz akkor és csak akkor altér, ha

- (1) W **zárt az összeadásra**,

Az altér jellemzése

Tétel (Freud, 4.2.2. Tétel)

Legyen V vektortér a T test fölött.

A $W \subseteq V$ nem üres részhalmaz akkor és csak akkor altér, ha

- (1) W **zárt az összeadásra**,
azaz tetszőleges $w_1, w_2 \in W$ esetén $w_1 + w_2 \in W$.

Az altér jellemzése

Tétel (Freud, 4.2.2. Tétel)

Legyen V vektortér a T test fölött.

A $W \subseteq V$ nem üres részhalmaz akkor és csak akkor altér, ha

- (1) W **zárt az összeadásra**,
azaz tetszőleges $w_1, w_2 \in W$ esetén $w_1 + w_2 \in W$.
- (2) W **zárt a skalárral szorzásra**,

Az altér jellemzése

Tétel (Freud, 4.2.2. Tétel)

Legyen V vektortér a T test fölött.

A $W \subseteq V$ nem üres részhalmaz akkor és csak akkor altér, ha

- (1) W **zárt az összeadásra**,
azaz tetszőleges $w_1, w_2 \in W$ esetén $w_1 + w_2 \in W$.
- (2) W **zárt a skalárral szorzásra**,
azaz tetszőleges $\lambda \in T$ és $w \in W$ esetén $\lambda w \in W$.

Az altér jellemzése

Tétel (Freud, 4.2.2. Tétel)

Legyen V vektortér a T test fölött.

A $W \subseteq V$ nem üres részhalmaz akkor és csak akkor altér, ha

- (1) W **zárt az összeadásra**,
azaz tetszőleges $w_1, w_2 \in W$ esetén $w_1 + w_2 \in W$.
- (2) W **zárt a skalárral szorzásra**,
azaz tetszőleges $\lambda \in T$ és $w \in W$ esetén $\lambda w \in W$.

Állítás (Freud, 4.2.15. és 4.2.12. Feladat)

- (1) Az altér nulleleme ugyanaz, mint az eredeti vektortéréé.

Az altér jellemzése

Tétel (Freud, 4.2.2. Tétel)

Legyen V vektortér a T test fölött.

A $W \subseteq V$ nem üres részhalmaz akkor és csak akkor altér, ha

- (1) W **zárt az összeadásra**,
azaz tetszőleges $w_1, w_2 \in W$ esetén $w_1 + w_2 \in W$.
- (2) W **zárt a skalárral szorzásra**,
azaz tetszőleges $\lambda \in T$ és $w \in W$ esetén $\lambda w \in W$.

Állítás (Freud, 4.2.15. és 4.2.12. Feladat)

- (1) Az altér nulleleme ugyanaz, mint az eredeti vektortéré.
- (2) Altérek metszete is altér.

Az altér jellemzése

Tétel (Freud, 4.2.2. Tétel)

Legyen V vektortér a T test fölött.

A $W \subseteq V$ nem üres részhalmaz akkor és csak akkor altér, ha

- (1) W **zárt az összeadásra**,
azaz tetszőleges $w_1, w_2 \in W$ esetén $w_1 + w_2 \in W$.
- (2) W **zárt a skalárral szorzásra**,
azaz tetszőleges $\lambda \in T$ és $w \in W$ esetén $\lambda w \in W$.

Állítás (Freud, 4.2.15. és 4.2.12. Feladat)

- (1) Az altér nulleleme ugyanaz, mint az eredeti vektortéré.
- (2) Altérek metszete is altér.
- (3) Két altér uniója **csak akkor** altér, ha valamelyikük tartalmazza a másikat.

Altér készítése

Kérdés

Adott egy v vektor a síkon.

Altér készítése

Kérdés

Adott egy v vektor a síkon. Mely vektorokat kell hozzávinnünk (minél kevesebbet), hogy alteret kapjunk?

Altér készítése

Kérdés

Adott egy v vektor a síkon. Mely vektorokat kell hozzávinnünk (minél kevesebbet), hogy alteret kapjunk?

A v skalárszorosait (azaz a λv vektorokat) be kell venni.

Altér készítése

Kérdés

Adott egy v vektor a síkon. Mely vektorokat kell hozzávinnünk (minél kevesebbet), hogy alteret kapjunk?

A v skalárszorosait (azaz a λv vektorokat) be kell venni. Ez elég, mert ezek halmaza zárt mindkét műveletre.

Altér készítése

Kérdés

Adott egy v vektor a síkon. Mely vektorokat kell hozzávinnünk (minél kevesebbet), hogy alteret kapjunk?

A v skalárszorosait (azaz a λv vektorokat) be kell venni. Ez elég, mert ezek halmaza zárt mindkét műveletre. Ezek pont a v -vel párhuzamos vektorok (egy egyenes).

Altér készítése

Kérdés

Adott egy v vektor a síkon. Mely vektorokat kell hozzávennünk (minél kevesebbet), hogy alteret kapjunk?

A v skalárszorosait (azaz a λv vektorokat) be kell venni. Ez elég, mert ezek halmaza zárt mindkét műveletre. Ezek pont a v -vel párhuzamos vektorok (egy egyenes).

Kérdés

Adottak az x és x^2 polinomok $\mathbb{R}[x]$ -ben.

Altér készítése

Kérdés

Adott egy v vektor a síkon. Mely vektorokat kell hozzávennünk (minél kevesebbet), hogy alteret kapjunk?

A v skalárszorosait (azaz a λv vektorokat) be kell venni. Ez elég, mert ezek halmaza zárt mindkét műveletre. Ezek pont a v -vel párhuzamos vektorok (egy egyenes).

Kérdés

Adottak az x és x^2 polinomok $\mathbb{R}[x]$ -ben. Mely polinomokat kell hozzávennünk (minél kevesebbet), hogy alteret kapjunk?

Altér készítése

Kérdés

Adott egy v vektor a síkon. Mely vektorokat kell hozzávennünk (minél kevesebbet), hogy alteret kapjunk?

A v skalárszorosait (azaz a λv vektorokat) be kell venni. Ez elég, mert ezek halmaza zárt mindkét műveletre. Ezek pont a v -vel párhuzamos vektorok (egy egyenes).

Kérdés

Adottak az x és x^2 polinomok $\mathbb{R}[x]$ -ben. Mely polinomokat kell hozzávennünk (minél kevesebbet), hogy alteret kapjunk?

Az $ax + bx^2$ alakú polinomok már alteret alkotnak ($a, b \in \mathbb{R}$).

Generált altér

Tétel (Freud, 4.3.4. Tétel)

Legyen V vektortér a T test fölött és $v_1, v_2, \dots, v_m \in V$.

Generált altér

Tétel (Freud, 4.3.4. Tétel)

Legyen V vektortér a T test fölött és $v_1, v_2, \dots, v_m \in V$.
Ekkor a $\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \dots + \lambda_m v_m$ alakú vektorok,

Generált altér

Tétel (Freud, 4.3.4. Tétel)

Legyen V vektortér a T test fölött és $v_1, v_2, \dots, v_m \in V$.
Ekkor a $\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \dots + \lambda_m v_m$ alakú vektorok,
ahol $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m \in T$,

Generált altér

Tétel (Freud, 4.3.4. Tétel)

Legyen V vektortér a T test fölött és $v_1, v_2, \dots, v_m \in V$.
Ekkor a $\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \dots + \lambda_m v_m$ alakú vektorok,
ahol $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m \in T$, alteret alkotnak V -ben.

Generált altér

Tétel (Freud, 4.3.4. Tétel)

Legyen V vektortér a T test fölött és $v_1, v_2, \dots, v_m \in V$.
Ekkor a $\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \dots + \lambda_m v_m$ alakú vektorok,
ahol $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m \in T$, altérrel alkotnak V -ben.
Ez a $v_1, v_2, \dots, v_m \in V$ által **generált altér**,

Generált altér

Tétel (Freud, 4.3.4. Tétel)

Legyen V vektortér a T test fölött és $v_1, v_2, \dots, v_m \in V$.

Ekkor a $\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \dots + \lambda_m v_m$ alakú vektorok,

ahol $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m \in T$, altérrel alkotnak V -ben.

Ez a $v_1, v_2, \dots, v_m \in V$ által **generált altér**, jele $\langle v_1, v_2, \dots, v_m \rangle$.

Generált altér

Tétel (Freud, 4.3.4. Tétel)

Legyen V vektortér a T test fölött és $v_1, v_2, \dots, v_m \in V$.

Ekkor a $\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \dots + \lambda_m v_m$ alakú vektorok,

ahol $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m \in T$, altérrel alkotnak V -ben.

Ez a $v_1, v_2, \dots, v_m \in V$ által **generált altér**, jele $\langle v_1, v_2, \dots, v_m \rangle$.

Bizonyítás

$U = \langle v_1, \dots, v_m \rangle$ nem üres, mert $0 = 0v_1 + \dots + 0v_m \in U$.

Generált altér

Tétel (Freud, 4.3.4. Tétel)

Legyen V vektortér a T test fölött és $v_1, v_2, \dots, v_m \in V$.

Ekkor a $\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \dots + \lambda_m v_m$ alakú vektorok,

ahol $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m \in T$, altérrel alkotnak V -ben.

Ez a $v_1, v_2, \dots, v_m \in V$ által **generált altér**, jele $\langle v_1, v_2, \dots, v_m \rangle$.

Bizonyítás

$U = \langle v_1, \dots, v_m \rangle$ nem üres, mert $0 = 0v_1 + \dots + 0v_m \in U$.

Ha $u = \lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_m v_m \in U$

Generált altér

Tétel (Freud, 4.3.4. Tétel)

Legyen V vektortér a T test fölött és $v_1, v_2, \dots, v_m \in V$.

Ekkor a $\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \dots + \lambda_m v_m$ alakú vektorok,

ahol $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m \in T$, altérrel alkotnak V -ben.

Ez a $v_1, v_2, \dots, v_m \in V$ által **generált altér**, jele $\langle v_1, v_2, \dots, v_m \rangle$.

Bizonyítás

$U = \langle v_1, \dots, v_m \rangle$ nem üres, mert $0 = 0v_1 + \dots + 0v_m \in U$.

Ha $u = \lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_m v_m \in U$ és $\lambda \in T$,

Generált altér

Tétel (Freud, 4.3.4. Tétel)

Legyen V vektortér a T test fölött és $v_1, v_2, \dots, v_m \in V$.

Ekkor a $\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \dots + \lambda_m v_m$ alakú vektorok,

ahol $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m \in T$, altérrel alkotnak V -ben.

Ez a $v_1, v_2, \dots, v_m \in V$ által **generált altér**, jele $\langle v_1, v_2, \dots, v_m \rangle$.

Bizonyítás

$U = \langle v_1, \dots, v_m \rangle$ nem üres, mert $0 = 0v_1 + \dots + 0v_m \in U$.

Ha $u = \lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_m v_m \in U$ és $\lambda \in T$, akkor $\lambda u \in U$,

Generált altér

Tétel (Freud, 4.3.4. Tétel)

Legyen V vektortér a T test fölött és $v_1, v_2, \dots, v_m \in V$.

Ekkor a $\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \dots + \lambda_m v_m$ alakú vektorok,

ahol $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m \in T$, altérrel alkotnak V -ben.

Ez a $v_1, v_2, \dots, v_m \in V$ által **generált altér**, jele $\langle v_1, v_2, \dots, v_m \rangle$.

Bizonyítás

$U = \langle v_1, \dots, v_m \rangle$ nem üres, mert $0 = 0v_1 + \dots + 0v_m \in U$.

Ha $u = \lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_m v_m \in U$ és $\lambda \in T$, akkor $\lambda u \in U$,

mert $\lambda u = (\lambda\lambda_1)v_1 + \dots + (\lambda\lambda_m)v_m$.

Generált altér

Tétel (Freud, 4.3.4. Tétel)

Legyen V vektortér a T test fölött és $v_1, v_2, \dots, v_m \in V$.

Ekkor a $\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \dots + \lambda_m v_m$ alakú vektorok,

ahol $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m \in T$, altérrel alkotnak V -ben.

Ez a $v_1, v_2, \dots, v_m \in V$ által **generált altér**, jele $\langle v_1, v_2, \dots, v_m \rangle$.

Bizonyítás

$U = \langle v_1, \dots, v_m \rangle$ nem üres, mert $0 = 0v_1 + \dots + 0v_m \in U$.

Ha $u = \lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_m v_m \in U$ és $\lambda \in T$, akkor $\lambda u \in U$,

mert $\lambda u = (\lambda \lambda_1) v_1 + \dots + (\lambda \lambda_m) v_m$. Így U skalárszorosra zárt.

Generált altér

Tétel (Freud, 4.3.4. Tétel)

Legyen V vektortér a T test fölött és $v_1, v_2, \dots, v_m \in V$.

Ekkor a $\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \dots + \lambda_m v_m$ alakú vektorok,

ahol $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m \in T$, altérrel alkotnak V -ben.

Ez a $v_1, v_2, \dots, v_m \in V$ által **generált altér**, jele $\langle v_1, v_2, \dots, v_m \rangle$.

Bizonyítás

$U = \langle v_1, \dots, v_m \rangle$ nem üres, mert $0 = 0v_1 + \dots + 0v_m \in U$.

Ha $u = \lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_m v_m \in U$ és $\lambda \in T$, akkor $\lambda u \in U$,

mert $\lambda u = (\lambda \lambda_1) v_1 + \dots + (\lambda \lambda_m) v_m$. Így U skalárszorosra zárt.

Az összegre zártság bizonyítása hasonló, HF. □

Generált altér

Tétel (Freud, 4.3.4. Tétel)

Legyen V vektortér a T test fölött és $v_1, v_2, \dots, v_m \in V$.

Ekkor a $\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \dots + \lambda_m v_m$ alakú vektorok,

ahol $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m \in T$, altérrel alkotnak V -ben.

Ez a $v_1, v_2, \dots, v_m \in V$ által **generált altér**, jele $\langle v_1, v_2, \dots, v_m \rangle$.

Bizonyítás

$U = \langle v_1, \dots, v_m \rangle$ nem üres, mert $0 = 0v_1 + \dots + 0v_m \in U$.

Ha $u = \lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_m v_m \in U$ és $\lambda \in T$, akkor $\lambda u \in U$,

mert $\lambda u = (\lambda \lambda_1) v_1 + \dots + (\lambda \lambda_m) v_m$. Így U skalárszorosra zárt.

Az összegre zártság bizonyítása hasonló, HF. □

$\langle v_1, \dots, v_m \rangle$ a **legsűkebb** v_1, \dots, v_m -et tartalmazó altér.

Generált altér

Tétel (Freud, 4.3.4. Tétel)

Legyen V vektortér a T test fölött és $v_1, v_2, \dots, v_m \in V$.

Ekkor a $\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \dots + \lambda_m v_m$ alakú vektorok,

ahol $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m \in T$, altérrel alkotnak V -ben.

Ez a $v_1, v_2, \dots, v_m \in V$ által **generált altér**, jele $\langle v_1, v_2, \dots, v_m \rangle$.

Bizonyítás

$U = \langle v_1, \dots, v_m \rangle$ nem üres, mert $0 = 0v_1 + \dots + 0v_m \in U$.

Ha $u = \lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_m v_m \in U$ és $\lambda \in T$, akkor $\lambda u \in U$,

mert $\lambda u = (\lambda \lambda_1) v_1 + \dots + (\lambda \lambda_m) v_m$. Így U skalárszorosra zárt.

Az összegre zártság bizonyítása hasonló, HF. □

$\langle v_1, \dots, v_m \rangle$ a **legsűkebb** v_1, \dots, v_m -et tartalmazó altér.

Azaz ha W altér és $v_1, \dots, v_m \in W$, akkor $\langle v_1, \dots, v_m \rangle \subseteq W$.