

# Algebra1, normál

## ELTE Algebra és Számelmélet Tanszék

Előadó: Kiss Emil  
ewwkiss@gmail.com

7. előadás

# A permutáció mint átrendezés

## Tétel

Ha van  $n$  tárgyunk, akkor ezeket

$$n! = 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot (n-1) \cdot n$$

különböző módon tudjuk sorba rakni.

# A permutáció mint átrendezés

## Tétel

Ha van  $n$  tárgyunk, akkor ezeket

$$n! = 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot (n-1) \cdot n = \prod_{i=1}^n i$$

különböző módon tudjuk sorba rakni.

# A permutáció mint átrendezés

## Tétel

Ha van  $n$  tárgyunk, akkor ezeket

$$n! = 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot (n-1) \cdot n = \prod_{i=1}^n i$$

különböző módon tudjuk sorba rakni.

Az itt szereplő  $n!$  szám neve:  $n$  faktoriális.

# A permutáció mint átrendezés

## Tétel

Ha van  $n$  tárgyunk, akkor ezeket

$$n! = 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot (n-1) \cdot n = \prod_{i=1}^n i$$

különböző módon tudjuk sorba rakni.

Az itt szereplő  $n!$  szám neve:  $n$  faktoriális.

## Permutálás

alma, szilva, barack

# A permutáció mint átrendezés

## Tétel

Ha van  $n$  tárgyunk, akkor ezeket

$$n! = 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot (n-1) \cdot n = \prod_{i=1}^n i$$

különböző módon tudjuk sorba rakni.

Az itt szereplő  $n!$  szám neve:  $n$  faktoriális.

## Permutálás

alma, szilva, barack

Ilyen sorrend  $3! = 6$ -féle van.

# A permutáció mint átrendezés

## Tétel

Ha van  $n$  tárgyunk, akkor ezeket

$$n! = 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot (n-1) \cdot n = \prod_{i=1}^n i$$

különböző módon tudjuk sorba rakni.

Az itt szereplő  $n!$  szám neve:  $n$  faktoriális.

## Permutálás

alma, szilva, barack

Ilyen sorrend  $3! = 6$ -féle van. **Átrendezhetjük** így:

barack, alma, szilva

# A permutáció mint átrendezés

## Tétel

Ha van  $n$  tárgyunk, akkor ezeket

$$n! = 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot (n-1) \cdot n = \prod_{i=1}^n i$$

különböző módon tudjuk sorba rakni.

Az itt szereplő  $n!$  szám neve:  $n$  faktoriális.

## Permutálás

alma, szilva, barack

Ilyen sorrend  $3! = 6$ -féle van. **Átrendezhetjük** így:

barack, alma, szilva

Összesen  $3! = 6$ -féle átrendezés lehetséges.



# A permutáció mint átrendezés

## Tétel

Ha van  $n$  tárgyunk, akkor ezeket

$$n! = 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot (n-1) \cdot n = \prod_{i=1}^n i$$

különböző módon tudjuk sorba rakni.

Az itt szereplő  $n!$  szám neve:  $n$  faktoriális.

## Permutálás

alma, szilva, barack

Ilyen sorrend  $3! = 6$ -féle van. **Átrendezhetjük** így:

barack, alma, szilva

Összesen  $3! = 6$ -féle átrendezés lehetséges.

Az átrendezés egy  $f$  függvény:

# A permutáció mint átrendezés

## Tétel

Ha van  $n$  tárgyunk, akkor ezeket

$$n! = 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot (n-1) \cdot n = \prod_{i=1}^n i$$

különböző módon tudjuk sorba rakni.

Az itt szereplő  $n!$  szám neve:  $n$  faktoriális.

## Permutálás

alma, szilva, barack

Ilyen sorrend  $3! = 6$ -féle van. **Átrendezhetjük** így:

barack, alma, szilva

Összesen  $3! = 6$ -féle átrendezés lehetséges.

Az átrendezés egy  $f$  függvény:

$$f(\text{alma}) = \text{barack},$$

# A permutáció mint átrendezés

## Tétel

Ha van  $n$  tárgyunk, akkor ezeket

$$n! = 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot (n-1) \cdot n = \prod_{i=1}^n i$$

különböző módon tudjuk sorba rakni.

Az itt szereplő  $n!$  szám neve:  $n$  faktoriális.

## Permutálás

alma, szilva, barack

Ilyen sorrend  $3! = 6$ -féle van. **Átrendezhetjük** így:

barack, alma, szilva

Összesen  $3! = 6$ -féle átrendezés lehetséges.

Az átrendezés egy  $f$  függvény:

$$f(\text{alma}) = \text{barack}, \quad f(\text{szilva}) = \text{alma},$$

# A permutáció mint átrendezés

## Tétel

Ha van  $n$  tárgyunk, akkor ezeket

$$n! = 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot (n-1) \cdot n = \prod_{i=1}^n i$$

különböző módon tudjuk sorba rakni.

Az itt szereplő  $n!$  szám neve:  $n$  faktoriális.

## Permutálás

alma, szilva, barack

Ilyen sorrend  $3! = 6$ -féle van. **Átrendezhetjük** így:

barack, alma, szilva

Összesen  $3! = 6$ -féle átrendezés lehetséges.

Az átrendezés egy  $f$  függvény:

$$f(\text{alma}) = \text{barack}, \quad f(\text{szilva}) = \text{alma}, \quad f(\text{barack}) = \text{szilva}.$$

# A permutáció mint átrendezés

## Tétel

Ha van  $n$  tárgyunk, akkor ezeket

$$n! = 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot (n-1) \cdot n = \prod_{i=1}^n i$$

különböző módon tudjuk sorba rakni.

Az itt szereplő  $n!$  szám neve:  $n$  faktoriális.

## Permutálás

alma, szilva, barack

Ilyen sorrend  $3! = 6$ -féle van. **Átrendezhetjük** így:

barack, alma, szilva

Összesen  $3! = 6$ -féle átrendezés lehetséges.

Az átrendezés egy  $f$  függvény:

$$f(\text{alma}) = \text{barack}, \quad f(\text{szilva}) = \text{alma}, \quad f(\text{barack}) = \text{szilva}.$$

Az  $f(x)$  az  $x$  helyére tett tárgy.

# A permutáció mint átrendezés

## Tétel

Ha van  $n$  tárgyunk, akkor ezeket

$$n! = 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot (n-1) \cdot n = \prod_{i=1}^n i$$

különböző módon tudjuk sorba rakni.

Az itt szereplő  $n!$  szám neve:  $n$  faktoriális.

## Permutálás

alma, szilva, barack

Ilyen sorrend  $3! = 6$ -féle van. **Átrendezhetjük** így:

barack, alma, szilva

Összesen  $3! = 6$ -féle átrendezés lehetséges.

Az átrendezés egy  $f$  függvény:

$$f(\text{alma}) = \text{barack}, \quad f(\text{szilva}) = \text{alma}, \quad f(\text{barack}) = \text{szilva}.$$

Az  $f(x)$  az  $x$  helyére tett tárgy. Az  $f$  kölcsönösen egyértelmű.

# A permutáció mint bijekció

## Definíció (K4.2.1)

Legyen  $X$  (rendszerint véges) halmaz.

# A permutáció mint bijekció

## Definíció (K4.2.1)

Legyen  $X$  (rendszerint véges) halmaz.

Az  $X$  halmazt önmagára képező kölcsönösen egyértelmű függvényeket az  $X$  halmaz **permutációinak** nevezük.



# A permutáció mint bijekció

## Definíció (K4.2.1)

Legyen  $X$  (rendszerint véges) halmaz.

Az  $X$  halmazt önmagára képező kölcsönösen egyértelmű függvényeket az  $X$  halmaz **permutációinak** nevezük.

Ezek összességét  $S_X$  jelöli.

# A permutáció mint bijekció

## Definíció (K4.2.1)

Legyen  $X$  (rendszerint véges) halmaz.

Az  $X$  halmazt önmagára képező kölcsönösen egyértelmű függvényeket az  $X$  halmaz **permutációinak** nevezük.

Ezek összességét  $S_X$  jelöli. Rövid jelölés:  $S_n$  az  $\{1, 2, \dots, n\}$  összes permutációinak a halmaza.

# A permutáció mint bijekció

## Definíció (K4.2.1)

Legyen  $X$  (rendszerint véges) halmaz.

Az  $X$  halmazt önmagára képező kölcsönösen egyértelmű függvényeket az  $X$  halmaz **permutációinak** nevezük.

Ezek összességét  $S_X$  jelöli. Rövid jelölés:  $S_n$  az  $\{1, 2, \dots, n\}$  összes permutációinak a halmaza. Tehát az  $S_n$  elemszáma  $n!$ .

# A permutáció mint bijekció

## Definíció (K4.2.1)

Legyen  $X$  (rendszerint véges) halmaz.

Az  $X$  halmazt önmagára képező kölcsönösen egyértelmű függvényeket az  $X$  halmaz **permutációinak** nevezük.

Ezek összességét  $S_X$  jelöli. Rövid jelölés:  $S_n$  az  $\{1, 2, \dots, n\}$  összes permutációinak a halmaza. Tehát az  $S_n$  elemszáma  $n!$ .

## A permutációk jelölése

$$f = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

azt jelenti, hogy

# A permutáció mint bijekció

## Definíció (K4.2.1)

Legyen  $X$  (rendszerint véges) halmaz.

Az  $X$  halmazt önmagára képező kölcsönösen egyértelmű függvényeket az  $X$  halmaz **permutációinak** nevezük.

Ezek összességét  $S_X$  jelöli. Rövid jelölés:  $S_n$  az  $\{1, 2, \dots, n\}$  összes permutációinak a halmaza. Tehát az  $S_n$  elemszáma  $n!$ .

## A permutációk jelölése

$$f = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

azt jelenti, hogy  $f(1) = 2$ ,

# A permutáció mint bijekció

## Definíció (K4.2.1)

Legyen  $X$  (rendszerint véges) halmaz.

Az  $X$  halmazt önmagára képező kölcsönösen egyértelmű függvényeket az  $X$  halmaz **permutációinak** nevezük.

Ezek összességét  $S_X$  jelöli. Rövid jelölés:  $S_n$  az  $\{1, 2, \dots, n\}$  összes permutációinak a halmaza. Tehát az  $S_n$  elemszáma  $n!$ .

## A permutációk jelölése

$$f = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

azt jelenti, hogy  $f(1) = 2$ ,  $f(2) = 4$ ,

# A permutáció mint bijekció

## Definíció (K4.2.1)

Legyen  $X$  (rendszerint véges) halmaz.

Az  $X$  halmazt önmagára képező kölcsönösen egyértelmű függvényeket az  $X$  halmaz **permutációinak** nevezük.

Ezek összességét  $S_X$  jelöli. Rövid jelölés:  $S_n$  az  $\{1, 2, \dots, n\}$  összes permutációinak a halmaza. Tehát az  $S_n$  elemszáma  $n!$ .

## A permutációk jelölése

$$f = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

azt jelenti, hogy  $f(1) = 2$ ,  $f(2) = 4$ ,  $f(3) = 3$ ,

# A permutáció mint bijekció

## Definíció (K4.2.1)

Legyen  $X$  (rendszerint véges) halmaz.

Az  $X$  halmazt önmagára képező kölcsönösen egyértelmű függvényeket az  $X$  halmaz **permutációinak** nevezük.

Ezek összességét  $S_X$  jelöli. Rövid jelölés:  $S_n$  az  $\{1, 2, \dots, n\}$  összes permutációinak a halmaza. Tehát az  $S_n$  elemszáma  $n!$ .

## A permutációk jelölése

$$f = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

azt jelenti, hogy  $f(1) = 2$ ,  $f(2) = 4$ ,  $f(3) = 3$ ,  $f(4) = 1$ .



# A permutáció mint bijekció

## Definíció (K4.2.1)

Legyen  $X$  (rendszerint véges) halmaz.

Az  $X$  halmazt önmagára képező kölcsönösen egyértelmű függvényeket az  $X$  halmaz **permutációinak** nevezük.

Ezek összességét  $S_X$  jelöli. Rövid jelölés:  $S_n$  az  $\{1, 2, \dots, n\}$  összes permutációinak a halmaza. Tehát az  $S_n$  elemszáma  $n!$ .

## A permutációk jelölése

$$f = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

azt jelenti, hogy  $f(1) = 2$ ,  $f(2) = 4$ ,  $f(3) = 3$ ,  $f(4) = 1$ .  
Mindkét sorban felsoroljuk az  $X$  halmaz összes elemét.

# A permutáció mint bijekció

## Definíció (K4.2.1)

Legyen  $X$  (rendszerint véges) halmaz.

Az  $X$  halmazt önmagára képező kölcsönösen egyértelmű függvényeket az  $X$  halmaz **permutációinak** nevezük.

Ezek összességét  $S_X$  jelöli. Rövid jelölés:  $S_n$  az  $\{1, 2, \dots, n\}$  összes permutációinak a halmaza. Tehát az  $S_n$  elemszáma  $n!$ .

## A permutációk jelölése

$$f = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

azt jelenti, hogy  $f(1) = 2$ ,  $f(2) = 4$ ,  $f(3) = 3$ ,  $f(4) = 1$ .

Mindkét sorban felsoroljuk az  $X$  halmaz összes elemét.

Az  $f$  függvény a felső sor minden elemét az alatta lévőbe képi.

# Transzpozíció

## Definíció (K4.2.6)

Legyen  $X$  halmaz és  $x \neq y \in X$ .

# Transzpozíció

## Definíció (K4.2.6)

Legyen  $X$  halmaz és  $x \neq y \in X$ .

Az  $x$  és  $y$  **cseréje** az az  $f = (x, y)$ -nal jelölt permutáció,

# Transzpozíció

## Definíció (K4.2.6)

Legyen  $X$  halmaz és  $x \neq y \in X$ .

Az  $x$  és  $y$  **cseréje** az az  $f = (x, y)$ -nal jelölt permutáció,  
amely az  $x$ -et  $y$ -ba,

# Transzpozíció

## Definíció (K4.2.6)

Legyen  $X$  halmaz és  $x \neq y \in X$ .

Az  $x$  és  $y$  **cseréje** az az  $f = (x, y)$ -nal jelölt permutáció, amely az  $x$ -et  $y$ -ba, az  $y$ -t  $x$ -be viszi,

# Transzpozíció

## Definíció (K4.2.6)

Legyen  $X$  halmaz és  $x \neq y \in X$ .

Az  $x$  és  $y$  **cseréje** az az  $f = (x, y)$ -nal jelölt permutáció, amely az  $x$ -et  $y$ -ba, az  $y$ -t  $x$ -be viszi, a  $X$  többi elemét pedig **fixen hagyja**,

# Transzpozíció

## Definíció (K4.2.6)

Legyen  $X$  halmaz és  $x \neq y \in X$ .

Az  $x$  és  $y$  **cseréje** az az  $f = (x, y)$ -nal jelölt permutáció, amely az  $x$ -et  $y$ -ba, az  $y$ -t  $x$ -be viszi, a  $X$  többi elemét pedig **fixen hagyja**, azaz saját magába képzzi.



# Transzpozíció

## Definíció (K4.2.6)

Legyen  $X$  halmaz és  $x \neq y \in X$ .

Az  $x$  és  $y$  **cseréje** az az  $f = (x, y)$ -nal jelölt permutáció, amely az  $x$ -et  $y$ -ba, az  $y$ -t  $x$ -be viszi, a  $X$  többi elemét pedig **fixen hagyja**, azaz saját magába képz.

Az ilyen permutációkat cserének

# Transzpozíció

## Definíció (K4.2.6)

Legyen  $X$  halmaz és  $x \neq y \in X$ .

Az  $x$  és  $y$  **cseréje** az az  $f = (x, y)$ -nal jelölt permutáció, amely az  $x$ -et  $y$ -ba, az  $y$ -t  $x$ -be viszi, a  $X$  többi elemét pedig **fixen hagyja**, azaz saját magába képz.

Az ilyen permutációkat cserének vagy **transzpozíciónak** hívjuk.

# Transzpozíció

## Definíció (K4.2.6)

Legyen  $X$  halmaz és  $x \neq y \in X$ .

Az  $x$  és  $y$  **cseréje** az az  $f = (x, y)$ -nal jelölt permutáció, amely az  $x$ -et  $y$ -ba, az  $y$ -t  $x$ -be viszi, a  $X$  többi elemét pedig **fixen hagyja**, azaz saját magába képzzi.

Az ilyen permutációkat cserének vagy **transzpozíciónak** hívjuk.

## Példa

$$(1, 2) = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

# Transzpozíció

## Definíció (K4.2.6)

Legyen  $X$  halmaz és  $x \neq y \in X$ .

Az  $x$  és  $y$  **cseréje** az az  $f = (x, y)$ -nal jelölt permutáció, amely az  $x$ -et  $y$ -ba, az  $y$ -t  $x$ -be viszi, a  $X$  többi elemét pedig **fixen hagyja**, azaz saját magába képzzi.

Az ilyen permutációkat cserének vagy **transzpozíciónak** hívjuk.

## Példa

$$(1, 2) = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{bmatrix} \quad \text{és} \quad (2, 3) = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{bmatrix}.$$

# Transzpozíció

## Definíció (K4.2.6)

Legyen  $X$  halmaz és  $x \neq y \in X$ .

Az  $x$  és  $y$  **cseréje** az az  $f = (x, y)$ -nal jelölt permutáció, amely az  $x$ -et  $y$ -ba, az  $y$ -t  $x$ -be viszi, a  $X$  többi elemét pedig **fixen hagyja**, azaz saját magába képzzi.

Az ilyen permutációkat cserének vagy **transzpozíciónak** hívjuk.

## Példa

$$(1, 2) = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{bmatrix} \quad \text{és} \quad (2, 3) = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{bmatrix}.$$

$(1, 2) \circ (2, 3) :$

# Transzpozíció

## Definíció (K4.2.6)

Legyen  $X$  halmaz és  $x \neq y \in X$ .

Az  $x$  és  $y$  **cseréje** az az  $f = (x, y)$ -nal jelölt permutáció, amely az  $x$ -et  $y$ -ba, az  $y$ -t  $x$ -be viszi, a  $X$  többi elemét pedig **fixen hagyja**, azaz saját magába képzzi.

Az ilyen permutációkat cserének vagy **transzpozíciónak** hívjuk.

## Példa

$$(1, 2) = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{bmatrix} \quad \text{és} \quad (2, 3) = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{bmatrix}.$$

$$(1, 2) \circ (2, 3) : 1 \mapsto 1 \mapsto 2,$$

# Transzpozíció

## Definíció (K4.2.6)

Legyen  $X$  halmaz és  $x \neq y \in X$ .

Az  $x$  és  $y$  **cseréje** az az  $f = (x, y)$ -nal jelölt permutáció, amely az  $x$ -et  $y$ -ba, az  $y$ -t  $x$ -be viszi, a  $X$  többi elemét pedig **fixen hagyja**, azaz saját magába képzzi.

Az ilyen permutációkat cserének vagy **transzpozíciónak** hívjuk.

## Példa

$$(1, 2) = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{bmatrix} \quad \text{és} \quad (2, 3) = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{bmatrix}.$$

$$(1, 2) \circ (2, 3) : 1 \mapsto 1 \mapsto 2, \quad 2 \mapsto 3 \mapsto 3,$$

# Transzpozíció

## Definíció (K4.2.6)

Legyen  $X$  halmaz és  $x \neq y \in X$ .

Az  $x$  és  $y$  **cseréje** az az  $f = (x, y)$ -nal jelölt permutáció, amely az  $x$ -et  $y$ -ba, az  $y$ -t  $x$ -be viszi, a  $X$  többi elemét pedig **fixen hagyja**, azaz saját magába képzzi.

Az ilyen permutációkat cserének vagy **transzpozíciónak** hívjuk.

## Példa

$$(1, 2) = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{bmatrix} \quad \text{és} \quad (2, 3) = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{bmatrix}.$$

$$(1, 2) \circ (2, 3) : 1 \mapsto 1 \mapsto 2, \quad 2 \mapsto 3 \mapsto 3, \quad 3 \mapsto 2 \mapsto 1.$$



# Transzpozíció

## Definíció (K4.2.6)

Legyen  $X$  halmaz és  $x \neq y \in X$ .

Az  $x$  és  $y$  **cseréje** az az  $f = (x, y)$ -nal jelölt permutáció, amely az  $x$ -et  $y$ -ba, az  $y$ -t  $x$ -be viszi, a  $X$  többi elemét pedig **fixen hagyja**, azaz saját magába képzí.

Az ilyen permutációkat cserének vagy **transzpozíciónak** hívjuk.

## Példa

$$(1, 2) = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{bmatrix} \quad \text{és} \quad (2, 3) = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{bmatrix}.$$

$(1, 2) \circ (2, 3) : 1 \mapsto 1 \mapsto 2, 2 \mapsto 3 \mapsto 3, 3 \mapsto 2 \mapsto 1.$

$$(1, 2) \circ (2, 3) = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

# Transzpozíció

## Definíció (K4.2.6)

Legyen  $X$  halmaz és  $x \neq y \in X$ .

Az  $x$  és  $y$  **cseréje** az az  $f = (x, y)$ -nal jelölt permutáció, amely az  $x$ -et  $y$ -ba, az  $y$ -t  $x$ -be viszi, a  $X$  többi elemét pedig **fixen hagyja**, azaz saját magába képzzi.

Az ilyen permutációkat cserének vagy **transzpozíciónak** hívjuk.

## Példa

$$(1, 2) = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{bmatrix} \quad \text{és} \quad (2, 3) = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{bmatrix}.$$

$$(1, 2) \circ (2, 3) : 1 \mapsto 1 \mapsto 2, \quad 2 \mapsto 3 \mapsto 3, \quad 3 \mapsto 2 \mapsto 1.$$

$$(1, 2) \circ (2, 3) = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix} \quad (2, 3) \circ (1, 2) = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{bmatrix}.$$

# Transzpozíció

## Definíció (K4.2.6)

Legyen  $X$  halmaz és  $x \neq y \in X$ .

Az  $x$  és  $y$  **cseréje** az az  $f = (x, y)$ -nal jelölt permutáció, amely az  $x$ -et  $y$ -ba, az  $y$ -t  $x$ -be viszi, a  $X$  többi elemét pedig **fixen hagyja**, azaz saját magába képzí.

Az ilyen permutációkat cserének vagy **transzpozíciónak** hívjuk.

## Példa

$$(1, 2) = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{bmatrix} \quad \text{és} \quad (2, 3) = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{bmatrix}.$$

$$(1, 2) \circ (2, 3) : 1 \mapsto 1 \mapsto 2, \quad 2 \mapsto 3 \mapsto 3, \quad 3 \mapsto 2 \mapsto 1.$$

$$(1, 2) \circ (2, 3) = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix} \neq (2, 3) \circ (1, 2) = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{bmatrix}.$$

# Minden permutáció cserék szorzata

## Elnevezés (K2.2.3)

Ezentúl permutációk kompozícióját **szorzásnak** nevezzük,

# Minden permutáció cserék szorzata

## Elnevezés (K2.2.3)

Ezentúl permutációk kompozícióját **szorzásnak** nevezzük, és **egymás mellé írással** jelöljük.

# Minden permutáció cserék szorzata

## Elnevezés (K2.2.3)

Ezentúl permutációk kompozícióját **szorzásnak** nevezzük, és **egymás mellé írással** jelöljük.

## Tétel (K4.2.5)

Minden permutáció cserék (transzpozíciók) szorzata.

# Minden permutáció cserék szorzata

## Elnevezés (K2.2.3)

Ezentúl permutációk kompozícióját **szorzásnak** nevezzük, és **egymás mellé írással** jelöljük.

## Tétel (K4.2.5)

Minden permutáció cserék (transzpozíciók) szorzata.

## Bizonyítás

Ha a legbaloldali helyen nem az a tárgy van, ami odavaló,

# Minden permutáció cserék szorzata

## Elnevezés (K2.2.3)

Ezentúl permutációk kompozícióját **szorzásnak** nevezzük, és **egymás mellé írással** jelöljük.

## Tétel (K4.2.5)

Minden permutáció cserék (transzpozíciók) szorzata.

## Bizonyítás

Ha a legbaloldali helyen nem az a tárgy van, ami odavaló, akkor odacseréljük azt, ami odavaló.



# Minden permutáció cserék szorzata

## Elnevezés (K2.2.3)

Ezentúl permutációk kompozícióját **szorzásnak** nevezzük, és **egymás mellé írással** jelöljük.

## Tétel (K4.2.5)

Minden permutáció cserék (transzpozíciók) szorzata.

## Bizonyítás

Ha a legbaloldali helyen nem az a tárgy van, ami odavaló, akkor odacseréljük azt, ami odavaló. Ezután a balról második helyre cseréljük oda azt, ami odavaló.

# Minden permutáció cserék szorzata

## Elnevezés (K2.2.3)

Ezentúl permutációk kompozícióját **szorzásnak** nevezzük, és **egymás mellé írással** jelöljük.

## Tétel (K4.2.5)

Minden permutáció cserék (transzpozíciók) szorzata.

## Bizonyítás

Ha a legbaloldali helyen nem az a tárgy van, ami odavaló, akkor odacseréljük azt, ami odavaló. Ezután a balról második helyre cseréljük oda azt, ami odavaló. Az eljárást folytatva minden tárgy a helyére kerül. □

# Minden permutáció cserék szorzata

## Elnevezés (K2.2.3)

Ezentúl permutációk kompozícióját **szorzásnak** nevezzük, és **egymás mellé írással** jelöljük.

## Tétel (K4.2.5)

Minden permutáció cserék (transzpozíciók) szorzata.

## Bizonyítás

Ha a legbaloldali helyen nem az a tárgy van, ami odavaló, akkor odacseréljük azt, ami odavaló. Ezután a balról második helyre cseréljük oda azt, ami odavaló. Az eljárást folytatva minden tárgy a helyére kerül. □

A szükséges cserék száma a legrosszabb esetben is

# Minden permutáció cserék szorzata

## Elnevezés (K2.2.3)

Ezentúl permutációk kompozícióját **szorzásnak** nevezzük, és **egymás mellé írással** jelöljük.

## Tétel (K4.2.5)

Minden permutáció cserék (transzpozíciók) szorzata.

## Bizonyítás

Ha a legbaloldali helyen nem az a tárgy van, ami odavaló, akkor odacseréljük azt, ami odavaló. Ezután a balról második helyre cseréljük oda azt, ami odavaló. Az eljárást folytatva minden tárgy a helyére kerül.

A szükséges cserék száma a legrosszabb esetben is eggyel kevesebb, mint a tárgyak száma.

# Példák cserék szorzatára

## Példa

$f = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 4 & 5 & 1 & 3 \end{bmatrix}$  előállítás cserék szorzataként:

# Példák cserék szorzatára

## Példa

$$f = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 4 & 5 & 1 & 3 \end{bmatrix} \text{ előállítása cserék szorzataként:}$$

$(1, 2)$

## Példák cserék szorzatára

## Példa

$$f = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 4 & 5 & 1 & 3 \end{bmatrix} \text{ előállítás cserék szorzataként:}$$

$(1, 2)$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 1 & 3 & 4 & 5 \end{bmatrix}$$

## Példák cserék szorzatára

## Példa

$$f = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 4 & 5 & 1 & 3 \end{bmatrix} \text{ előállítás cserék szorzataként:}$$

$(1, 4)(1, 2)$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 1 & 3 & 4 & 5 \end{bmatrix}$$



## Példák cserék szorzatára

## Példa

$$f = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 4 & 5 & 1 & 3 \end{bmatrix} \text{ előállítás cserék szorzataként:}$$
$$(1, 4)(1, 2)$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 1 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 4 & 3 & 1 & 5 \end{bmatrix}$$

## Példák cserék szorzatára

## Példa

$$f = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 4 & 5 & 1 & 3 \end{bmatrix} \text{ előállítás cserék szorzataként:}$$

$$f = (3, 5)(1, 4)(1, 2)$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 1 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 4 & 3 & 1 & 5 \end{bmatrix}$$

## Példák cserék szorzatára

## Példa

$$f = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 4 & 5 & 1 & 3 \end{bmatrix} \text{ előállítás cserék szorzataként:}$$

$$f = (3, 5)(1, 4)(1, 2)$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 1 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 4 & 3 & 1 & 5 \\ 2 & 4 & 5 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

## Példák cserék szorzatára

## Példa

$$f = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 4 & 5 & 1 & 3 \end{bmatrix} \text{ előállítás cserék szorzataként:}$$

$$f = (3, 5)(1, 4)(1, 2)$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 1 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 4 & 3 & 1 & 5 \\ 2 & 4 & 5 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

$$\text{De } f = (1, 2)(2, 4)(3, 5)$$

## Példák cserék szorzatára

## Példa

$$f = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 4 & 5 & 1 & 3 \end{bmatrix} \text{ előállítás cserék szorzataként:}$$

$$f = (3, 5)(1, 4)(1, 2)$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 1 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 4 & 3 & 1 & 5 \\ 2 & 4 & 5 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

De  $f = (1, 2)(2, 4)(3, 5) = (1, 5)(1, 4)(3, 5)(1, 2)(3, 4)$  is igaz.

## Példák cserék szorzatára

## Példa

$$f = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 4 & 5 & 1 & 3 \end{bmatrix} \text{ előállítás cserék szorzataként:}$$

$$f = (3, 5)(1, 4)(1, 2)$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 1 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 4 & 3 & 1 & 5 \\ 2 & 4 & 5 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

De  $f = (1, 2)(2, 4)(3, 5) = (1, 5)(1, 4)(3, 5)(1, 2)(3, 4)$  is igaz.

Azaz  $f$  többféleképpen is felírható cserék szorzataként.

# Példák cserék szorzatára

## Példa

$$f = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 4 & 5 & 1 & 3 \end{bmatrix} \text{ előállítás a cserék szorzataként:}$$

$$f = (3, 5)(1, 4)(1, 2)$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 1 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 4 & 3 & 1 & 5 \\ 2 & 4 & 5 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

De  $f = (1, 2)(2, 4)(3, 5) = (1, 5)(1, 4)(3, 5)(1, 2)(3, 4)$  is igaz.

Azaz  $f$  többféleképpen is felírható cserék szorzataként.

## Tétel

Nem fordulhat elő, hogy egy permutáció páratlan sok, és páros sok csere szorzataként is felírható.

# Az inverzió fogalma

Definíció (K 156. oldal, F1.1.1. Definíció)

Legyen  $f \in S_n$  egy permutáció és  $1 \leq i < j \leq n$ .



# Az inverzió fogalma

Definíció (K 156. oldal, F1.1.1. Definíció)

Legyen  $f \in S_n$  egy permutáció és  $1 \leq i < j \leq n$ .

Ha  $f(i) > f(j)$ , akkor azt mondjuk, hogy ezek **inverzióban állnak**.

# Az inverzió fogalma

## Definíció (K 156. oldal, F1.1.1. Definíció)

Legyen  $f \in S_n$  egy permutáció és  $1 \leq i < j \leq n$ .

Ha  $f(i) > f(j)$ , akkor azt mondjuk, hogy ezek **inverzióban állnak**.

Ha  $f(i) < f(j)$ , akkor nem állnak inverzióban.

# Az inverzió fogalma

## Definíció (K 156. oldal, F1.1.1. Definíció)

Legyen  $f \in S_n$  egy permutáció és  $1 \leq i < j \leq n$ .

Ha  $f(i) > f(j)$ , akkor azt mondjuk, hogy ezek **inverzióban állnak**.

Ha  $f(i) < f(j)$ , akkor nem állnak inverzióban.

## Példa

$$f = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 4 & 5 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

# Az inverzió fogalma

## Definíció (K 156. oldal, F1.1.1. Definíció)

Legyen  $f \in S_n$  egy permutáció és  $1 \leq i < j \leq n$ .

Ha  $f(i) > f(j)$ , akkor azt mondjuk, hogy ezek **inverzióban állnak**.

Ha  $f(i) < f(j)$ , akkor nem állnak inverzióban.

## Példa

$$f = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 4 & 5 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

Az  $\binom{5}{2} = 10$  párból inverzióban áll:

# Az inverzió fogalma

## Definíció (K 156. oldal, F1.1.1. Definíció)

Legyen  $f \in S_n$  egy permutáció és  $1 \leq i < j \leq n$ .

Ha  $f(i) > f(j)$ , akkor azt mondjuk, hogy ezek **inverzióban állnak**.

Ha  $f(i) < f(j)$ , akkor nem állnak inverzióban.

## Példa

$$f = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 4 & 5 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

Az  $\binom{5}{2} = 10$  párból inverzióban áll: **21**,

# Az inverzió fogalma

## Definíció (K 156. oldal, F1.1.1. Definíció)

Legyen  $f \in S_n$  egy permutáció és  $1 \leq i < j \leq n$ .

Ha  $f(i) > f(j)$ , akkor azt mondjuk, hogy ezek **inverzióban állnak**.

Ha  $f(i) < f(j)$ , akkor nem állnak inverzióban.

## Példa

$$f = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 4 & 5 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

Az  $\binom{5}{2} = 10$  párból inverzióban áll: **21, 41,**

# Az inverzió fogalma

## Definíció (K 156. oldal, F1.1.1. Definíció)

Legyen  $f \in S_n$  egy permutáció és  $1 \leq i < j \leq n$ .

Ha  $f(i) > f(j)$ , akkor azt mondjuk, hogy ezek **inverzióban állnak**.

Ha  $f(i) < f(j)$ , akkor nem állnak inverzióban.

## Példa

$$f = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 4 & 5 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

Az  $\binom{5}{2} = 10$  párból inverzióban áll: **21, 41, 43,**

# Az inverzió fogalma

## Definíció (K 156. oldal, F1.1.1. Definíció)

Legyen  $f \in S_n$  egy permutáció és  $1 \leq i < j \leq n$ .

Ha  $f(i) > f(j)$ , akkor azt mondjuk, hogy ezek **inverzióban állnak**.

Ha  $f(i) < f(j)$ , akkor nem állnak inverzióban.

## Példa

$$f = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 4 & 5 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

Az  $\binom{5}{2} = 10$  párból inverzióban áll: **21, 41, 43, 51,**



# Az inverzió fogalma

## Definíció (K 156. oldal, F1.1.1. Definíció)

Legyen  $f \in S_n$  egy permutáció és  $1 \leq i < j \leq n$ .

Ha  $f(i) > f(j)$ , akkor azt mondjuk, hogy ezek **inverzióban állnak**.

Ha  $f(i) < f(j)$ , akkor nem állnak inverzióban.

## Példa

$$f = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 4 & 5 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

Az  $\binom{5}{2} = 10$  párból inverzióban áll: **21, 41, 43, 51, 53**.

# Az inverzió fogalma

## Definíció (K 156. oldal, F1.1.1. Definíció)

Legyen  $f \in S_n$  egy permutáció és  $1 \leq i < j \leq n$ .

Ha  $f(i) > f(j)$ , akkor azt mondjuk, hogy ezek **inverzióban állnak**.

Ha  $f(i) < f(j)$ , akkor nem állnak inverzióban.

## Példa

$$f = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 4 & 5 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

Az  $\binom{5}{2} = 10$  párból inverzióban áll: **21, 41, 43, 51, 53**.

Nem áll inverzióban:

# Az inverzió fogalma

## Definíció (K 156. oldal, F1.1.1. Definíció)

Legyen  $f \in S_n$  egy permutáció és  $1 \leq i < j \leq n$ .

Ha  $f(i) > f(j)$ , akkor azt mondjuk, hogy ezek **inverzióban állnak**.

Ha  $f(i) < f(j)$ , akkor nem állnak inverzióban.

## Példa

$$f = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 4 & 5 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

Az  $\binom{5}{2} = 10$  párból inverzióban áll: **21, 41, 43, 51, 53**.

Nem áll inverzióban: **24**,

# Az inverzió fogalma

## Definíció (K 156. oldal, F1.1.1. Definíció)

Legyen  $f \in S_n$  egy permutáció és  $1 \leq i < j \leq n$ .

Ha  $f(i) > f(j)$ , akkor azt mondjuk, hogy ezek **inverzióban állnak**.

Ha  $f(i) < f(j)$ , akkor nem állnak inverzióban.

## Példa

$$f = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 4 & 5 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

Az  $\binom{5}{2} = 10$  párból inverzióban áll: **21, 41, 43, 51, 53**.

Nem áll inverzióban: **24, 25**,

# Az inverzió fogalma

## Definíció (K 156. oldal, F1.1.1. Definíció)

Legyen  $f \in S_n$  egy permutáció és  $1 \leq i < j \leq n$ .

Ha  $f(i) > f(j)$ , akkor azt mondjuk, hogy ezek **inverzióban állnak**.

Ha  $f(i) < f(j)$ , akkor nem állnak inverzióban.

## Példa

$$f = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 4 & 5 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

Az  $\binom{5}{2} = 10$  párból inverzióban áll: **21, 41, 43, 51, 53**.

Nem áll inverzióban: **24, 25, 23**,

# Az inverzió fogalma

## Definíció (K 156. oldal, F1.1.1. Definíció)

Legyen  $f \in S_n$  egy permutáció és  $1 \leq i < j \leq n$ .

Ha  $f(i) > f(j)$ , akkor azt mondjuk, hogy ezek **inverzióban állnak**.

Ha  $f(i) < f(j)$ , akkor nem állnak inverzióban.

## Példa

$$f = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 4 & 5 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

Az  $\binom{5}{2} = 10$  párból inverzióban áll: **21, 41, 43, 51, 53**.

Nem áll inverzióban: **24, 25, 23, 45**,

# Az inverzió fogalma

## Definíció (K 156. oldal, F1.1.1. Definíció)

Legyen  $f \in S_n$  egy permutáció és  $1 \leq i < j \leq n$ .

Ha  $f(i) > f(j)$ , akkor azt mondjuk, hogy ezek **inverzióban állnak**.

Ha  $f(i) < f(j)$ , akkor nem állnak inverzióban.

## Példa

$$f = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 4 & 5 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

Az  $\binom{5}{2} = 10$  párból inverzióban áll: **21, 41, 43, 51, 53**.

Nem áll inverzióban: **24, 25, 23, 45, 13**.

# Az inverzió fogalma

## Definíció (K 156. oldal, F1.1.1. Definíció)

Legyen  $f \in S_n$  egy permutáció és  $1 \leq i < j \leq n$ .

Ha  $f(i) > f(j)$ , akkor azt mondjuk, hogy ezek **inverzióban állnak**.

Ha  $f(i) < f(j)$ , akkor nem állnak inverzióban.

## Példa

$$f = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 4 & 5 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

Az  $\binom{5}{2} = 10$  párból inverzióban áll: **21, 41, 43, 51, 53**.

Nem áll inverzióban: **24, 25, 23, 45, 13**.

Az inverziók száma tehát **5**.



# Az inverzió fogalma

## Definíció (K 156. oldal, F1.1.1. Definíció)

Legyen  $f \in S_n$  egy permutáció és  $1 \leq i < j \leq n$ .

Ha  $f(i) > f(j)$ , akkor azt mondjuk, hogy ezek **inverzióban állnak**.

Ha  $f(i) < f(j)$ , akkor nem állnak inverzióban.

## Példa

$$f = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 4 & 5 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

Az  $\binom{5}{2} = 10$  párból inverzióban áll: **21, 41, 43, 51, 53**.

Nem áll inverzióban: **24, 25, 23, 45, 13**.

Az inverziók száma tehát **5**.

Az  $S_n$  egy permutációjának maximum  $\binom{n}{2}$  inverziója lehet.

# Permutáció előjele

## Definíció (K4.2.13, F1.1.2. Definíció)

Az  $f$  permutáció **páros**, ha az inverziók száma páros.

# Permutáció előjele

## Definíció (K4.2.13, F1.1.2. Definíció)

Az  $f$  permutáció **páros**, ha az inverziók száma páros.  
Ekkor az  $f$  **előjele**  $+1$ .

# Permutáció előjele

## Definíció (K4.2.13, F1.1.2. Definíció)

Az  $f$  permutáció **páros**, ha az inverziók száma páros.

Ekkor az  $f$  **előjele**  $+1$ . Jelölés:  $sg(f) = 1$ .

# Permutáció előjele

## Definíció (K4.2.13, F1.1.2. Definíció)

Az  $f$  permutáció **páros**, ha az inverziók száma páros.

Ekkor az  $f$  **előjele**  $+1$ . Jelölés:  $\text{sg}(f) = 1$ .

Az  $f$  permutáció **páratlan**, ha az inverziók száma páratlan.

# Permutáció előjele

## Definíció (K4.2.13, F1.1.2. Definíció)

Az  $f$  permutáció **páros**, ha az inverziók száma páros.

Ekkor az  $f$  **előjele**  $+1$ . Jelölés:  $\text{sg}(f) = 1$ .

Az  $f$  permutáció **páratlan**, ha az inverziók száma páratlan.

Ekkor az  $f$  **előjele**  $-1$ .

# Permutáció előjele

## Definíció (K4.2.13, F1.1.2. Definíció)

Az  $f$  permutáció **páros**, ha az inverziók száma páros.

Ekkor az  $f$  **előjele**  $+1$ . Jelölés:  $\text{sg}(f) = 1$ .

Az  $f$  permutáció **páratlan**, ha az inverziók száma páratlan.

Ekkor az  $f$  **előjele**  $-1$ . Jelölés:  $\text{sg}(f) = -1$ .

# Permutáció előjele

## Definíció (K4.2.13, F1.1.2. Definíció)

Az  $f$  permutáció **páros**, ha az inverziók száma páros.

Ekkor az  $f$  **előjele**  $+1$ . Jelölés:  $\text{sg}(f) = 1$ .

Az  $f$  permutáció **páratlan**, ha az inverziók száma páratlan.

Ekkor az  $f$  **előjele**  $-1$ . Jelölés:  $\text{sg}(f) = -1$ .

Vagyis ha az inverziók száma  $J$ ,



# Permutáció előjele

## Definíció (K4.2.13, F1.1.2. Definíció)

Az  $f$  permutáció **páros**, ha az inverziók száma páros.

Ekkor az  $f$  **előjele**  $+1$ . Jelölés:  $\text{sg}(f) = 1$ .

Az  $f$  permutáció **páratlan**, ha az inverziók száma páratlan.

Ekkor az  $f$  **előjele**  $-1$ . Jelölés:  $\text{sg}(f) = -1$ .

Vagyis ha az inverziók száma  $J$ , akkor  $\text{sg}(f) = (-1)^J$ .

# Permutáció előjele

## Definíció (K4.2.13, F1.1.2. Definíció)

Az  $f$  permutáció **páros**, ha az inverziók száma páros.

Ekkor az  $f$  **előjele**  $+1$ . Jelölés:  $sg(f) = 1$ .

Az  $f$  permutáció **páratlan**, ha az inverziók száma páratlan.

Ekkor az  $f$  **előjele**  $-1$ . Jelölés:  $sg(f) = -1$ .

Vagyis ha az inverziók száma  $J$ , akkor  $sg(f) = (-1)^J$ .

## Az előjelek szorzástétele (K4.2.9)

Ha  $f, g \in S_n$ , akkor  $sg(fg) = sg(f)sg(g)$ .

# Permutáció előjele

## Definíció (K4.2.13, F1.1.2. Definíció)

Az  $f$  permutáció **páros**, ha az inverziók száma páros.

Ekkor az  $f$  **előjele**  $+1$ . Jelölés:  $sg(f) = 1$ .

Az  $f$  permutáció **páratlan**, ha az inverziók száma páratlan.

Ekkor az  $f$  **előjele**  $-1$ . Jelölés:  $sg(f) = -1$ .

Vagyis ha az inverziók száma  $J$ , akkor  $sg(f) = (-1)^J$ .

## Az előjelek szorzástétele (K4.2.9)

Ha  $f, g \in S_n$ , akkor  $sg(fg) = sg(f)sg(g)$ . Biz: Algebra3-ban.

# Permutáció előjele

## Definíció (K4.2.13, F1.1.2. Definíció)

Az  $f$  permutáció **páros**, ha az inverziók száma páros.

Ekkor az  $f$  **előjele**  $+1$ . Jelölés:  $sg(f) = 1$ .

Az  $f$  permutáció **páratlan**, ha az inverziók száma páratlan.

Ekkor az  $f$  **előjele**  $-1$ . Jelölés:  $sg(f) = -1$ .

Vagyis ha az inverziók száma  $J$ , akkor  $sg(f) = (-1)^J$ .

## Az előjelek szorzástétele (K4.2.9)

Ha  $f, g \in S_n$ , akkor  $sg(fg) = sg(f)sg(g)$ . Biz: Algebra3-ban.

## Állítás (K4.2.12)

Minden transzpozíció előjele  $-1$ .

# Permutáció előjele

## Definíció (K4.2.13, F1.1.2. Definíció)

Az  $f$  permutáció **páros**, ha az inverziók száma páros.

Ekkor az  $f$  **előjele**  $+1$ . Jelölés:  $sg(f) = 1$ .

Az  $f$  permutáció **páratlan**, ha az inverziók száma páratlan.

Ekkor az  $f$  **előjele**  $-1$ . Jelölés:  $sg(f) = -1$ .

Vagyis ha az inverziók száma  $J$ , akkor  $sg(f) = (-1)^J$ .

## Az előjelek szorzástétele (K4.2.9)

Ha  $f, g \in S_n$ , akkor  $sg(fg) = sg(f)sg(g)$ . Biz: Algebra3-ban.

## Állítás (K4.2.12)

Minden transzpozíció előjele  $-1$ . Biz: később.

# Permutáció előjele

## Definíció (K4.2.13, F1.1.2. Definíció)

Az  $f$  permutáció **páros**, ha az inverziók száma páros.

Ekkor az  $f$  **előjele**  $+1$ . Jelölés:  $sg(f) = 1$ .

Az  $f$  permutáció **páratlan**, ha az inverziók száma páratlan.

Ekkor az  $f$  **előjele**  $-1$ . Jelölés:  $sg(f) = -1$ .

Vagyis ha az inverziók száma  $J$ , akkor  $sg(f) = (-1)^J$ .

## Az előjelek szorzástétele (K4.2.9)

Ha  $f, g \in S_n$ , akkor  $sg(fg) = sg(f)sg(g)$ . Biz: Algebra3-ban.

## Állítás (K4.2.12)

Minden transzpozíció előjele  $-1$ . Biz: később.

Ezért a páros permutációk páros sok cseré,

# Permutáció előjele

## Definíció (K4.2.13, F1.1.2. Definíció)

Az  $f$  permutáció **páros**, ha az inverziók száma páros.

Ekkor az  $f$  **előjele**  $+1$ . Jelölés:  $sg(f) = 1$ .

Az  $f$  permutáció **páratlan**, ha az inverziók száma páratlan.

Ekkor az  $f$  **előjele**  $-1$ . Jelölés:  $sg(f) = -1$ .

Vagyis ha az inverziók száma  $J$ , akkor  $sg(f) = (-1)^J$ .

## Az előjelek szorzástétele (K4.2.9)

Ha  $f, g \in S_n$ , akkor  $sg(fg) = sg(f)sg(g)$ . Biz: Algebra3-ban.

## Állítás (K4.2.12)

Minden transzpozíció előjele  $-1$ . Biz: később.

Ezért a páros permutációk páros sok csere, a páratlan permutációk páratlan sok csere szorzataként kaphatók.

# Permutáció inverze

## Definíció (K2.2.11)

Az **identikus** permutáció minden elemet helyben hagy



# Permutáció inverze

## Definíció (K2.2.11)

Az **identikus** permutáció minden elemet helyben hagy (vagyis nem változtat a sorrenden).

# Permutáció inverze

## Definíció (K2.2.11)

Az **identikus** permutáció minden elemet helyben hagy (vagyis nem változtat a sorrenden). **Jele:** *id*.

# Permutáció inverze

## Definíció (K2.2.11)

Az **identikus** permutáció minden elemet helyben hagy (vagyis nem változtat a sorrenden). **Jele:**  $id$ . Tehát  $id(x) = x$ .

# Permutáció inverze

## Definíció (K2.2.11)

Az **identikus** permutáció minden elemet helyben hagy (vagyis nem változtat a sorrenden). **Jele:**  $id$ . Tehát  $id(x) = x$ .  
Az  $f$  permutáció **inverze** az a  $g = f^{-1}$  permutáció,

# Permutáció inverze

## Definíció (K2.2.11)

Az **identikus** permutáció minden elemet helyben hagy (vagyis nem változtat a sorrenden). **Jele:**  $id$ . Tehát  $id(x) = x$ . Az  $f$  permutáció **inverze** az a  $g = f^{-1}$  permutáció, amely visszacsinálja, amit  $f$  elvégzett:

# Permutáció inverze

## Definíció (K2.2.11)

Az **identikus** permutáció minden elemet helyben hagy (vagyis nem változtat a sorrenden). **Jele:**  $id$ . Tehát  $id(x) = x$ .  
Az  $f$  permutáció **inverze** az a  $g = f^{-1}$  permutáció, amely visszacsinálja, amit  $f$  elvégzett:  $g(f(x)) = x$

# Permutáció inverze

## Definíció (K2.2.11)

Az **identikus** permutáció minden elemet helyben hagy (vagyis nem változtat a sorrenden). **Jele:**  $id$ . Tehát  $id(x) = x$ . Az  $f$  permutáció **inverze** az a  $g = f^{-1}$  permutáció, amely visszacsinálja, amit  $f$  elvégzett:  $g(f(x)) = x = f(g(x))$ .

# Permutáció inverze

## Definíció (K2.2.11)

Az **identikus** permutáció minden elemet helyben hagy (vagyis nem változtat a sorrenden). **Jele:**  $id$ . Tehát  $id(x) = x$ . Az  $f$  permutáció **inverze** az a  $g = f^{-1}$  permutáció, amely visszacsinálja, amit  $f$  elvégzett:  $g(f(x)) = x = f(g(x))$ .

## Állítás (K4.2.11)

(1) Tetszőleges  $f$  permutációra  $id \circ f = f \circ id = f$ .



# Permutáció inverze

## Definíció (K2.2.11)

Az **identikus** permutáció minden elemet helyben hagy (vagyis nem változtat a sorrenden). **Jele:**  $id$ . Tehát  $id(x) = x$ . Az  $f$  permutáció **inverze** az a  $g = f^{-1}$  permutáció, amely visszacsinálja, amit  $f$  elvégzett:  $g(f(x)) = x = f(g(x))$ .

## Állítás (K4.2.11)

- (1) Tetszőleges  $f$  permutációra  $id \circ f = f \circ id = f$ .
- (2) Az identitásban nulla darab inverzió van,

# Permutáció inverze

## Definíció (K2.2.11)

Az **identikus** permutáció minden elemet helyben hagy (vagyis nem változtat a sorrenden). **Jele:**  $id$ . Tehát  $id(x) = x$ . Az  $f$  permutáció **inverze** az a  $g = f^{-1}$  permutáció, amely visszacsinálja, amit  $f$  elvégzett:  $g(f(x)) = x = f(g(x))$ .

## Állítás (K4.2.11)

- (1) Tetszőleges  $f$  permutációra  $id \circ f = f \circ id = f$ .
- (2) Az identitásban nulla darab inverzió van, így előjele  $+1$ .

# Permutáció inverze

## Definíció (K2.2.11)

Az **identikus** permutáció minden elemet helyben hagy (vagyis nem változtat a sorrenden). **Jele:**  $id$ . Tehát  $id(x) = x$ . Az  $f$  permutáció **inverze** az a  $g = f^{-1}$  permutáció, amely visszacsinálja, amit  $f$  elvégzett:  $g(f(x)) = x = f(g(x))$ .

## Állítás (K4.2.11)

- (1) Tetszőleges  $f$  permutációra  $id \circ f = f \circ id = f$ .
- (2) Az identitásban nulla darab inverzió van, így előjele  $+1$ .
- (3) Tetszőleges  $f$  permutációra  $f \circ f^{-1} = f^{-1} \circ f = id$ .

# Permutáció inverze

## Definíció (K2.2.11)

Az **identikus** permutáció minden elemet helyben hagy (vagyis nem változtat a sorrenden). **Jele:**  $id$ . Tehát  $id(x) = x$ . Az  $f$  permutáció **inverze** az a  $g = f^{-1}$  permutáció, amely visszacsinálja, amit  $f$  elvégzett:  $g(f(x)) = x = f(g(x))$ .

## Állítás (K4.2.11)

- (1) Tetszőleges  $f$  permutációra  $id \circ f = f \circ id = f$ .
- (2) Az identitásban nulla darab inverzió van, így előjele  $+1$ .
- (3) Tetszőleges  $f$  permutációra  $f \circ f^{-1} = f^{-1} \circ f = id$ .
- (4) Tetszőleges  $f$  permutációra  $sg(f^{-1}) = sg(f)$ .

# Permutáció inverze

## Definíció (K2.2.11)

Az **identikus** permutáció minden elemet helyben hagy (vagyis nem változtat a sorrenden). **Jele:**  $id$ . Tehát  $id(x) = x$ . Az  $f$  permutáció **inverze** az a  $g = f^{-1}$  permutáció, amely visszacsinálja, amit  $f$  elvégzett:  $g(f(x)) = x = f(g(x))$ .

## Állítás (K4.2.11)

- (1) Tetszőleges  $f$  permutációra  $id \circ f = f \circ id = f$ .
- (2) Az identitásban nulla darab inverzió van, így előjele  $+1$ .
- (3) Tetszőleges  $f$  permutációra  $f \circ f^{-1} = f^{-1} \circ f = id$ .
- (4) Tetszőleges  $f$  permutációra  $sg(f^{-1}) = sg(f)$ .

**Bizonyítás:** (1)-(3) nyilvánvaló.

# Permutáció inverze

## Definíció (K2.2.11)

Az **identikus** permutáció minden elemet helyben hagy (vagyis nem változtat a sorrenden). **Jele:**  $id$ . Tehát  $id(x) = x$ . Az  $f$  permutáció **inverze** az a  $g = f^{-1}$  permutáció, amely visszacsinálja, amit  $f$  elvégzett:  $g(f(x)) = x = f(g(x))$ .

## Állítás (K4.2.11)

- (1) Tetszőleges  $f$  permutációra  $id \circ f = f \circ id = f$ .
- (2) Az identitásban nulla darab inverzió van, így előjele  $+1$ .
- (3) Tetszőleges  $f$  permutációra  $f \circ f^{-1} = f^{-1} \circ f = id$ .
- (4) Tetszőleges  $f$  permutációra  $sg(f^{-1}) = sg(f)$ .

**Bizonyítás:** (1)-(3) nyilvánvaló. A (4) a szorzástételből következik:

# Permutáció inverze

## Definíció (K2.2.11)

Az **identikus** permutáció minden elemet helyben hagy (vagyis nem változtat a sorrenden). **Jele:**  $id$ . Tehát  $id(x) = x$ . Az  $f$  permutáció **inverze** az a  $g = f^{-1}$  permutáció, amely visszacsinálja, amit  $f$  elvégzett:  $g(f(x)) = x = f(g(x))$ .

## Állítás (K4.2.11)

- (1) Tetszőleges  $f$  permutációra  $id \circ f = f \circ id = f$ .
- (2) Az identitásban nulla darab inverzió van, így előjele  $+1$ .
- (3) Tetszőleges  $f$  permutációra  $f \circ f^{-1} = f^{-1} \circ f = id$ .
- (4) Tetszőleges  $f$  permutációra  $sg(f^{-1}) = sg(f)$ .

**Bizonyítás:** (1)-(3) nyilvánvaló. A (4) a szorzástételből következik:  
 $sg(f)sg(f^{-1}) = sg(ff^{-1})$

# Permutáció inverze

## Definíció (K2.2.11)

Az **identikus** permutáció minden elemet helyben hagy (vagyis nem változtat a sorrenden). **Jele:**  $id$ . Tehát  $id(x) = x$ . Az  $f$  permutáció **inverze** az a  $g = f^{-1}$  permutáció, amely visszacsinálja, amit  $f$  elvégzett:  $g(f(x)) = x = f(g(x))$ .

## Állítás (K4.2.11)

- (1) Tetszőleges  $f$  permutációra  $id \circ f = f \circ id = f$ .
- (2) Az identitásban nulla darab inverzió van, így előjele  $+1$ .
- (3) Tetszőleges  $f$  permutációra  $f \circ f^{-1} = f^{-1} \circ f = id$ .
- (4) Tetszőleges  $f$  permutációra  $sg(f^{-1}) = sg(f)$ .

**Bizonyítás:** (1)-(3) nyilvánvaló. A (4) a szorzástételből következik:  $sg(f)sg(f^{-1}) = sg(ff^{-1}) = sg(id)$



# Permutáció inverze

## Definíció (K2.2.11)

Az **identikus** permutáció minden elemet helyben hagy (vagyis nem változtat a sorrenden). **Jele:**  $id$ . Tehát  $id(x) = x$ . Az  $f$  permutáció **inverze** az a  $g = f^{-1}$  permutáció, amely visszacsinálja, amit  $f$  elvégzett:  $g(f(x)) = x = f(g(x))$ .

## Állítás (K4.2.11)

- (1) Tetszőleges  $f$  permutációra  $id \circ f = f \circ id = f$ .
- (2) Az identitásban nulla darab inverzió van, így előjele  $+1$ .
- (3) Tetszőleges  $f$  permutációra  $f \circ f^{-1} = f^{-1} \circ f = id$ .
- (4) Tetszőleges  $f$  permutációra  $sg(f^{-1}) = sg(f)$ .

**Bizonyítás:** (1)-(3) nyilvánvaló. A (4) a szorzástételből következik:  $sg(f)sg(f^{-1}) = sg(ff^{-1}) = sg(id) = 1$ .

# Csere előjele

## Állítás

Az  $(1, 2)$  cserében csak a  $21$  inverzió van,

# Csere előjele

## Állítás

Az  $(1, 2)$  cserében csak a  $21$  inverzió van, így előjele  $-1$ . □

# Csere előjele

## Állítás

Az  $(1, 2)$  cserében csak a  $21$  inverzió van, így előjele  $-1$ . □

## Állítás (K4.2.12)

Általában, az  $(i, j)$  csere előjele is  $-1$ .

# Csere előjele

## Állítás

Az  $(1, 2)$  cserében csak a  $21$  inverzió van, így előjele  $-1$ . □

## Állítás (K4.2.12)

Általában, az  $(i, j)$  csere előjele is  $-1$ .

## Bizonyítás

Legyen  $g$  egy olyan permutáció, ami az  $1$ -et  $i$ -be,

# Csere előjele

## Állítás

Az  $(1, 2)$  cserében csak a  $21$  inverzió van, így előjele  $-1$ . □

## Állítás (K4.2.12)

Általában, az  $(i, j)$  csere előjele is  $-1$ .

## Bizonyítás

Legyen  $g$  egy olyan permutáció, ami az  $1$ -et  $i$ -be, a  $2$ -t  $j$ -be viszi,

# Csere előjele

## Állítás

Az  $(1, 2)$  cserében csak a  $21$  inverzió van, így előjele  $-1$ . □

## Állítás (K4.2.12)

Általában, az  $(i, j)$  csere előjele is  $-1$ .

## Bizonyítás

Legyen  $g$  egy olyan permutáció, ami az  $1$ -et  $i$ -be, a  $2$ -t  $j$ -be viszi, a többi helyen pedig az értéke tetszőleges.

# Csere előjele

## Állítás

Az  $(1, 2)$  cserében csak a 21 inverzió van, így előjele  $-1$ . □

## Állítás (K4.2.12)

Általában, az  $(i, j)$  csere előjele is  $-1$ .

## Bizonyítás

Legyen  $g$  egy olyan permutáció, ami az 1-et  $i$ -be, a 2-t  $j$ -be viszi, a többi helyen pedig az értéke tetszőleges. Ekkor

$$g \circ (1, 2) \circ g^{-1} = (i, j).$$



# Csere előjele

## Állítás

Az  $(1, 2)$  cserében csak a 21 inverzió van, így előjele  $-1$ . □

## Állítás (K4.2.12)

Általában, az  $(i, j)$  csere előjele is  $-1$ .

## Bizonyítás

Legyen  $g$  egy olyan permutáció, ami az 1-et  $i$ -be, a 2-t  $j$ -be viszi, a többi helyen pedig az értéke tetszőleges. Ekkor

$$g \circ (1, 2) \circ g^{-1} = (i, j).$$

Valóban:  $i \mapsto 1$

# Csere előjele

## Állítás

Az  $(1, 2)$  cserében csak a 21 inverzió van, így előjele  $-1$ . □

## Állítás (K4.2.12)

Általában, az  $(i, j)$  csere előjele is  $-1$ .

## Bizonyítás

Legyen  $g$  egy olyan permutáció, ami az 1-et  $i$ -be, a 2-t  $j$ -be viszi, a többi helyen pedig az értéke tetszőleges. Ekkor

$$g \circ (1, 2) \circ g^{-1} = (i, j).$$

Valóban:  $i \mapsto 1$

hiszen  $g(1) = i$ .

# Csere előjele

## Állítás

Az  $(1, 2)$  cserében csak a 21 inverzió van, így előjele  $-1$ . □

## Állítás (K4.2.12)

Általában, az  $(i, j)$  csere előjele is  $-1$ .

## Bizonyítás

Legyen  $g$  egy olyan permutáció, ami az 1-et  $i$ -be, a 2-t  $j$ -be viszi, a többi helyen pedig az értéke tetszőleges. Ekkor

$$g \circ (1, 2) \circ g^{-1} = (i, j).$$

Valóban:  $i \mapsto 1 \mapsto 2$  hiszen  $g(1) = i$ .

# Csere előjele

## Állítás

Az  $(1, 2)$  cserében csak a 21 inverzió van, így előjele  $-1$ . □

## Állítás (K4.2.12)

Általában, az  $(i, j)$  csere előjele is  $-1$ .

## Bizonyítás

Legyen  $g$  egy olyan permutáció, ami az 1-et  $i$ -be, a 2-t  $j$ -be viszi, a többi helyen pedig az értéke tetszőleges. Ekkor

$$g \circ (1, 2) \circ g^{-1} = (i, j).$$

Valóban:  $i \mapsto 1 \mapsto 2 \mapsto j$ , hiszen  $g(1) = i$ .

# Csere előjele

## Állítás

Az  $(1, 2)$  cserében csak a 21 inverzió van, így előjele  $-1$ . □

## Állítás (K4.2.12)

Általában, az  $(i, j)$  csere előjele is  $-1$ .

## Bizonyítás

Legyen  $g$  egy olyan permutáció, ami az 1-et  $i$ -be, a 2-t  $j$ -be viszi, a többi helyen pedig az értéke tetszőleges. Ekkor

$$g \circ (1, 2) \circ g^{-1} = (i, j).$$

Valóban:  $i \mapsto 1 \mapsto 2 \mapsto j$ , hiszen  $g(1) = i$ . Hasonlóan  $j \mapsto i$ .

# Csere előjele

## Állítás

Az  $(1, 2)$  cserében csak a  $21$  inverzió van, így előjele  $-1$ . □

## Állítás (K4.2.12)

Általában, az  $(i, j)$  csere előjele is  $-1$ .

## Bizonyítás

Legyen  $g$  egy olyan permutáció, ami az  $1$ -et  $i$ -be, a  $2$ -t  $j$ -be viszi, a többi helyen pedig az értéke tetszőleges. Ekkor

$$g \circ (1, 2) \circ g^{-1} = (i, j).$$

Valóban:  $i \mapsto 1 \mapsto 2 \mapsto j$ , hiszen  $g(1) = i$ . Hasonlóan  $j \mapsto i$ .

Végül ha  $k \neq i, j$ , akkor  $k \mapsto g^{-1}(k)$

# Csere előjele

## Állítás

Az  $(1, 2)$  cserében csak a 21 inverzió van, így előjele  $-1$ . □

## Állítás (K4.2.12)

Általában, az  $(i, j)$  csere előjele is  $-1$ .

## Bizonyítás

Legyen  $g$  egy olyan permutáció, ami az 1-et  $i$ -be, a 2-t  $j$ -be viszi, a többi helyen pedig az értéke tetszőleges. Ekkor

$$g \circ (1, 2) \circ g^{-1} = (i, j).$$

Valóban:  $i \mapsto 1 \mapsto 2 \mapsto j$ , hiszen  $g(1) = i$ . Hasonlóan  $j \mapsto i$ .

Végül ha  $k \neq i, j$ , akkor  $k \mapsto g^{-1}(k) \mapsto g^{-1}(k)$

# Csere előjele

## Állítás

Az  $(1, 2)$  cserében csak a 21 inverzió van, így előjele  $-1$ . □

## Állítás (K4.2.12)

Általában, az  $(i, j)$  csere előjele is  $-1$ .

## Bizonyítás

Legyen  $g$  egy olyan permutáció, ami az 1-et  $i$ -be, a 2-t  $j$ -be viszi, a többi helyen pedig az értéke tetszőleges. Ekkor

$$g \circ (1, 2) \circ g^{-1} = (i, j).$$

Valóban:  $i \mapsto 1 \mapsto 2 \mapsto j$ , hiszen  $g(1) = i$ . Hasonlóan  $j \mapsto i$ .

Végül ha  $k \neq i, j$ , akkor  $k \mapsto g^{-1}(k) \mapsto g^{-1}(k) \mapsto k$ .



# Csere előjele

## Állítás

Az  $(1, 2)$  cserében csak a 21 inverzió van, így előjele  $-1$ . □

## Állítás (K4.2.12)

Általában, az  $(i, j)$  csere előjele is  $-1$ .

## Bizonyítás

Legyen  $g$  egy olyan permutáció, ami az 1-et  $i$ -be, a 2-t  $j$ -be viszi, a többi helyen pedig az értéke tetszőleges. Ekkor

$$g \circ (1, 2) \circ g^{-1} = (i, j).$$

Valóban:  $i \mapsto 1 \mapsto 2 \mapsto j$ , hiszen  $g(1) = i$ . Hasonlóan  $j \mapsto i$ .

Végül ha  $k \neq i, j$ , akkor  $k \mapsto g^{-1}(k) \mapsto g^{-1}(k) \mapsto k$ .

A szorzástétel miatt  $\text{sg}((i, j)) =$

# Csere előjele

## Állítás

Az  $(1, 2)$  cserében csak a  $21$  inverzió van, így előjele  $-1$ . □

## Állítás (K4.2.12)

Általában, az  $(i, j)$  csere előjele is  $-1$ .

## Bizonyítás

Legyen  $g$  egy olyan permutáció, ami az  $1$ -et  $i$ -be, a  $2$ -t  $j$ -be viszi, a többi helyen pedig az értéke tetszőleges. Ekkor

$$g \circ (1, 2) \circ g^{-1} = (i, j).$$

Valóban:  $i \mapsto 1 \mapsto 2 \mapsto j$ , hiszen  $g(1) = i$ . Hasonlóan  $j \mapsto i$ .

Végül ha  $k \neq i, j$ , akkor  $k \mapsto g^{-1}(k) \mapsto g^{-1}(k) \mapsto k$ .

A szorzástétel miatt  $\text{sg}((i, j)) = \text{sg}(g \circ (1, 2) \circ g^{-1}) =$

# Csere előjele

## Állítás

Az  $(1, 2)$  cserében csak a  $21$  inverzió van, így előjele  $-1$ . □

## Állítás (K4.2.12)

Általában, az  $(i, j)$  csere előjele is  $-1$ .

## Bizonyítás

Legyen  $g$  egy olyan permutáció, ami az  $1$ -et  $i$ -be, a  $2$ -t  $j$ -be viszi, a többi helyen pedig az értéke tetszőleges. Ekkor

$$g \circ (1, 2) \circ g^{-1} = (i, j).$$

Valóban:  $i \mapsto 1 \mapsto 2 \mapsto j$ , hiszen  $g(1) = i$ . Hasonlóan  $j \mapsto i$ .

Végül ha  $k \neq i, j$ , akkor  $k \mapsto g^{-1}(k) \mapsto g^{-1}(k) \mapsto k$ .

$$\begin{aligned} \text{A szorzástétel miatt } \text{sg}((i, j)) &= \text{sg}(g \circ (1, 2) \circ g^{-1}) = \\ &= \text{sg}(g)\text{sg}((1, 2))\text{sg}(g^{-1}) \end{aligned}$$

# Csere előjele

## Állítás

Az  $(1, 2)$  cserében csak a 21 inverzió van, így előjele  $-1$ . □

## Állítás (K4.2.12)

Általában, az  $(i, j)$  csere előjele is  $-1$ .

## Bizonyítás

Legyen  $g$  egy olyan permutáció, ami az 1-et  $i$ -be, a 2-t  $j$ -be viszi, a többi helyen pedig az értéke tetszőleges. Ekkor

$$g \circ (1, 2) \circ g^{-1} = (i, j).$$

Valóban:  $i \mapsto 1 \mapsto 2 \mapsto j$ , hiszen  $g(1) = i$ . Hasonlóan  $j \mapsto i$ .

Végül ha  $k \neq i, j$ , akkor  $k \mapsto g^{-1}(k) \mapsto g^{-1}(k) \mapsto k$ .

$$\begin{aligned} \text{A szorzástétel miatt } \text{sg}((i, j)) &= \text{sg}(g \circ (1, 2) \circ g^{-1}) = \\ &= \text{sg}(g)\text{sg}((1, 2))\text{sg}(g^{-1}) = (-1)\text{sg}(g)\text{sg}(g^{-1}) \end{aligned}$$

# Csere előjele

## Állítás

Az  $(1, 2)$  cserében csak a  $21$  inverzió van, így előjele  $-1$ . □

## Állítás (K4.2.12)

Általában, az  $(i, j)$  csere előjele is  $-1$ .

## Bizonyítás

Legyen  $g$  egy olyan permutáció, ami az  $1$ -et  $i$ -be, a  $2$ -t  $j$ -be viszi, a többi helyen pedig az értéke tetszőleges. Ekkor

$$g \circ (1, 2) \circ g^{-1} = (i, j).$$

Valóban:  $i \mapsto 1 \mapsto 2 \mapsto j$ , hiszen  $g(1) = i$ . Hasonlóan  $j \mapsto i$ .

Végül ha  $k \neq i, j$ , akkor  $k \mapsto g^{-1}(k) \mapsto g^{-1}(k) \mapsto k$ .

A szorzástétel miatt  $\text{sg}((i, j)) = \text{sg}(g \circ (1, 2) \circ g^{-1}) =$   
 $= \text{sg}(g)\text{sg}((1, 2))\text{sg}(g^{-1}) = (-1)\text{sg}(g)\text{sg}(g^{-1}) = -1.$  □

# A páros permutációk száma

## Állítás (K4.2.16)

Ha  $n \geq 2$ , akkor  $S_n$ -ben a páros és páratlan permutációk száma egyaránt  $n!/2$ .

# A páros permutációk száma

## Állítás (K4.2.16)

Ha  $n \geq 2$ , akkor  $S_n$ -ben a páros és páratlan permutációk száma egyaránt  $n!/2$ .

## Bizonyítás

Elég: **ugyanannyi** páros és páratlan permutáció van.

# A páros permutációk száma

## Állítás (K4.2.16)

Ha  $n \geq 2$ , akkor  $S_n$ -ben a páros és páratlan permutációk száma egyaránt  $n!/2$ .

## Bizonyítás

Elég: **ugyanannyi** páros és páratlan permutáció van.  
Megadunk köztük egy kölcsönösen egyértelmű megfeleltetést.



# A páros permutációk száma

## Állítás (K4.2.16)

Ha  $n \geq 2$ , akkor  $S_n$ -ben a páros és páratlan permutációk száma egyaránt  $n!/2$ .

## Bizonyítás

Elég: **ugyanannyi** páros és páratlan permutáció van.  
Megadunk köztük egy kölcsönösen egyértelmű megfeleltetést.  
Ez az  **$f$ -hez  $f \circ (1,2)$ -t** rendel.

# A páros permutációk száma

## Állítás (K4.2.16)

Ha  $n \geq 2$ , akkor  $S_n$ -ben a páros és páratlan permutációk száma egyaránt  $n!/2$ .

## Bizonyítás

Elég: **ugyanannyi** páros és páratlan permutáció van.

Megadunk köztük egy kölcsönösen egyértelmű megfeleltetést.

Ez az  **$f$ -hez  $f \circ (1, 2)$ -t** rendel.

Mivel  $(1, 2)$  páratlan,

# A páros permutációk száma

## Állítás (K4.2.16)

Ha  $n \geq 2$ , akkor  $S_n$ -ben a páros és páratlan permutációk száma egyaránt  $n!/2$ .

## Bizonyítás

Elég: **ugyanannyi** páros és páratlan permutáció van.  
Megadunk köztük egy kölcsönösen egyértelmű megfeleltetést.  
Ez az  **$f$ -hez  $f \circ (1, 2)$ -t** rendel.  
Mivel  **$(1, 2)$**  páratlan, az előjelek szorzástétele miatt páros permutációhoz páratlant,

# A páros permutációk száma

## Állítás (K4.2.16)

Ha  $n \geq 2$ , akkor  $S_n$ -ben a páros és páratlan permutációk száma egyaránt  $n!/2$ .

## Bizonyítás

Elég: **ugyanannyi** páros és páratlan permutáció van.  
Megadunk köztük egy kölcsönösen egyértelmű megfeleltetést.  
Ez az  **$f$ -hez  $f \circ (1, 2)$ -t** rendel.  
Mivel  $(1, 2)$  páratlan, az előjelek szorzástétele miatt páros permutációhoz páratlant, páratlanhoz párosat rendel.

# A páros permutációk száma

## Állítás (K4.2.16)

Ha  $n \geq 2$ , akkor  $S_n$ -ben a páros és páratlan permutációk száma egyaránt  $n!/2$ .

## Bizonyítás

Elég: **ugyanannyi** páros és páratlan permutáció van.  
Megadunk köztük egy kölcsönösen egyértelmű megfeleltetést.  
Ez az  **$f$ -hez  $f \circ (1, 2)$ -t** rendel.  
Mivel  **$(1, 2)$**  páratlan, az előjelek szorzástétele miatt páros permutációhoz páratlant, páratlanhoz párosat rendel.  
**Kölcsönösen egyértelmű,**

# A páros permutációk száma

## Állítás (K4.2.16)

Ha  $n \geq 2$ , akkor  $S_n$ -ben a páros és páratlan permutációk száma egyaránt  $n!/2$ .

## Bizonyítás

Elég: **ugyanannyi** páros és páratlan permutáció van.  
Megadunk köztük egy kölcsönösen egyértelmű megfeleltetést.  
Ez az  **$f$ -hez  $f \circ (1, 2)$ -t** rendel.  
Mivel  **$(1, 2)$**  páratlan, az előjelek szorzástétele miatt páros permutációhoz páratlant, páratlanhoz párosat rendel.  
**Kölcsönösen egyértelmű**, mert **önmagának az inverze**:

# A páros permutációk száma

## Állítás (K4.2.16)

Ha  $n \geq 2$ , akkor  $S_n$ -ben a páros és páratlan permutációk száma egyaránt  $n!/2$ .

## Bizonyítás

Elég: **ugyanannyi** páros és páratlan permutáció van.  
Megadunk köztük egy kölcsönösen egyértelmű megfeleltetést.

Ez az  **$f$ -hez  $f \circ (1, 2)$ -t** rendel.

Mivel  $(1, 2)$  páratlan, az előjelek szorzástétele miatt páros permutációhoz páratlant, páratlanhoz párosat rendel.

**Kölcsönösen egyértelmű**, mert **önmagának az inverze**:

$$(f \circ (1, 2)) \circ (1, 2)$$

# A páros permutációk száma

## Állítás (K4.2.16)

Ha  $n \geq 2$ , akkor  $S_n$ -ben a páros és páratlan permutációk száma egyaránt  $n!/2$ .

## Bizonyítás

Elég: **ugyanannyi** páros és páratlan permutáció van.

Megadunk köztük egy kölcsönösen egyértelmű megfeleltetést.

Ez az  **$f$ -hez  $f \circ (1, 2)$ -t** rendel.

Mivel  $(1, 2)$  páratlan, az előjelek szorzástétele miatt páros permutációhoz páratlant, páratlanhoz párosat rendel.

**Kölcsönösen egyértelmű**, mert **önmagának az inverze**:

$$(f \circ (1, 2)) \circ (1, 2) = f \circ ((1, 2) \circ (1, 2))$$



# A páros permutációk száma

## Állítás (K4.2.16)

Ha  $n \geq 2$ , akkor  $S_n$ -ben a páros és páratlan permutációk száma egyaránt  $n!/2$ .

## Bizonyítás

Elég: **ugyanannyi** páros és páratlan permutáció van.

Megadunk köztük egy kölcsönösen egyértelmű megfeleltetést.

Ez az  **$f$ -hez  $f \circ (1, 2)$ -t** rendel.

Mivel  $(1, 2)$  páratlan, az előjelek szorzástétele miatt páros permutációhoz páratlant, páratlanhoz párosat rendel.

**Kölcsönösen egyértelmű**, mert **önmagának az inverze**:

$$(f \circ (1, 2)) \circ (1, 2) = f \circ ((1, 2) \circ (1, 2)) = f \circ id$$

# A páros permutációk száma

## Állítás (K4.2.16)

Ha  $n \geq 2$ , akkor  $S_n$ -ben a páros és páratlan permutációk száma egyaránt  $n!/2$ .

## Bizonyítás

Elég: **ugyanannyi** páros és páratlan permutáció van.

Megadunk köztük egy kölcsönösen egyértelmű megfeleltetést.

Ez az  **$f$ -hez  $f \circ (1, 2)$ -t** rendel.

Mivel  $(1, 2)$  páratlan, az előjelek szorzástétele miatt páros permutációhoz páratlant, páratlanhoz párosat rendel.

**Kölcsönösen egyértelmű**, mert **önmagának az inverze**:

$$(f \circ (1, 2)) \circ (1, 2) = f \circ ((1, 2) \circ (1, 2)) = f \circ id = f,$$

# A páros permutációk száma

## Állítás (K4.2.16)

Ha  $n \geq 2$ , akkor  $S_n$ -ben a páros és páratlan permutációk száma egyaránt  $n!/2$ .

## Bizonyítás

Elég: **ugyanannyi** páros és páratlan permutáció van.  
Megadunk köztük egy kölcsönösen egyértelmű megfeleltetést.

Ez az  $f$ -hez  $f \circ (1, 2)$ -t rendel.

Mivel  $(1, 2)$  páratlan, az előjelek szorzástétele miatt páros permutációhoz páratlant, páratlanhoz párosat rendel.

**Kölcsönösen egyértelmű**, mert **önmagának az inverze**:

$$(f \circ (1, 2)) \circ (1, 2) = f \circ ((1, 2) \circ (1, 2)) = f \circ id = f,$$

azaz ha kétszer csináljuk, visszakapjuk az eredeti  $f$ -et. □

# A páros permutációk száma

## Állítás (K4.2.16)

Ha  $n \geq 2$ , akkor  $S_n$ -ben a páros és páratlan permutációk száma egyaránt  $n!/2$ .

## Bizonyítás

Elég: **ugyanannyi** páros és páratlan permutáció van.  
Megadunk köztük egy kölcsönösen egyértelmű megfeleltetést.

Ez az  $f$ -hez  $f \circ (1, 2)$ -t rendel.

Mivel  $(1, 2)$  páratlan, az előjelek szorzástétele miatt páros permutációhoz páratlant, páratlanhoz párosat rendel.

**Kölcsönösen egyértelmű**, mert **önmagának az inverze**:

$$(f \circ (1, 2)) \circ (1, 2) = f \circ ((1, 2) \circ (1, 2)) = f \circ id = f,$$

azaz ha kétszer csináljuk, visszakapjuk az eredeti  $f$ -et. □

Ugyanez  $(1, 2)$  helyett minden  $(i, j)$ -re megy.

A  $3 \times 3$ -as determináns elemzése

$$M = ((a_{ij})) \implies \det(M) = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - \\ - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} .$$

## A $3 \times 3$ -as determináns elemzése

$$M = ((a_{ij})) \implies \det(M) = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - \\ - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}.$$

Mind a hat tagban (pl.  $a_{12}a_{23}a_{31}$ -ben) az első indexek: **1, 2, 3**,

## A $3 \times 3$ -as determináns elemzése

$$M = ((a_{ij})) \implies \det(M) = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - \\ - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}.$$

Mind a hat tagban (pl.  $a_{12}a_{23}a_{31}$ -ben) az első indexek: **1, 2, 3**, így mindegyik szorzatnak **a determináns minden sorában** van tényezője.

## A $3 \times 3$ -as determináns elemzése

$$M = ((a_{ij})) \implies \det(M) = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - \\ - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}.$$

Mind a hat tagban (pl.  $a_{12}a_{23}a_{31}$ -ben) az első indexek: **1, 2, 3**, így mindegyik szorzatnak **a determináns minden sorában** van tényezője. A második indexek egy **PERMUTÁCIÓT** adnak,



## A $3 \times 3$ -as determináns elemzése

$$M = ((a_{ij})) \implies \det(M) = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - \\ - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}.$$

Mind a hat tagban (pl.  $a_{12}a_{23}a_{31}$ -ben) az első indexek: **1, 2, 3**, így mindegyik szorzatnak **a determináns minden sorában** van tényezője. A második indexek egy **PERMUTÁCIÓT** adnak, pl. **2, 3, 1**.

## A $3 \times 3$ -as determináns elemzése

$$M = ((a_{ij})) \implies \det(M) = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - \\ - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}.$$

Mind a hat tagban (pl.  $a_{12}a_{23}a_{31}$ -ben) az első indexek: **1, 2, 3**, így mindegyik szorzatnak **a determináns minden sorában** van tényezője.

A második indexek egy **PERMUTÁCIÓT** adnak, pl. **2, 3, 1**.

Ezért **a determináns minden oszlopában is van egy tényező**.

## A $3 \times 3$ -as determináns elemzése

$$M = ((a_{ij})) \implies \det(M) = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - \\ - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}.$$

Mind a hat tagban (pl.  $a_{12}a_{23}a_{31}$ -ben) az első indexek: **1, 2, 3**, így mindegyik szorzatnak **a determináns minden sorában** van tényezője.

A második indexek egy **PERMUTÁCIÓT** adnak, pl. **2, 3, 1**.

Ezért **a determináns minden oszlopában is van egy tényező**.

A pozitív előjellel ellátott tagokhoz tartozó három permutáció:

## A $3 \times 3$ -as determináns elemzése

$$M = ((a_{ij})) \implies \det(M) = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - \\ - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}.$$

Mind a hat tagban (pl.  $a_{12}a_{23}a_{31}$ -ben) az első indexek: **1, 2, 3**, így mindegyik szorzatnak **a determináns minden sorában** van tényezője.

A második indexek egy **PERMUTÁCIÓT** adnak, pl. **2, 3, 1**.

Ezért **a determináns minden oszlopában is van egy tényező**.

A pozitív előjellel ellátott tagokhoz tartozó három permutáció:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$

## A $3 \times 3$ -as determináns elemzése

$$M = ((a_{ij})) \implies \det(M) = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - \\ - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}.$$

Mind a hat tagban (pl.  $a_{12}a_{23}a_{31}$ -ben) az első indexek: **1, 2, 3**, így mindegyik szorzatnak **a determináns minden sorában** van tényezője.

A második indexek egy **PERMUTÁCIÓT** adnak, pl. **2, 3, 1**.

Ezért **a determináns minden oszlopában is van egy tényező**.

A pozitív előjellel ellátott tagokhoz tartozó három permutáció:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

## A $3 \times 3$ -as determináns elemzése

$$M = ((a_{ij})) \implies \det(M) = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - \\ - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}.$$

Mind a hat tagban (pl.  $a_{12}a_{23}a_{31}$ -ben) az első indexek: **1, 2, 3**, így mindegyik szorzatnak **a determináns minden sorában** van tényezője.

A második indexek egy **PERMUTÁCIÓT** adnak, pl. **2, 3, 1**.

Ezért **a determináns minden oszlopában is van egy tényező**.

A pozitív előjellel ellátott tagokhoz tartozó három permutáció:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

## A $3 \times 3$ -as determináns elemzése

$$M = ((a_{ij})) \implies \det(M) = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - \\ - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}.$$

Mind a hat tagban (pl.  $a_{12}a_{23}a_{31}$ -ben) az első indexek: **1, 2, 3**, így mindegyik szorzatnak **a determináns minden sorában** van tényezője.

A második indexek egy **PERMUTÁCIÓT** adnak, pl. **2, 3, 1**.

Ezért **a determináns minden oszlopában is van egy tényező**.

A pozitív előjellel ellátott tagokhoz tartozó három permutáció:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

Ezek előjele **+1**

## A $3 \times 3$ -as determináns elemzése

$$M = ((a_{ij})) \implies \det(M) = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - \\ - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}.$$

Mind a hat tagban (pl.  $a_{12}a_{23}a_{31}$ -ben) az első indexek: **1, 2, 3**, így mindegyik szorzatnak **a determináns minden sorában** van tényezője.

A második indexek egy **PERMUTÁCIÓT** adnak, pl. **2, 3, 1**.

Ezért **a determináns minden oszlopában is van egy tényező**.

A pozitív előjellel ellátott tagokhoz tartozó három permutáció:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

Ezek előjele **+1** (rendre **0, 2, 2** darab inverzió).



## A $3 \times 3$ -as determináns elemzése

$$M = ((a_{ij})) \implies \det(M) = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - \\ - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}.$$

Mind a hat tagban (pl.  $a_{12}a_{23}a_{31}$ -ben) az első indexek: **1, 2, 3**, így mindegyik szorzatnak **a determináns minden sorában** van tényezője.

A második indexek egy **PERMUTÁCIÓT** adnak, pl. **2, 3, 1**.

Ezért **a determináns minden oszlopában is van egy tényező**.

A pozitív előjellel ellátott tagokhoz tartozó három permutáció:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

Ezek előjele **+1** (rendre **0, 2, 2** darab inverzió).

A negatív előjellel ellátott tagokhoz tartozó három permutáció:

## A $3 \times 3$ -as determináns elemzése

$$M = ((a_{ij})) \implies \det(M) = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - \\ - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}.$$

Mind a hat tagban (pl.  $a_{12}a_{23}a_{31}$ -ben) az első indexek: **1, 2, 3**, így mindegyik szorzatnak **a determináns minden sorában** van tényezője.

A második indexek egy **PERMUTÁCIÓT** adnak, pl. **2, 3, 1**.

Ezért **a determináns minden oszlopában is van egy tényező**.

A pozitív előjellel ellátott tagokhoz tartozó három permutáció:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

Ezek előjele **+1** (rendre **0, 2, 2** darab inverzió).

A negatív előjellel ellátott tagokhoz tartozó három permutáció:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

## A $3 \times 3$ -as determináns elemzése

$$M = ((a_{ij})) \implies \det(M) = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - \\ - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}.$$

Mind a hat tagban (pl.  $a_{12}a_{23}a_{31}$ -ben) az első indexek: **1, 2, 3**, így mindegyik szorzatnak **a determináns minden sorában** van tényezője.

A második indexek egy **PERMUTÁCIÓT** adnak, pl. **2, 3, 1**.

Ezért **a determináns minden oszlopában is van egy tényező**.

A pozitív előjellel ellátott tagokhoz tartozó három permutáció:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

Ezek előjele **+1** (rendre **0, 2, 2** darab inverzió).

A negatív előjellel ellátott tagokhoz tartozó három permutáció:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{bmatrix}$$

## A $3 \times 3$ -as determináns elemzése

$$M = ((a_{ij})) \implies \det(M) = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - \\ - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}.$$

Mind a hat tagban (pl.  $a_{12}a_{23}a_{31}$ -ben) az első indexek: **1, 2, 3**, így mindegyik szorzatnak **a determináns minden sorában** van tényezője.

A második indexek egy **PERMUTÁCIÓT** adnak, pl. **2, 3, 1**.

Ezért **a determináns minden oszlopában is van egy tényező**.

A pozitív előjellel ellátott tagokhoz tartozó három permutáció:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

Ezek előjele **+1** (rendre **0, 2, 2** darab inverzió).

A negatív előjellel ellátott tagokhoz tartozó három permutáció:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

## A $3 \times 3$ -as determináns elemzése

$$M = ((a_{ij})) \implies \det(M) = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - \\ - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}.$$

Mind a hat tagban (pl.  $a_{12}a_{23}a_{31}$ -ben) az első indexek: **1, 2, 3**, így mindegyik szorzatnak **a determináns minden sorában** van tényezője.

A második indexek egy **PERMUTÁCIÓT** adnak, pl. **2, 3, 1**.

Ezért **a determináns minden oszlopában is van egy tényező**.

A pozitív előjellel ellátott tagokhoz tartozó három permutáció:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

Ezek előjele **+1** (rendre **0, 2, 2** darab inverzió).

A negatív előjellel ellátott tagokhoz tartozó három permutáció:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

Ezek előjele **-1**

## A $3 \times 3$ -as determináns elemzése

$$M = ((a_{ij})) \implies \det(M) = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - \\ - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}.$$

Mind a hat tagban (pl.  $a_{12}a_{23}a_{31}$ -ben) az első indexek: **1, 2, 3**, így mindegyik szorzatnak **a determináns minden sorában** van tényezője.

A második indexek egy **PERMUTÁCIÓT** adnak, pl. **2, 3, 1**.

Ezért **a determináns minden oszlopában is van egy tényező**.

A pozitív előjellel ellátott tagokhoz tartozó három permutáció:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

Ezek előjele **+1** (rendre **0, 2, 2** darab inverzió).

A negatív előjellel ellátott tagokhoz tartozó három permutáció:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

Ezek előjele **-1** (rendre **3, 1, 1** darab inverzió).

A  $3 \times 3$ -as determináns permutációs képlete

$$f_1 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \quad f_2 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix} \quad f_3 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$f_4 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix} \quad f_5 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{bmatrix} \quad f_6 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

$$\text{sg}(f_1) = \text{sg}(f_2) = \text{sg}(f_3) = +1, \quad \text{sg}(f_4) = \text{sg}(f_5) = \text{sg}(f_6) = -1.$$

## A $3 \times 3$ -as determináns permutációs képlete

$$f_1 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \quad f_2 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix} \quad f_3 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$f_4 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix} \quad f_5 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{bmatrix} \quad f_6 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

$$\text{sg}(f_1) = \text{sg}(f_2) = \text{sg}(f_3) = +1, \quad \text{sg}(f_4) = \text{sg}(f_5) = \text{sg}(f_6) = -1.$$

$$\begin{aligned} & a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - \\ & - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} = \end{aligned}$$



## A $3 \times 3$ -as determináns permutációs képlete

$$f_1 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \quad f_2 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix} \quad f_3 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$f_4 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix} \quad f_5 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{bmatrix} \quad f_6 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

$$\operatorname{sg}(f_1) = \operatorname{sg}(f_2) = \operatorname{sg}(f_3) = +1, \quad \operatorname{sg}(f_4) = \operatorname{sg}(f_5) = \operatorname{sg}(f_6) = -1.$$

$$\begin{aligned} & a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - \\ & - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} = \\ & = \operatorname{sg}(f_1)a_{1f_1(1)}a_{2f_1(2)}a_{3f_1(3)} + \end{aligned}$$

## A $3 \times 3$ -as determináns permutációs képlete

$$f_1 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \quad f_2 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix} \quad f_3 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$f_4 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix} \quad f_5 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{bmatrix} \quad f_6 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

$$\operatorname{sg}(f_1) = \operatorname{sg}(f_2) = \operatorname{sg}(f_3) = +1, \quad \operatorname{sg}(f_4) = \operatorname{sg}(f_5) = \operatorname{sg}(f_6) = -1.$$

$$\begin{aligned} & a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - \\ & - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} = \\ & = \operatorname{sg}(f_1)a_{1f_1(1)}a_{2f_1(2)}a_{3f_1(3)} + \operatorname{sg}(f_2)a_{1f_2(1)}a_{2f_2(2)}a_{3f_2(3)} + \end{aligned}$$

## A $3 \times 3$ -as determináns permutációs képlete

$$f_1 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \quad f_2 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix} \quad f_3 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$f_4 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix} \quad f_5 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{bmatrix} \quad f_6 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

$$\operatorname{sg}(f_1) = \operatorname{sg}(f_2) = \operatorname{sg}(f_3) = +1, \quad \operatorname{sg}(f_4) = \operatorname{sg}(f_5) = \operatorname{sg}(f_6) = -1.$$

$$\begin{aligned} & a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - \\ & - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} = \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & = \operatorname{sg}(f_1)a_{1f_1(1)}a_{2f_1(2)}a_{3f_1(3)} + \operatorname{sg}(f_2)a_{1f_2(1)}a_{2f_2(2)}a_{3f_2(3)} + \\ & + \operatorname{sg}(f_3)a_{1f_3(1)}a_{2f_3(2)}a_{3f_3(3)} + \end{aligned}$$

## A $3 \times 3$ -as determináns permutációs képlete

$$f_1 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \quad f_2 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix} \quad f_3 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$f_4 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix} \quad f_5 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{bmatrix} \quad f_6 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

$$\text{sg}(f_1) = \text{sg}(f_2) = \text{sg}(f_3) = +1, \quad \text{sg}(f_4) = \text{sg}(f_5) = \text{sg}(f_6) = -1.$$

$$\begin{aligned} & a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - \\ & - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} = \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & = \text{sg}(f_1)a_{1f_1(1)}a_{2f_1(2)}a_{3f_1(3)} + \text{sg}(f_2)a_{1f_2(1)}a_{2f_2(2)}a_{3f_2(3)} + \\ & + \text{sg}(f_3)a_{1f_3(1)}a_{2f_3(2)}a_{3f_3(3)} + \text{sg}(f_4)a_{1f_4(1)}a_{2f_4(2)}a_{3f_4(3)} + \end{aligned}$$

## A $3 \times 3$ -as determináns permutációs képlete

$$f_1 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \quad f_2 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix} \quad f_3 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$f_4 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix} \quad f_5 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{bmatrix} \quad f_6 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

$$\operatorname{sg}(f_1) = \operatorname{sg}(f_2) = \operatorname{sg}(f_3) = +1, \quad \operatorname{sg}(f_4) = \operatorname{sg}(f_5) = \operatorname{sg}(f_6) = -1.$$

$$\begin{aligned} & a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - \\ & - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} = \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & = \operatorname{sg}(f_1)a_{1f_1(1)}a_{2f_1(2)}a_{3f_1(3)} + \operatorname{sg}(f_2)a_{1f_2(1)}a_{2f_2(2)}a_{3f_2(3)} + \\ & + \operatorname{sg}(f_3)a_{1f_3(1)}a_{2f_3(2)}a_{3f_3(3)} + \operatorname{sg}(f_4)a_{1f_4(1)}a_{2f_4(2)}a_{3f_4(3)} + \\ & + \operatorname{sg}(f_5)a_{1f_5(1)}a_{2f_5(2)}a_{3f_5(3)} + \end{aligned}$$

## A $3 \times 3$ -as determináns permutációs képlete

$$f_1 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \quad f_2 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix} \quad f_3 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$f_4 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix} \quad f_5 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{bmatrix} \quad f_6 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

$$\operatorname{sg}(f_1) = \operatorname{sg}(f_2) = \operatorname{sg}(f_3) = +1, \quad \operatorname{sg}(f_4) = \operatorname{sg}(f_5) = \operatorname{sg}(f_6) = -1.$$

$$\begin{aligned} & a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - \\ & - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} = \\ & = \operatorname{sg}(f_1)a_{1f_1(1)}a_{2f_1(2)}a_{3f_1(3)} + \operatorname{sg}(f_2)a_{1f_2(1)}a_{2f_2(2)}a_{3f_2(3)} + \\ & + \operatorname{sg}(f_3)a_{1f_3(1)}a_{2f_3(2)}a_{3f_3(3)} + \operatorname{sg}(f_4)a_{1f_4(1)}a_{2f_4(2)}a_{3f_4(3)} + \\ & + \operatorname{sg}(f_5)a_{1f_5(1)}a_{2f_5(2)}a_{3f_5(3)} + \operatorname{sg}(f_6)a_{1f_6(1)}a_{2f_6(2)}a_{3f_6(3)} = \end{aligned}$$

# A $3 \times 3$ -as determináns permutációs képlete

$$f_1 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \quad f_2 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix} \quad f_3 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$f_4 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix} \quad f_5 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{bmatrix} \quad f_6 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

$$\text{sg}(f_1) = \text{sg}(f_2) = \text{sg}(f_3) = +1, \quad \text{sg}(f_4) = \text{sg}(f_5) = \text{sg}(f_6) = -1.$$

$$\begin{aligned} & a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - \\ & - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} = \\ & = \text{sg}(f_1)a_{1f_1(1)}a_{2f_1(2)}a_{3f_1(3)} + \text{sg}(f_2)a_{1f_2(1)}a_{2f_2(2)}a_{3f_2(3)} + \\ & + \text{sg}(f_3)a_{1f_3(1)}a_{2f_3(2)}a_{3f_3(3)} + \text{sg}(f_4)a_{1f_4(1)}a_{2f_4(2)}a_{3f_4(3)} + \\ & + \text{sg}(f_5)a_{1f_5(1)}a_{2f_5(2)}a_{3f_5(3)} + \text{sg}(f_6)a_{1f_6(1)}a_{2f_6(2)}a_{3f_6(3)} = \\ & = \sum_{f \in S_3} \text{sg}(f)a_{1f(1)}a_{2f(2)}a_{3f(3)}. \end{aligned}$$

# Az $n \times n$ -es determináns definíciója

## Definíció (F1.2.2. Definíció)

Legyen  $T = \mathbb{C}, \mathbb{R}, \mathbb{Q}$  és  $M = ((a_{ij})) \in T^{n \times n}$  egy  $n \times n$ -es mátrix.



# Az $n \times n$ -es determináns definíciója

## Definíció (F1.2.2. Definíció)

Legyen  $T = \mathbb{C}, \mathbb{R}, \mathbb{Q}$  és  $M = ((a_{ij})) \in T^{n \times n}$  egy  $n \times n$ -es mátrix.  
Ekkor az  $M$  determinánsa legyen

$$\det(M) = \sum_{f \in S_n} \text{sg}(f) a_{1f(1)} a_{2f(2)} \cdots a_{nf(n)}.$$

# Az $n \times n$ -es determináns definíciója

## Definíció (F1.2.2. Definíció)

Legyen  $T = \mathbb{C}, \mathbb{R}, \mathbb{Q}$  és  $M = ((a_{ij})) \in T^{n \times n}$  egy  $n \times n$ -es mátrix.  
Ekkor az  $M$  determinánsa legyen

$$\det(M) = \sum_{f \in S_n} \text{sg}(f) a_{1f(1)} a_{2f(2)} \cdots a_{nf(n)}.$$

## Példa

Az  $5 \times 5$ -ös determináns  $5! = 120$  tagból áll.

# Az $n \times n$ -es determináns definíciója

## Definíció (F1.2.2. Definíció)

Legyen  $T = \mathbb{C}, \mathbb{R}, \mathbb{Q}$  és  $M = ((a_{ij})) \in T^{n \times n}$  egy  $n \times n$ -es mátrix. Ekkor az  $M$  determinánsa legyen

$$\det(M) = \sum_{f \in S_n} \text{sg}(f) a_{1f(1)} a_{2f(2)} \cdots a_{nf(n)}.$$

## Példa

Az  $5 \times 5$ -ös determináns  $5! = 120$  tagból áll. Az

$$f = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 4 & 5 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

permutáció előjele  $-1$

# Az $n \times n$ -es determináns definíciója

## Definíció (F1.2.2. Definíció)

Legyen  $T = \mathbb{C}, \mathbb{R}, \mathbb{Q}$  és  $M = ((a_{ij})) \in T^{n \times n}$  egy  $n \times n$ -es mátrix. Ekkor az  $M$  determinánsa legyen

$$\det(M) = \sum_{f \in S_n} \text{sg}(f) a_{1f(1)} a_{2f(2)} \cdots a_{nf(n)}.$$

## Példa

Az  $5 \times 5$ -ös determináns  $5! = 120$  tagból áll. Az

$$f = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 4 & 5 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

permutáció előjele  $-1$  (láttuk, hogy  $5$  inverzió van).

# Az $n \times n$ -es determináns definíciója

## Definíció (F1.2.2. Definíció)

Legyen  $T = \mathbb{C}, \mathbb{R}, \mathbb{Q}$  és  $M = ((a_{ij})) \in T^{n \times n}$  egy  $n \times n$ -es mátrix. Ekkor az  $M$  determinánsa legyen

$$\det(M) = \sum_{f \in S_n} \text{sg}(f) a_{1f(1)} a_{2f(2)} \cdots a_{nf(n)}.$$

## Példa

Az  $5 \times 5$ -ös determináns  $5! = 120$  tagból áll. Az

$$f = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 4 & 5 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

permutáció előjele  $-1$  (láttuk, hogy  $5$  inverzió van).

Az ehhez tartozó tag  $-a_{12} a_{24} a_{35} a_{41} a_{53}$ .

# Az $n \times n$ -es determináns definíciója

## Definíció (F1.2.2. Definíció)

Legyen  $T = \mathbb{C}, \mathbb{R}, \mathbb{Q}$  és  $M = ((a_{ij})) \in T^{n \times n}$  egy  $n \times n$ -es mátrix. Ekkor az  $M$  determinánsa legyen

$$\det(M) = \sum_{f \in S_n} \text{sg}(f) a_{1f(1)} a_{2f(2)} \cdots a_{nf(n)}.$$

## Példa

Az  $5 \times 5$ -ös determináns  $5! = 120$  tagból áll. Az

$$f = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 4 & 5 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

permutáció előjele  $-1$  (láttuk, hogy  $5$  inverzió van).

Az ehhez tartozó tag  $-a_{12} a_{24} a_{35} a_{41} a_{53}$ .

**FONTOS:** e szorzat előjelét a permutáció előjele, és

**NEM** a kifejtésnél definiált sakktáblaszabály adja!

# A megkívánt tulajdonságok

Tétel (F1.3.1–1.3.6. és F2.2.2–2.2.4. Tételek)

Ha  $T = \mathbb{C}, \mathbb{R}, \mathbb{Q}$ , akkor  $T^{n \times n}$ -en értelmezett determinánsra igaz:

# A megkívánt tulajdonságok

## Tétel (F1.3.1–1.3.6. és F2.2.2–2.2.4. Tételek)

Ha  $T = \mathbb{C}, \mathbb{R}, \mathbb{Q}$ , akkor  $T^{n \times n}$ -en értelmezett determinánsra igaz:

- (1) Minden oszlopában lineáris.



# A megkívánt tulajdonságok

## Tétel (F1.3.1–1.3.6. és F2.2.2–2.2.4. Tételek)

Ha  $T = \mathbb{C}, \mathbb{R}, \mathbb{Q}$ , akkor  $T^{n \times n}$ -en értelmezett determinánsra igaz:

- (1) Minden oszlopában lineáris.
- (2) Ha két oszlop egyenlő,

# A megkívánt tulajdonságok

## Tétel (F1.3.1–1.3.6. és F2.2.2–2.2.4. Tételek)

Ha  $T = \mathbb{C}, \mathbb{R}, \mathbb{Q}$ , akkor  $T^{n \times n}$ -en értelmezett determinánsra igaz:

- (1) Minden oszlopában lineáris.
- (2) Ha két oszlop egyenlő, akkor a determináns nulla.

# A megkívánt tulajdonságok

## Tétel (F1.3.1–1.3.6. és F2.2.2–2.2.4. Tételek)

Ha  $T = \mathbb{C}, \mathbb{R}, \mathbb{Q}$ , akkor  $T^{n \times n}$ -en értelmezett determinánsra igaz:

- (1) Minden oszlopában lineáris.
- (2) Ha két oszlop egyenlő, akkor a determináns nulla.
- (3) Az egységmátrix determinánása  $1$ ,

# A megkívánt tulajdonságok

## Tétel (F1.3.1–1.3.6. és F2.2.2–2.2.4. Tételek)

Ha  $T = \mathbb{C}, \mathbb{R}, \mathbb{Q}$ , akkor  $T^{n \times n}$ -en értelmezett determinánsra igaz:

- (1) Minden oszlopában lineáris.
- (2) Ha két oszlop egyenlő, akkor a determináns nulla.
- (3) Az egységmátrix determinánsa **1**, sőt felső háromszög-mátrix determinánsa a főátlóbeli elemek szorzata.

# A megkívánt tulajdonságok

## Tétel (F1.3.1–1.3.6. és F2.2.2–2.2.4. Tételek)

Ha  $T = \mathbb{C}, \mathbb{R}, \mathbb{Q}$ , akkor  $T^{n \times n}$ -en értelmezett determinánsra igaz:

- (1) Minden oszlopában lineáris.
- (2) Ha két oszlop egyenlő, akkor a determináns nulla.
- (3) Az egységmátrix determinánása **1**, sőt felső háromszög-mátrix determinánása a főátlóbeli elemek szorzata.
- (4) Ha az egyik oszlophoz egy másik oszlop skalárszorosát adjuk,

# A megkívánt tulajdonságok

## Tétel (F1.3.1–1.3.6. és F2.2.2–2.2.4. Tételek)

Ha  $T = \mathbb{C}, \mathbb{R}, \mathbb{Q}$ , akkor  $T^{n \times n}$ -en értelmezett determinánsra igaz:

- (1) Minden oszlopában lineáris.
- (2) Ha két oszlop egyenlő, akkor a determináns nulla.
- (3) Az egységmátrix determinánása **1**, sőt felső háromszög-mátrix determinánása a főátlóbeli elemek szorzata.
- (4) Ha az egyik oszlophoz egy másik oszlop skalárszorosát adjuk, akkor a determináns nem változik.

# A megkívánt tulajdonságok

## Tétel (F1.3.1–1.3.6. és F2.2.2–2.2.4. Tételek)

Ha  $T = \mathbb{C}, \mathbb{R}, \mathbb{Q}$ , akkor  $T^{n \times n}$ -en értelmezett determinánsra igaz:

- (1) Minden oszlopában lineáris.
- (2) Ha két oszlop egyenlő, akkor a determináns nulla.
- (3) Az egységmátrix determinánása **1**, sőt felső háromszög-mátrix determinánása a főátlóbeli elemek szorzata.
- (4) Ha az egyik oszlophoz egy másik oszlop skalárszorosát adjuk, akkor a determináns nem változik.
- (5) Bármely két oszlop cseréjekor előjelet vált.

# A megkívánt tulajdonságok

## Tétel (F1.3.1–1.3.6. és F2.2.2–2.2.4. Tételek)

Ha  $T = \mathbb{C}, \mathbb{R}, \mathbb{Q}$ , akkor  $T^{n \times n}$ -en értelmezett determinánsra igaz:

- (1) Minden oszlopában lineáris.
- (2) Ha két oszlop egyenlő, akkor a determináns nulla.
- (3) Az egységmátrix determinánása **1**, sőt felső háromszög-mátrix determinánása a főátlóbeli elemek szorzata.
- (4) Ha az egyik oszlophoz egy másik oszlop skalárszorosát adjuk, akkor a determináns nem változik.
- (5) Bármely két oszlop cseréjekor előjelet vált.
- (6) Transzponált determinánása ugyanaz, mint az eredetié



# A megkívánt tulajdonságok

## Tétel (F1.3.1–1.3.6. és F2.2.2–2.2.4. Tételek)

Ha  $T = \mathbb{C}, \mathbb{R}, \mathbb{Q}$ , akkor  $T^{n \times n}$ -en értelmezett determinánsra igaz:

- (1) Minden oszlopában lineáris.
- (2) Ha két oszlop egyenlő, akkor a determináns nulla.
- (3) Az egységmátrix determinánása **1**, sőt felső háromszög-mátrix determinánása a főátlóbeli elemek szorzata.
- (4) Ha az egyik oszlophoz egy másik oszlop skalárszorosát adjuk, akkor a determináns nem változik.
- (5) Bármely két oszlop cseréjekor előjelet vált.
- (6) Transzponált determinánása ugyanaz, mint az eredetié (így az oszlopokra kimondott tulajdonságok sorokra is igazak).

# A megkívánt tulajdonságok

## Tétel (F1.3.1–1.3.6. és F2.2.2–2.2.4. Tételek)

Ha  $T = \mathbb{C}, \mathbb{R}, \mathbb{Q}$ , akkor  $T^{n \times n}$ -en értelmezett determinánsra igaz:

- (1) Minden oszlopában lineáris.
- (2) Ha két oszlop egyenlő, akkor a determináns nulla.
- (3) Az egységmátrix determinánása **1**, sőt felső háromszög-mátrix determinánása a főátlóbeli elemek szorzata.
- (4) Ha az egyik oszlophoz egy másik oszlop skalárszorosát adjuk, akkor a determináns nem változik.
- (5) Bármely két oszlop cseréjekor előjelet vált.
- (6) Transzponált determinánása ugyanaz, mint az eredetié (így az oszlopokra kimondott tulajdonságok sorokra is igazak).
- (7)  $\det(MN) = \det(M)\det(N)$  bármely két mátrixra.

# A megkívánt tulajdonságok

## Tétel (F1.3.1–1.3.6. és F2.2.2–2.2.4. Tételek)

Ha  $T = \mathbb{C}, \mathbb{R}, \mathbb{Q}$ , akkor  $T^{n \times n}$ -en értelmezett determinánsra igaz:

- (1) Minden oszlopában lineáris.
- (2) Ha két oszlop egyenlő, akkor a determináns nulla.
- (3) Az egységmátrix determinánása **1**, sőt felső háromszög-mátrix determinánása a főátlóbeli elemek szorzata.
- (4) Ha az egyik oszlophoz egy másik oszlop skalárszorosát adjuk, akkor a determináns nem változik.
- (5) Bármely két oszlop cseréjekor előjelet vált.
- (6) Transzponált determinánása ugyanaz, mint az eredetié (így az oszlopokra kimondott tulajdonságok sorokra is igazak).
- (7)  $\det(MN) = \det(M)\det(N)$  bármely két mátrixra.
- (8) Egy mátrix akkor invertálható,

# A megkívánt tulajdonságok

## Tétel (F1.3.1–1.3.6. és F2.2.2–2.2.4. Tételek)

Ha  $T = \mathbb{C}, \mathbb{R}, \mathbb{Q}$ , akkor  $T^{n \times n}$ -en értelmezett determinánsra igaz:

- (1) Minden oszlopában lineáris.
- (2) Ha két oszlop egyenlő, akkor a determináns nulla.
- (3) Az egységmátrix determinánása **1**, sőt felső háromszög-mátrix determinánása a főátlóbeli elemek szorzata.
- (4) Ha az egyik oszlophoz egy másik oszlop skalárszorosát adjuk, akkor a determináns nem változik.
- (5) Bármely két oszlop cseréjekor előjelet vált.
- (6) Transzponált determinánása ugyanaz, mint az eredetié (így az oszlopokra kimondott tulajdonságok sorokra is igazak).
- (7)  $\det(MN) = \det(M)\det(N)$  bármely két mátrixra.
- (8) Egy mátrix akkor invertálható, ha determinánása nem nulla.

# A skalárszoros-tartás

Legyen  $T = \mathbb{C}, \mathbb{R}, \mathbb{Q}$  és  $M = ((a_{ij})) \in T^{n \times n}$  egy  $n \times n$ -es mátrix.

# A skalárszoros-tartás

Legyen  $T = \mathbb{C}, \mathbb{R}, \mathbb{Q}$  és  $M = ((a_{ij})) \in T^{n \times n}$  egy  $n \times n$ -es mátrix.

$$\text{Ekkor } \det(M) = \sum_{f \in S_n} \text{sg}(f) a_{1f(1)} a_{2f(2)} \cdots a_{nf(n)}.$$

# A skalárszoros-tartás

Legyen  $T = \mathbb{C}, \mathbb{R}, \mathbb{Q}$  és  $M = ((a_{ij})) \in T^{n \times n}$  egy  $n \times n$ -es mátrix.

$$\text{Ekkor } \det(M) = \sum_{f \in S_n} \text{sg}(f) a_{1f(1)} a_{2f(2)} \cdots a_{nf(n)}.$$

Skalárszoros-tartás (F1.3.1/III. Tétel)

# A skalárszoros-tartás

Legyen  $T = \mathbb{C}, \mathbb{R}, \mathbb{Q}$  és  $M = ((a_{ij})) \in T^{n \times n}$  egy  $n \times n$ -es mátrix.

$$\text{Ekkor } \det(M) = \sum_{f \in S_n} \text{sg}(f) a_{1f(1)} a_{2f(2)} \cdots a_{nf(n)}.$$

## Skalárszoros-tartás (F1.3.1/III. Tétel)

Az egyszerűbb jelölés kedvéért az első sort szorozzuk  $\lambda$ -val.



# A skalárszoros-tartás

Legyen  $T = \mathbb{C}, \mathbb{R}, \mathbb{Q}$  és  $M = ((a_{ij})) \in T^{n \times n}$  egy  $n \times n$ -es mátrix.

$$\text{Ekkor } \det(M) = \sum_{f \in S_n} \text{sg}(f) a_{1f(1)} a_{2f(2)} \cdots a_{nf(n)}.$$

## Skalárszoros-tartás (F1.3.1/III. Tétel)

Az egyszerűbb jelölés kedvéért az első sort szorozzuk  $\lambda$ -val.  
Azaz  $a_{1j}$  helyére  $\lambda a_{1j}$  kerül.

# A skalárszoros-tartás

Legyen  $T = \mathbb{C}, \mathbb{R}, \mathbb{Q}$  és  $M = ((a_{ij})) \in T^{n \times n}$  egy  $n \times n$ -es mátrix.

$$\text{Ekkor } \det(M) = \sum_{f \in S_n} \text{sg}(f) a_{1f(1)} a_{2f(2)} \cdots a_{nf(n)}.$$

## Skalárszoros-tartás (F1.3.1/III. Tétel)

Az egyszerűbb jelölés kedvéért az első sort szorozzuk  $\lambda$ -val.

Azaz  $a_{1j}$  helyére  $\lambda a_{1j}$  kerül.

A fenti összegben minden tag első tényezője  $a_{1j}$  alakú alkalmas  $j$ -re,

# A skalárszoros-tartás

Legyen  $T = \mathbb{C}, \mathbb{R}, \mathbb{Q}$  és  $M = ((a_{ij})) \in T^{n \times n}$  egy  $n \times n$ -es mátrix.

$$\text{Ekkor } \det(M) = \sum_{f \in S_n} \text{sg}(f) a_{1f(1)} a_{2f(2)} \cdots a_{nf(n)}.$$

## Skalárszoros-tartás (F1.3.1/III. Tétel)

Az egyszerűbb jelölés kedvéért az első sort szorozzuk  $\lambda$ -val.

Azaz  $a_{1j}$  helyére  $\lambda a_{1j}$  kerül.

A fenti összegben minden tag első tényezője  $a_{1j}$  alakú alkalmas  $j$ -re, és több tényező a determináns első sorából nincs.

# A skalárszoros-tartás

Legyen  $T = \mathbb{C}, \mathbb{R}, \mathbb{Q}$  és  $M = ((a_{ij})) \in T^{n \times n}$  egy  $n \times n$ -es mátrix.

$$\text{Ekkor } \det(M) = \sum_{f \in S_n} \text{sg}(f) a_{1f(1)} a_{2f(2)} \cdots a_{nf(n)}.$$

## Skalárszoros-tartás (F1.3.1/III. Tétel)

Az egyszerűbb jelölés kedvéért az első sort szorozzuk  $\lambda$ -val.

Azaz  $a_{1j}$  helyére  $\lambda a_{1j}$  kerül.

A fenti összegben minden tag első tényezője  $a_{1j}$  alakú alkalmas  $j$ -re, és több tényező a determináns első sorából nincs.

Ezért az új determinánsban minden tényező  $\lambda$ -val szorzódik.

# A skalárszoros-tartás

Legyen  $T = \mathbb{C}, \mathbb{R}, \mathbb{Q}$  és  $M = ((a_{ij})) \in T^{n \times n}$  egy  $n \times n$ -es mátrix.

$$\text{Ekkor } \det(M) = \sum_{f \in S_n} \text{sg}(f) a_{1f(1)} a_{2f(2)} \cdots a_{nf(n)}.$$

## Skalárszoros-tartás (F1.3.1/III. Tétel)

Az egyszerűbb jelölés kedvéért az első sort szorozzuk  $\lambda$ -val.

Azaz  $a_{1j}$  helyére  $\lambda a_{1j}$  kerül.

A fenti összegben minden tag első tényezője  $a_{1j}$  alakú alkalmas  $j$ -re, és több tényező a determináns első sorából nincs.

Ezért az új determinánsban minden tényező  $\lambda$ -val szorzódik.

Így a teljes összeg, azaz a determináns is  $\lambda$ -val szorzódik. □

## A skalárszoros-tartás

Legyen  $T = \mathbb{C}, \mathbb{R}, \mathbb{Q}$  és  $M = ((a_{ij})) \in T^{n \times n}$  egy  $n \times n$ -es mátrix.

$$\text{Ekkor } \det(M) = \sum_{f \in S_n} \text{sg}(f) a_{1f(1)} a_{2f(2)} \cdots a_{nf(n)}.$$

### Skalárszoros-tartás (F1.3.1/III. Tétel)

Az egyszerűbb jelölés kedvéért az első sort szorozzuk  $\lambda$ -val.

Azaz  $a_{1j}$  helyére  $\lambda a_{1j}$  kerül.

A fenti összegben minden tag első tényezője  $a_{1j}$  alakú alkalmas  $j$ -re, és több tényező a determináns első sorából nincs.

Ezért az új determinánsban minden tényező  $\lambda$ -val szorzódik.

Így a teljes összeg, azaz a determináns is  $\lambda$ -val szorzódik.  $\square$

Ugyanez lesz, ha bármelyik oszlopot vagy sort szorozzuk  $\lambda$ -val,

# A skalárszoros-tartás

Legyen  $T = \mathbb{C}, \mathbb{R}, \mathbb{Q}$  és  $M = ((a_{ij})) \in T^{n \times n}$  egy  $n \times n$ -es mátrix.

$$\text{Ekkor } \det(M) = \sum_{f \in S_n} \text{sg}(f) a_{1f(1)} a_{2f(2)} \cdots a_{nf(n)}.$$

## Skalárszoros-tartás (F1.3.1/III. Tétel)

Az egyszerűbb jelölés kedvéért az első sort szorozzuk  $\lambda$ -val.

Azaz  $a_{1j}$  helyére  $\lambda a_{1j}$  kerül.

A fenti összegben minden tag első tényezője  $a_{1j}$  alakú alkalmas  $j$ -re, és több tényező a determináns első sorából nincs.

Ezért az új determinánsban minden tényező  $\lambda$ -val szorzódik.

Így a teljes összeg, azaz a determináns is  $\lambda$ -val szorzódik. □

Ugyanez lesz, ha bármelyik oszlopot vagy sort szorozzuk  $\lambda$ -val, mert az összeg mindegyik tagjában minden sorból és oszlopból pontosan egy tényező van.

# Az összegtartás

Legyen  $T = \mathbb{C}, \mathbb{R}, \mathbb{Q}$  és  $M = ((a_{ij})) \in T^{n \times n}$  egy  $n \times n$ -es mátrix.

$$\text{Ekkor } \det(M) = \sum_{f \in S_n} \text{sg}(f) a_{1f(1)} a_{2f(2)} \cdots a_{nf(n)}.$$

Összegtartás (F1.3.2. Tétel)



# Az összegtartás

Legyen  $T = \mathbb{C}, \mathbb{R}, \mathbb{Q}$  és  $M = ((a_{ij})) \in T^{n \times n}$  egy  $n \times n$ -es mátrix.

$$\text{Ekkor } \det(M) = \sum_{f \in S_n} \text{sg}(f) a_{1f(1)} a_{2f(2)} \cdots a_{nf(n)}.$$

## Összegtartás (F1.3.2. Tétel)

Az egyszerűbb jelölés kedvéért az első sort bontjuk összegre.

# Az összegtartás

Legyen  $T = \mathbb{C}, \mathbb{R}, \mathbb{Q}$  és  $M = ((a_{ij})) \in T^{n \times n}$  egy  $n \times n$ -es mátrix.

$$\text{Ekkor } \det(M) = \sum_{f \in S_n} \text{sg}(f) a_{1f(1)} a_{2f(2)} \cdots a_{nf(n)}.$$

## Összegtartás (F1.3.2. Tétel)

Az egyszerűbb jelölés kedvéért az első sort bontsuk összegre.

Azaz  $a_{1j}$  helyére  $b_{1j} + c_{1j}$  kerül.

# Az összegtartás

Legyen  $T = \mathbb{C}, \mathbb{R}, \mathbb{Q}$  és  $M = ((a_{ij})) \in T^{n \times n}$  egy  $n \times n$ -es mátrix.

$$\text{Ekkor } \det(M) = \sum_{f \in S_n} \text{sg}(f) a_{1f(1)} a_{2f(2)} \cdots a_{nf(n)}.$$

## Összegetartás (F1.3.2. Tétel)

Az egyszerűbb jelölés kedvéért az első sort bontsuk összegre.

Azaz  $a_{1j}$  helyére  $b_{1j} + c_{1j}$  kerül. Ekkor

$$a_{1f(1)} a_{2f(2)} \cdots a_{nf(n)} =$$

# Az összegtartás

Legyen  $T = \mathbb{C}, \mathbb{R}, \mathbb{Q}$  és  $M = ((a_{ij})) \in T^{n \times n}$  egy  $n \times n$ -es mátrix.

$$\text{Ekkor } \det(M) = \sum_{f \in S_n} \text{sg}(f) a_{1f(1)} a_{2f(2)} \cdots a_{nf(n)}.$$

## Összegtartás (F1.3.2. Tétel)

Az egyszerűbb jelölés kedvéért az első sort bontjuk összegre.

Azaz  $a_{1j}$  helyére  $b_{1j} + c_{1j}$  kerül. Ekkor

$$a_{1f(1)} a_{2f(2)} \cdots a_{nf(n)} = b_{1f(1)} a_{2f(2)} \cdots a_{nf(n)} +$$

# Az összegtartás

Legyen  $T = \mathbb{C}, \mathbb{R}, \mathbb{Q}$  és  $M = ((a_{ij})) \in T^{n \times n}$  egy  $n \times n$ -es mátrix.

$$\text{Ekkor } \det(M) = \sum_{f \in S_n} \text{sg}(f) a_{1f(1)} a_{2f(2)} \cdots a_{nf(n)}.$$

## Összegtartás (F1.3.2. Tétel)

Az egyszerűbb jelölés kedvéért az első sort bontsuk összegre.

Azaz  $a_{1j}$  helyére  $b_{1j} + c_{1j}$  kerül. Ekkor

$$a_{1f(1)} a_{2f(2)} \cdots a_{nf(n)} = b_{1f(1)} a_{2f(2)} \cdots a_{nf(n)} + c_{1f(1)} a_{2f(2)} \cdots a_{nf(n)}.$$

# Az összegtartás

Legyen  $T = \mathbb{C}, \mathbb{R}, \mathbb{Q}$  és  $M = ((a_{ij})) \in T^{n \times n}$  egy  $n \times n$ -es mátrix.

Ekkor  $\det(M) = \sum_{f \in S_n} \text{sg}(f) a_{1f(1)} a_{2f(2)} \cdots a_{nf(n)}$ .

## Összegetartás (F1.3.2. Tétel)

Az egyszerűbb jelölés kedvéért az első sort bontjuk összegre.

Azaz  $a_{1j}$  helyére  $b_{1j} + c_{1j}$  kerül. Ekkor

$a_{1f(1)} a_{2f(2)} \cdots a_{nf(n)} = b_{1f(1)} a_{2f(2)} \cdots a_{nf(n)} + c_{1f(1)} a_{2f(2)} \cdots a_{nf(n)}$ .

Így az eredeti determináns is két determináns összegére bomlik,

# Az összegtartás

Legyen  $T = \mathbb{C}, \mathbb{R}, \mathbb{Q}$  és  $M = ((a_{ij})) \in T^{n \times n}$  egy  $n \times n$ -es mátrix.

$$\text{Ekkor } \det(M) = \sum_{f \in S_n} \text{sg}(f) a_{1f(1)} a_{2f(2)} \cdots a_{nf(n)}.$$

## Összegetartás (F1.3.2. Tétel)

Az egyszerűbb jelölés kedvéért az első sort bontsuk összegre.

Azaz  $a_{1j}$  helyére  $b_{1j} + c_{1j}$  kerül. Ekkor

$$a_{1f(1)} a_{2f(2)} \cdots a_{nf(n)} = b_{1f(1)} a_{2f(2)} \cdots a_{nf(n)} + c_{1f(1)} a_{2f(2)} \cdots a_{nf(n)}.$$

Így az eredeti determináns is két determináns összegére bomlik, melyekben az első sorban  $b_{1j}$ , illetve  $c_{1j}$  szerepel.  $\square$

# Az összegtartás

Legyen  $T = \mathbb{C}, \mathbb{R}, \mathbb{Q}$  és  $M = ((a_{ij})) \in T^{n \times n}$  egy  $n \times n$ -es mátrix.

$$\text{Ekkor } \det(M) = \sum_{f \in S_n} \text{sg}(f) a_{1f(1)} a_{2f(2)} \cdots a_{nf(n)}.$$

## Összegetartás (F1.3.2. Tétel)

Az egyszerűbb jelölés kedvéért az első sort bontjuk összegre.

Azaz  $a_{1j}$  helyére  $b_{1j} + c_{1j}$  kerül. Ekkor

$$a_{1f(1)} a_{2f(2)} \cdots a_{nf(n)} = b_{1f(1)} a_{2f(2)} \cdots a_{nf(n)} + c_{1f(1)} a_{2f(2)} \cdots a_{nf(n)}.$$

Így az eredeti determináns is két determináns összegére bomlik, melyekben az első sorban  $b_{1j}$ , illetve  $c_{1j}$  szerepel. □

Ugyanez történik, ha bármelyik másik oszlopot vagy sort bontjuk összegre.



# Az összegtartás

Legyen  $T = \mathbb{C}, \mathbb{R}, \mathbb{Q}$  és  $M = ((a_{ij})) \in T^{n \times n}$  egy  $n \times n$ -es mátrix.

Ekkor  $\det(M) = \sum_{f \in S_n} \text{sg}(f) a_{1f(1)} a_{2f(2)} \cdots a_{nf(n)}$ .

## Összegetartás (F1.3.2. Tétel)

Az egyszerűbb jelölés kedvéért az első sort bontjuk összegre.

Azaz  $a_{1j}$  helyére  $b_{1j} + c_{1j}$  kerül. Ekkor

$$a_{1f(1)} a_{2f(2)} \cdots a_{nf(n)} = b_{1f(1)} a_{2f(2)} \cdots a_{nf(n)} + c_{1f(1)} a_{2f(2)} \cdots a_{nf(n)}$$

Így az eredeti determináns is két determináns összegére bomlik, melyekben az első sorban  $b_{1j}$ , illetve  $c_{1j}$  szerepel.  $\square$

Ugyanez történik, ha bármelyik másik oszlopot vagy sort bontjuk összegre.

HF:  $3 \times 3$ -asra részletezni ezt a bizonyítást.

## $3 \times 3$ -as felső háromszögmátrix

$$a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - \\ - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}.$$

### Felső háromszögmátrix

## $3 \times 3$ -as felső háromszögmátrix

$$a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - \\ - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}.$$

### Felső háromszögmátrix

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

felső háromszögmátrix,

## $3 \times 3$ -as felső háromszögmátrix

$$a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - \\ - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}.$$

### Felső háromszögmátrix

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

felső háromszögmátrix, ha  $a_{21} = a_{31} = a_{32} = 0$ .

## $3 \times 3$ -as felső háromszögmátrix

$$a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - \\ - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}.$$

### Felső háromszögmátrix

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

felső háromszögmátrix, ha  $a_{21} = a_{31} = a_{32} = 0$ .

Ezért a fenti összeg utolsó öt tagja nulla lesz. □

## $3 \times 3$ -as felső háromszögmátrix

$$a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - \\ - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}.$$

### Felső háromszögmátrix

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

felső háromszögmátrix, ha  $a_{21} = a_{31} = a_{32} = 0$ .

Ezért a fenti összeg utolsó öt tagja nulla lesz. □

### Elemzés

A főátló alatti elemek azok, ahol a sorindex nagyobb, mint az oszlopindex,

## $3 \times 3$ -as felső háromszögmátrix

$$a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - \\ - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}.$$

### Felső háromszögmátrix

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

felső háromszögmátrix, ha  $a_{21} = a_{31} = a_{32} = 0$ .

Ezért a fenti összeg utolsó öt tagja nulla lesz. □

### Elemzés

A főátló alatti elemek azok, ahol a sorindex nagyobb, mint az oszlopindex, azaz  $a_{ij}$ , ahol  $i > j$ .

## $3 \times 3$ -as felső háromszögmátrix

$$a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - \\ - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}.$$

### Felső háromszögmátrix

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

felső háromszögmátrix, ha  $a_{21} = a_{31} = a_{32} = 0$ .

Ezért a fenti összeg utolsó öt tagja nulla lesz. □

### Elemzés

A főátló alatti elemek azok, ahol a sorindex nagyobb, mint az oszlopindex, azaz  $a_{ij}$ , ahol  $i > j$ .

A megmaradó tag az **identikus permutációhoz** tartozik.



# Általános felső háromszögmátrix

Ha a nézőtér egy sorában 1-től 20-ig számozták a székeket,

# Általános felső háromszögmátrix

Ha a nézőtér egy sorában 1-től 20-ig számozták a székeket, akkor hányféleképpen ülhetnek le a nézők úgy,

# Általános felső háromszögmátrix

Ha a nézőtér egy sorában 1-től 20-ig számozták a székeket, akkor hányféleképpen ülhetnek le a nézők úgy, hogy mindenki legalább olyan számú széken üljön,

# Általános felső háromszögmátrix

Ha a nézőtér egy sorában 1-től 20-ig számozták a székeket, akkor hányféleképpen ülhetnek le a nézők úgy, hogy mindenki legalább olyan számú széken üljön, mint ahová a jegye szól?

# Általános felső háromszögmátrix

Ha a nézőtér egy sorában 1-től 20-ig számozták a székeket, akkor hányféleképpen ülhetnek le a nézők úgy, hogy mindenki legalább olyan számú széken üljön, mint ahová a jegye szól?

Csak egyféleképpen:

## Általános felső háromszögmátrix

Ha a nézőtér egy sorában 1-től 20-ig számozták a székeket, akkor hányféleképpen ülhetnek le a nézők úgy, hogy mindenki legalább olyan számú széken üljön, mint ahová a jegye szól?

Csak egyféleképpen: **ha mindenki a saját helyén ül.**

## Általános felső háromszögmátrix

Ha a nézőtér egy sorában 1-től 20-ig számozták a székeket, akkor hányféleképpen ülhetnek le a nézők úgy, hogy mindenki legalább olyan számú széken üljön, mint ahová a jegye szól?

Csak egyféleképpen: **ha mindenki a saját helyén ül.**

**Mert:** Akinek a 20. székre szól a jegye,

## Általános felső háromszögmátrix

Ha a nézőtér egy sorában 1-től 20-ig számozták a székeket, akkor hányféleképpen ülhetnek le a nézők úgy, hogy mindenki legalább olyan számú széken üljön, mint ahová a jegye szól?

Csak egyféleképpen: **ha mindenki a saját helyén ül.**

**Mert:** Akinek a 20. székre szól a jegye, az csak ott ülhet.



## Általános felső háromszögmátrix

Ha a nézőtér egy sorában 1-től 20-ig számozták a székeket, akkor hányféleképpen ülhetnek le a nézők úgy, hogy mindenki legalább olyan számú széken üljön, mint ahová a jegye szól?

Csak egyféleképpen: **ha mindenki a saját helyén ül.**

**Mert:** Akinek a 20. székre szól a jegye, az csak ott ülhet.

Akinek a 19.-re szól, az nem ülhet az 20.-on,

## Általános felső háromszögmátrix

Ha a nézőtér egy sorában 1-től 20-ig számozták a székeket, akkor hányféleképpen ülhetnek le a nézők úgy, hogy mindenki legalább olyan számú széken üljön, mint ahová a jegye szól?

Csak egyféleképpen: **ha mindenki a saját helyén ül.**

**Mert:** Akinek a 20. székre szól a jegye, az csak ott ülhet.

Akinek a 19.-re szól, az nem ülhet az 20.-on, mert az foglalt.

## Általános felső háromszögmátrix

Ha a nézőtér egy sorában 1-től 20-ig számozták a székeket, akkor hányféleképpen ülhetnek le a nézők úgy, hogy mindenki legalább olyan számú széken üljön, mint ahová a jegye szól?

Csak egyféleképpen: **ha mindenki a saját helyén ül.**

**Mert:** Akinek a 20. székre szól a jegye, az csak ott ülhet.

Akinek a 19.-re szól, az nem ülhet az 20.-on, mert az foglalt.

Ezért ő a 19. széken ül.

## Általános felső háromszögmátrix

Ha a nézőtér egy sorában 1-től 20-ig számozták a székeket, akkor hányféleképpen ülhetnek le a nézők úgy, hogy mindenki legalább olyan számú széken üljön, mint ahová a jegye szól?

Csak egyféleképpen: **ha mindenki a saját helyén ül.**

**Mert:** Akinek a 20. székre szól a jegye, az csak ott ülhet.

Akinek a 19.-re szól, az nem ülhet az 20.-on, mert az foglalt.

Ezért ő a 19. széken ül. És így tovább.

# Általános felső háromszögmátrix

Ha a nézőtér egy sorában 1-től 20-ig számozták a székeket, akkor hányféleképpen ülhetnek le a nézők úgy, hogy mindenki legalább olyan számú széken üljön, mint ahová a jegye szól?

Csak egyféleképpen: **ha mindenki a saját helyén ül.**

**Mert:** Akinek a 20. székre szól a jegye, az csak ott ülhet. Akinek a 19.-re szól, az nem ülhet az 20.-on, mert az foglalt. Ezért ő a 19. széken ül. És így tovább.

Felső háromszögmátrix determinánsa (F1.2.3. Feladat)

# Általános felső háromszögmátrix

Ha a nézőtér egy sorában 1-től 20-ig számozták a székeket, akkor hányféleképpen ülhetnek le a nézők úgy, hogy mindenki legalább olyan számú széken üljön, mint ahová a jegye szól?

Csak egyféleképpen: **ha mindenki a saját helyén ül.**

**Mert:** Akinek a 20. székre szól a jegye, az csak ott ülhet. Akinek a 19.-re szól, az nem ülhet az 20.-on, mert az foglalt. Ezért ő a 19. széken ül. És így tovább.

Felső háromszögmátrix determinánsa (F1.2.3. Feladat)

Tudjuk:  $a_{ij} = 0$ , ha  $i > j$ .

# Általános felső háromszögmátrix

Ha a nézőtér egy sorában 1-től 20-ig számozták a székeket, akkor hányféleképpen ülhetnek le a nézők úgy, hogy mindenki legalább olyan számú széken üljön, mint ahová a jegye szól?

Csak egyféleképpen: **ha mindenki a saját helyén ül.**

**Mert:** Akinek a 20. székre szól a jegye, az csak ott ülhet.

Akinek a 19.-re szól, az nem ülhet az 20.-on, mert az foglalt.

Ezért ő a 19. széken ül. És így tovább.

Felső háromszögmátrix determinánsa (F1.2.3. Feladat)

Tudjuk:  $a_{ij} = 0$ , ha  $i > j$ . Az  $a_{1f(1)}a_{2f(2)} \cdots a_{nf(n)}$  mikor nem 0?

# Általános felső háromszögmátrix

Ha a nézőtér egy sorában 1-től 20-ig számozták a székeket, akkor hányféleképpen ülhetnek le a nézők úgy, hogy mindenki legalább olyan számú széken üljön, mint ahová a jegye szól?

Csak egyféleképpen: **ha mindenki a saját helyén ül.**

**Mert:** Akinek a 20. székre szól a jegye, az csak ott ülhet. Akinek a 19.-re szól, az nem ülhet az 20.-on, mert az foglalt. Ezért ő a 19. széken ül. És így tovább.

## Felső háromszögmátrix determinánása (F1.2.3. Feladat)

Tudjuk:  $a_{ij} = 0$ , ha  $i > j$ . Az  $a_{1f(1)}a_{2f(2)} \cdots a_{nf(n)}$  mikor nem 0?  
Az kell:  $i \leq f(i)$  minden  $i$ -re.



# Általános felső háromszögmátrix

Ha a nézőtér egy sorában 1-től 20-ig számozták a székeket, akkor hányféleképpen ülhetnek le a nézők úgy, hogy mindenki legalább olyan számú széken üljön, mint ahová a jegye szól?

Csak egyféleképpen: **ha mindenki a saját helyén ül.**

**Mert:** Akinek a 20. székre szól a jegye, az csak ott ülhet. Akinek a 19.-re szól, az nem ülhet az 20.-on, mert az foglalt. Ezért ő a 19. széken ül. És így tovább.

## Felső háromszögmátrix determinánása (F1.2.3. Feladat)

Tudjuk:  $a_{ij} = 0$ , ha  $i > j$ . Az  $a_{1f(1)}a_{2f(2)} \cdots a_{nf(n)}$  mikor nem 0?  
Az kell:  $i \leq f(i)$  minden  $i$ -re. A fenti miatt  $f = id$ .

# Általános felső háromszögmátrix

Ha a nézőtér egy sorában 1-től 20-ig számozták a székeket, akkor hányféleképpen ülhetnek le a nézők úgy, hogy mindenki legalább olyan számú széken üljön, mint ahová a jegye szól?

Csak egyféleképpen: **ha mindenki a saját helyén ül.**

**Mert:** Akinek a 20. székre szól a jegye, az csak ott ülhet.

Akinek a 19.-re szól, az nem ülhet az 20.-on, mert az foglalt.

Ezért ő a 19. széken ül. És így tovább.

## Felső háromszögmátrix determinánása (F1.2.3. Feladat)

Tudjuk:  $a_{ij} = 0$ , ha  $i > j$ . Az  $a_{1f(1)}a_{2f(2)} \dots a_{nf(n)}$  mikor nem 0?

Az kell:  $i \leq f(i)$  minden  $i$ -re. A fenti miatt  $f = id$ .

Tehát a determináns  $sg(id)a_{11}a_{22} \dots a_{nn}$ .

## Általános felső háromszögmátrix

Ha a nézőtér egy sorában 1-től 20-ig számozták a székeket, akkor hányféleképpen ülhetnek le a nézők úgy, hogy mindenki legalább olyan számú széken üljön, mint ahová a jegye szól?

Csak egyféleképpen: **ha mindenki a saját helyén ül.**

**Mert:** Akinek a 20. székre szól a jegye, az csak ott ülhet. Akinek a 19.-re szól, az nem ülhet az 20.-on, mert az foglalt. Ezért ő a 19. széken ül. És így tovább.

### Felső háromszögmátrix determinánása (F1.2.3. Feladat)

Tudjuk:  $a_{ij} = 0$ , ha  $i > j$ . Az  $a_{1f(1)}a_{2f(2)} \cdots a_{nf(n)}$  mikor nem 0?

Az kell:  $i \leq f(i)$  minden  $i$ -re. A fenti miatt  $f = id$ .

Tehát a determináns  $sg(id)a_{11}a_{22} \cdots a_{nn}$ . Mivel  $sg(id) = 1$ ,

# Általános felső háromszögmátrix

Ha a nézőtér egy sorában 1-től 20-ig számozták a székeket, akkor hányféleképpen ülhetnek le a nézők úgy, hogy mindenki legalább olyan számú széken üljön, mint ahová a jegye szól?

Csak egyféleképpen: **ha mindenki a saját helyén ül.**

**Mert:** Akinek a 20. székre szól a jegye, az csak ott ülhet. Akinek a 19.-re szól, az nem ülhet az 20.-on, mert az foglalt. Ezért ő a 19. széken ül. És így tovább.

## Felső háromszögmátrix determinánása (F1.2.3. Feladat)

Tudjuk:  $a_{ij} = 0$ , ha  $i > j$ . Az  $a_{1f(1)}a_{2f(2)} \dots a_{nf(n)}$  mikor nem 0?

Az kell:  $i \leq f(i)$  minden  $i$ -re. A fenti miatt  $f = id$ .

Tehát a determináns  $sg(id)a_{11}a_{22} \dots a_{nn}$ . Mivel  $sg(id) = 1$ , ez tényleg a főátlóbeli elemek szorzata.

## $3 \times 3$ -as: két oszlop egyenlősége

$$a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - \\ - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}.$$

A második és a harmadik oszlop egyenlősége

## $3 \times 3$ -as: két oszlop egyenlősége

$$a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - \\ - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}.$$

A második és a harmadik oszlop egyenlősége

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

## $3 \times 3$ -as: két oszlop egyenlősége

$$a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - \\ - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}.$$

### A második és a harmadik oszlop egyenlősége

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

Ez azt jelenti, hogy  $a_{12} = a_{13}$ ,

## $3 \times 3$ -as: két oszlop egyenlősége

$$a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - \\ - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}.$$

### A második és a harmadik oszlop egyenlősége

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

Ez azt jelenti, hogy  $a_{12} = a_{13}$ ,  $a_{22} = a_{23}$ ,



## $3 \times 3$ -as: két oszlop egyenlősége

$$a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - \\ - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}.$$

### A második és a harmadik oszlop egyenlősége

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

Ez azt jelenti, hogy  $a_{12} = a_{13}$ ,  $a_{22} = a_{23}$ ,  $a_{32} = a_{33}$ .

## $3 \times 3$ -as: két oszlop egyenlősége

$$a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - \\ - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}.$$

### A második és a harmadik oszlop egyenlősége

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

Ez azt jelenti, hogy  $a_{12} = a_{13}$ ,  $a_{22} = a_{23}$ ,  $a_{32} = a_{33}$ .  
Általánosabban:  $a_{i2} = a_{i3}$  mindegyik  $i$ -re.

## $3 \times 3$ -as: két oszlop egyenlősége

$$a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - \\ - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}.$$

### A második és a harmadik oszlop egyenlősége

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

Ez azt jelenti, hogy  $a_{12} = a_{13}$ ,  $a_{22} = a_{23}$ ,  $a_{32} = a_{33}$ .

Általánosabban:  $a_{i2} = a_{i3}$  mindegyik  $i$ -re.

A fenti összeg tagjai kiejtik egymást, mert

## $3 \times 3$ -as: két oszlop egyenlősége

$$a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - \\ - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}.$$

### A második és a harmadik oszlop egyenlősége

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

Ez azt jelenti, hogy  $a_{12} = a_{13}$ ,  $a_{22} = a_{23}$ ,  $a_{32} = a_{33}$ .

Általánosabban:  $a_{i2} = a_{i3}$  mindegyik  $i$ -re.

A fenti összeg tagjai kiejtik egymást, mert

$$a_{11}a_{22}a_{33} = a_{11}a_{23}a_{32},$$

## $3 \times 3$ -as: két oszlop egyenlősége

$$a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - \\ - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}.$$

### A második és a harmadik oszlop egyenlősége

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

Ez azt jelenti, hogy  $a_{12} = a_{13}$ ,  $a_{22} = a_{23}$ ,  $a_{32} = a_{33}$ .

Általánosabban:  $a_{i2} = a_{i3}$  mindegyik  $i$ -re.

A fenti összeg tagjai kiejtik egymást, mert

$$a_{11}a_{22}a_{33} = a_{11}a_{23}a_{32},$$

$$a_{12}a_{23}a_{31} = a_{13}a_{22}a_{31},$$

## $3 \times 3$ -as: két oszlop egyenlősége

$$a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - \\ - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}.$$

### A második és a harmadik oszlop egyenlősége

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

Ez azt jelenti, hogy  $a_{12} = a_{13}$ ,  $a_{22} = a_{23}$ ,  $a_{32} = a_{33}$ .

Általánosabban:  $a_{i2} = a_{i3}$  mindegyik  $i$ -re.

A fenti összeg tagjai kiejtik egymást, mert

$$a_{11}a_{22}a_{33} = a_{11}a_{23}a_{32},$$

$$a_{12}a_{23}a_{31} = a_{13}a_{22}a_{31},$$

$$a_{13}a_{21}a_{32} = a_{12}a_{21}a_{33}.$$

## $3 \times 3$ -as: két oszlop egyenlősége

$$a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - \\ - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}.$$

### A második és a harmadik oszlop egyenlősége

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

Ez azt jelenti, hogy  $a_{12} = a_{13}$ ,  $a_{22} = a_{23}$ ,  $a_{32} = a_{33}$ .

Általánosabban:  $a_{i2} = a_{i3}$  mindegyik  $i$ -re.

A fenti összeg tagjai kiejtik egymást, mert

$$a_{11}a_{22}a_{33} = a_{11}a_{23}a_{32},$$

$$a_{12}a_{23}a_{31} = a_{13}a_{22}a_{31},$$

$$a_{13}a_{21}a_{32} = a_{12}a_{21}a_{33}.$$

Az előjelezés arra való, hogy általában is minden így kiessen.

## Két sor egyenlősége (F1.3.3. Tétel)

$$\det(M) = \sum_{f \in S_n} \text{sg}(f) a_{1f(1)} a_{2f(2)} \cdots a_{nf(n)}.$$



## Két sor egyenlősége (F1.3.3. Tétel)

$$\det(M) = \sum_{f \in S_n} \text{sg}(f) a_{1f(1)} a_{2f(2)} \cdots a_{nf(n)}.$$

Az egyszerűbb jelölés végett azt tesszük föl, hogy az  $i$ -edik és a  $j$ -edik **sor** egyenlő.

## Két sor egyenlősége (F1.3.3. Tétel)

$$\det(M) = \sum_{f \in S_n} \text{sg}(f) a_{1f(1)} a_{2f(2)} \cdots a_{nf(n)}.$$

Az egyszerűbb jelölés végett azt tesszük föl, hogy az  $i$ -edik és a  $j$ -edik sor egyenlő. Tehát  $a_{ik} = a_{jk}$  minden  $1 \leq k \leq n$  esetén.

## Két sor egyenlősége (F1.3.3. Tétel)

$$\det(M) = \sum_{f \in S_n} \text{sg}(f) a_{1f(1)} a_{2f(2)} \cdots a_{nf(n)}.$$

Az egyszerűbb jelölés végett azt tesszük föl, hogy az  $i$ -edik és a  $j$ -edik sor egyenlő. Tehát  $a_{ik} = a_{jk}$  minden  $1 \leq k \leq n$  esetén.

$$a_{1f(1)} \cdots a_{if(i)} \cdots a_{jf(j)} \cdots a_{nf(n)} = a_{1f(1)} \cdots a_{jf(i)} \cdots a_{if(j)} \cdots a_{nf(n)},$$

## Két sor egyenlősége (F1.3.3. Tétel)

$$\det(M) = \sum_{f \in S_n} \text{sg}(f) a_{1f(1)} a_{2f(2)} \cdots a_{nf(n)}.$$

Az egyszerűbb jelölés végett azt tesszük föl, hogy az  $i$ -edik és a  $j$ -edik sor egyenlő. Tehát  $a_{ik} = a_{jk}$  minden  $1 \leq k \leq n$  esetén.

$a_{1f(1)} \cdots a_{if(i)} \cdots a_{jf(j)} \cdots a_{nf(n)} = a_{1f(1)} \cdots a_{jf(i)} \cdots a_{if(j)} \cdots a_{nf(n)}$ ,  
mert  $a_{if(i)} = a_{jf(i)}$  és  $a_{jf(j)} = a_{if(j)}$ .

## Két sor egyenlősége (F1.3.3. Tétel)

$$\det(M) = \sum_{f \in S_n} \text{sg}(f) a_{1f(1)} a_{2f(2)} \cdots a_{nf(n)}.$$

Az egyszerűbb jelölés végett azt tesszük föl, hogy az  $i$ -edik és a  $j$ -edik sor egyenlő. Tehát  $a_{ik} = a_{jk}$  minden  $1 \leq k \leq n$  esetén.

$a_{1f(1)} \cdots a_{if(i)} \cdots a_{jf(j)} \cdots a_{nf(n)} = a_{1f(1)} \cdots a_{jf(i)} \cdots a_{if(j)} \cdots a_{nf(n)}$ ,  
mert  $a_{if(i)} = a_{jf(i)}$  és  $a_{jf(j)} = a_{if(j)}$ .

$$a_{1f(1)} \cdots a_{jf(i)} \cdots a_{if(j)} \cdots a_{nf(n)} = a_{1f(1)} \cdots a_{if(j)} \cdots a_{jf(i)} \cdots a_{nf(n)}$$

## Két sor egyenlősége (F1.3.3. Tétel)

$$\det(M) = \sum_{f \in S_n} \text{sg}(f) a_{1f(1)} a_{2f(2)} \cdots a_{nf(n)}.$$

Az egyszerűbb jelölés végett azt tesszük föl, hogy az  $i$ -edik és a  $j$ -edik **sor** egyenlő. Tehát  $a_{ik} = a_{jk}$  minden  $1 \leq k \leq n$  esetén.

$a_{1f(1)} \cdots a_{if(i)} \cdots a_{jf(j)} \cdots a_{nf(n)} = a_{1f(1)} \cdots a_{jf(i)} \cdots a_{if(j)} \cdots a_{nf(n)}$ ,  
mert  $a_{if(i)} = a_{jf(i)}$  és  $a_{jf(j)} = a_{if(j)}$ .

$a_{1f(1)} \cdots a_{jf(i)} \cdots a_{if(j)} \cdots a_{nf(n)} = a_{1f(1)} \cdots a_{if(j)} \cdots a_{jf(i)} \cdots a_{nf(n)}$   
(megcseréltük a szorzat  $i$ -edik és  $j$ -edik tényezőjét).

## Két sor egyenlősége (F1.3.3. Tétel)

$$\det(M) = \sum_{f \in S_n} \text{sg}(f) a_{1f(1)} a_{2f(2)} \cdots a_{nf(n)}.$$

Az egyszerűbb jelölés végett azt tesszük föl, hogy az  $i$ -edik és a  $j$ -edik **sor** egyenlő. Tehát  $a_{ik} = a_{jk}$  minden  $1 \leq k \leq n$  esetén.

$a_{1f(1)} \cdots a_{if(i)} \cdots a_{jf(j)} \cdots a_{nf(n)} = a_{1f(1)} \cdots a_{jf(i)} \cdots a_{if(j)} \cdots a_{nf(n)}$ ,  
mert  $a_{if(i)} = a_{jf(i)}$  és  $a_{jf(j)} = a_{if(j)}$ .

$a_{1f(1)} \cdots a_{jf(i)} \cdots a_{if(j)} \cdots a_{nf(n)} = a_{1f(1)} \cdots a_{if(j)} \cdots a_{jf(i)} \cdots a_{nf(n)}$   
(megcseréltük a szorzat  $i$ -edik és  $j$ -edik tényezőjét).

Az első indexek sorban vannak,

## Két sor egyenlősége (F1.3.3. Tétel)

$$\det(M) = \sum_{f \in S_n} \text{sg}(f) a_{1f(1)} a_{2f(2)} \cdots a_{nf(n)}.$$

Az egyszerűbb jelölés végett azt tesszük föl, hogy az  $i$ -edik és a  $j$ -edik **sor** egyenlő. Tehát  $a_{ik} = a_{jk}$  minden  $1 \leq k \leq n$  esetén.

$a_{1f(1)} \cdots a_{if(i)} \cdots a_{jf(j)} \cdots a_{nf(n)} = a_{1f(1)} \cdots a_{jf(i)} \cdots a_{if(j)} \cdots a_{nf(n)}$ ,  
mert  $a_{if(i)} = a_{jf(i)}$  és  $a_{jf(j)} = a_{if(j)}$ .

$a_{1f(1)} \cdots a_{jf(i)} \cdots a_{if(j)} \cdots a_{nf(n)} = a_{1f(1)} \cdots a_{if(j)} \cdots a_{jf(i)} \cdots a_{nf(n)}$   
(megcseréltük a szorzat  $i$ -edik és  $j$ -edik tényezőjét).

Az első indexek sorban vannak, a másodikok permutációja  $g$ .



## Két sor egyenlősége (F1.3.3. Tétel)

$$\det(M) = \sum_{f \in S_n} \text{sg}(f) a_{1f(1)} a_{2f(2)} \cdots a_{nf(n)}.$$

Az egyszerűbb jelölés végett azt tesszük föl, hogy az  $i$ -edik és a  $j$ -edik sor egyenlő. Tehát  $a_{ik} = a_{jk}$  minden  $1 \leq k \leq n$  esetén.

$a_{1f(1)} \cdots a_{if(i)} \cdots a_{jf(j)} \cdots a_{nf(n)} = a_{1f(1)} \cdots a_{jf(i)} \cdots a_{if(j)} \cdots a_{nf(n)}$ ,  
mert  $a_{if(i)} = a_{jf(i)}$  és  $a_{jf(j)} = a_{if(j)}$ .

$a_{1f(1)} \cdots a_{jf(i)} \cdots a_{if(j)} \cdots a_{nf(n)} = a_{1f(1)} \cdots a_{if(j)} \cdots a_{jf(i)} \cdots a_{nf(n)}$   
(megcseréltük a szorzat  $i$ -edik és  $j$ -edik tényezőjét).

Az első indexek sorban vannak, a másodikok permutációja  $g$ .

Ekkor  $g(i) = f(j)$ ,

## Két sor egyenlősége (F1.3.3. Tétel)

$$\det(M) = \sum_{f \in S_n} \text{sg}(f) a_{1f(1)} a_{2f(2)} \cdots a_{nf(n)}.$$

Az egyszerűbb jelölés végett azt tesszük föl, hogy az  $i$ -edik és a  $j$ -edik **sor** egyenlő. Tehát  $a_{ik} = a_{jk}$  minden  $1 \leq k \leq n$  esetén.

$a_{1f(1)} \cdots a_{if(i)} \cdots a_{jf(j)} \cdots a_{nf(n)} = a_{1f(1)} \cdots a_{jf(i)} \cdots a_{if(j)} \cdots a_{nf(n)}$ ,  
mert  $a_{if(i)} = a_{jf(i)}$  és  $a_{jf(j)} = a_{if(j)}$ .

$a_{1f(1)} \cdots a_{jf(i)} \cdots a_{if(j)} \cdots a_{nf(n)} = a_{1f(1)} \cdots a_{if(j)} \cdots a_{jf(i)} \cdots a_{nf(n)}$   
(megcseréltük a szorzat  $i$ -edik és  $j$ -edik tényezőjét).

Az első indexek sorban vannak, a másodikok permutációja  $g$ .

Ekkor  $g(i) = f(j)$ ,  $g(j) = f(i)$

## Két sor egyenlősége (F1.3.3. Tétel)

$$\det(M) = \sum_{f \in S_n} \text{sg}(f) a_{1f(1)} a_{2f(2)} \cdots a_{nf(n)}.$$

Az egyszerűbb jelölés végett azt tesszük föl, hogy az  $i$ -edik és a  $j$ -edik **sor** egyenlő. Tehát  $a_{ik} = a_{jk}$  minden  $1 \leq k \leq n$  esetén.

$a_{1f(1)} \cdots a_{if(i)} \cdots a_{jf(j)} \cdots a_{nf(n)} = a_{1f(1)} \cdots a_{jf(i)} \cdots a_{if(j)} \cdots a_{nf(n)}$ ,  
mert  $a_{if(i)} = a_{jf(i)}$  és  $a_{jf(j)} = a_{if(j)}$ .

$a_{1f(1)} \cdots a_{jf(i)} \cdots a_{if(j)} \cdots a_{nf(n)} = a_{1f(1)} \cdots a_{if(j)} \cdots a_{jf(i)} \cdots a_{nf(n)}$   
(megcseréltük a szorzat  $i$ -edik és  $j$ -edik tényezőjét).

Az első indexek sorban vannak, a másodikok permutációja  $g$ .

Ekkor  $g(i) = f(j)$ ,  $g(j) = f(i)$  és  $g(l) = f(l)$ , ha  $l \neq i, j$ .

## Két sor egyenlősége (F1.3.3. Tétel)

$$\det(M) = \sum_{f \in S_n} \operatorname{sg}(f) a_{1f(1)} a_{2f(2)} \cdots a_{nf(n)}.$$

Az egyszerűbb jelölés végett azt tesszük föl, hogy az  $i$ -edik és a  $j$ -edik **sor** egyenlő. Tehát  $a_{ik} = a_{jk}$  minden  $1 \leq k \leq n$  esetén.

$a_{1f(1)} \cdots a_{if(i)} \cdots a_{jf(j)} \cdots a_{nf(n)} = a_{1f(1)} \cdots a_{jf(i)} \cdots a_{if(j)} \cdots a_{nf(n)}$ ,  
mert  $a_{if(i)} = a_{jf(i)}$  és  $a_{jf(j)} = a_{if(j)}$ .

$a_{1f(1)} \cdots a_{jf(i)} \cdots a_{if(j)} \cdots a_{nf(n)} = a_{1f(1)} \cdots a_{if(j)} \cdots a_{jf(i)} \cdots a_{nf(n)}$   
(megcseréltük a szorzat  $i$ -edik és  $j$ -edik tényezőjét).

Az első indexek sorban vannak, a másodikok permutációja  $g$ .

Ekkor  $g(i) = f(j)$ ,  $g(j) = f(i)$  és  $g(l) = f(l)$ , ha  $l \neq i, j$ .

Ezért  $g = f \circ (i, j)$ .

## Két sor egyenlősége (F1.3.3. Tétel)

$$\det(M) = \sum_{f \in S_n} \operatorname{sg}(f) a_{1f(1)} a_{2f(2)} \cdots a_{nf(n)}.$$

Az egyszerűbb jelölés végett azt tesszük föl, hogy az  $i$ -edik és a  $j$ -edik **sor** egyenlő. Tehát  $a_{ik} = a_{jk}$  minden  $1 \leq k \leq n$  esetén.

$a_{1f(1)} \cdots a_{if(i)} \cdots a_{jf(j)} \cdots a_{nf(n)} = a_{1f(1)} \cdots a_{jf(i)} \cdots a_{if(j)} \cdots a_{nf(n)}$ ,  
mert  $a_{if(i)} = a_{jf(i)}$  és  $a_{jf(j)} = a_{if(j)}$ .

$a_{1f(1)} \cdots a_{jf(i)} \cdots a_{if(j)} \cdots a_{nf(n)} = a_{1f(1)} \cdots a_{if(j)} \cdots a_{jf(i)} \cdots a_{nf(n)}$   
(megcseréltük a szorzat  $i$ -edik és  $j$ -edik tényezőjét).

Az első indexek sorban vannak, a másodikok permutációja  $g$ .

Ekkor  $g(i) = f(j)$ ,  $g(j) = f(i)$  és  $g(l) = f(l)$ , ha  $l \neq i, j$ .

Ezért  $g = f \circ (i, j)$ . Azaz  $\operatorname{sg}(g) =$

## Két sor egyenlősége (F1.3.3. Tétel)

$$\det(M) = \sum_{f \in S_n} \text{sg}(f) a_{1f(1)} a_{2f(2)} \cdots a_{nf(n)}.$$

Az egyszerűbb jelölés végett azt tesszük föl, hogy az  $i$ -edik és a  $j$ -edik **sor** egyenlő. Tehát  $a_{ik} = a_{jk}$  minden  $1 \leq k \leq n$  esetén.

$a_{1f(1)} \cdots a_{if(i)} \cdots a_{jf(j)} \cdots a_{nf(n)} = a_{1f(1)} \cdots a_{jf(i)} \cdots a_{if(j)} \cdots a_{nf(n)}$ ,  
mert  $a_{if(i)} = a_{jf(i)}$  és  $a_{jf(j)} = a_{if(j)}$ .

$a_{1f(1)} \cdots a_{jf(i)} \cdots a_{if(j)} \cdots a_{nf(n)} = a_{1f(1)} \cdots a_{if(j)} \cdots a_{jf(i)} \cdots a_{nf(n)}$   
(megcseréltük a szorzat  $i$ -edik és  $j$ -edik tényezőjét).

Az első indexek sorban vannak, a másodikok permutációja  $g$ .

Ekkor  $g(i) = f(j)$ ,  $g(j) = f(i)$  és  $g(l) = f(l)$ , ha  $l \neq i, j$ .

Ezért  $g = f \circ (i, j)$ . Azaz  $\text{sg}(g) = \text{sg}(f) \text{sg}((i, j)) =$

## Két sor egyenlősége (F1.3.3. Tétel)

$$\det(M) = \sum_{f \in S_n} \text{sg}(f) a_{1f(1)} a_{2f(2)} \cdots a_{nf(n)}.$$

Az egyszerűbb jelölés végett azt tesszük föl, hogy az  $i$ -edik és a  $j$ -edik **sor** egyenlő. Tehát  $a_{ik} = a_{jk}$  minden  $1 \leq k \leq n$  esetén.

$a_{1f(1)} \cdots a_{if(i)} \cdots a_{jf(j)} \cdots a_{nf(n)} = a_{1f(1)} \cdots a_{jf(i)} \cdots a_{if(j)} \cdots a_{nf(n)}$ ,  
mert  $a_{if(i)} = a_{jf(i)}$  és  $a_{jf(j)} = a_{if(j)}$ .

$a_{1f(1)} \cdots a_{jf(i)} \cdots a_{if(j)} \cdots a_{nf(n)} = a_{1f(1)} \cdots a_{if(j)} \cdots a_{jf(i)} \cdots a_{nf(n)}$   
(megcseréltük a szorzat  $i$ -edik és  $j$ -edik tényezőjét).

Az első indexek sorban vannak, a másodikok permutációja  $g$ .

Ekkor  $g(i) = f(j)$ ,  $g(j) = f(i)$  és  $g(l) = f(l)$ , ha  $l \neq i, j$ .

Ezért  $g = f \circ (i, j)$ . Azaz  $\text{sg}(g) = \text{sg}(f) \text{sg}((i, j)) = -\text{sg}(f)$ .

## Két sor egyenlősége (F1.3.3. Tétel)

$$\det(M) = \sum_{f \in S_n} \text{sg}(f) a_{1f(1)} a_{2f(2)} \cdots a_{nf(n)}.$$

Az egyszerűbb jelölés végett azt tesszük föl, hogy az  $i$ -edik és a  $j$ -edik **sor** egyenlő. Tehát  $a_{ik} = a_{jk}$  minden  $1 \leq k \leq n$  esetén.

$a_{1f(1)} \cdots a_{if(i)} \cdots a_{jf(j)} \cdots a_{nf(n)} = a_{1f(1)} \cdots a_{jf(i)} \cdots a_{if(j)} \cdots a_{nf(n)}$ ,  
mert  $a_{if(i)} = a_{jf(i)}$  és  $a_{jf(j)} = a_{if(j)}$ .

$a_{1f(1)} \cdots a_{jf(i)} \cdots a_{if(j)} \cdots a_{nf(n)} = a_{1f(1)} \cdots a_{if(j)} \cdots a_{jf(i)} \cdots a_{nf(n)}$   
(megcseréltük a szorzat  $i$ -edik és  $j$ -edik tényezőjét).

Az első indexek sorban vannak, a másodikok permutációja  $g$ .

Ekkor  $g(i) = f(j)$ ,  $g(j) = f(i)$  és  $g(l) = f(l)$ , ha  $l \neq i, j$ .

Ezért  $g = f \circ (i, j)$ . Azaz  $\text{sg}(g) = \text{sg}(f) \text{sg}((i, j)) = -\text{sg}(f)$ .

Tehát a **sárga** és **kék** tagok kiejtik egymást.



## Két sor egyenlősége (F1.3.3. Tétel)

$$\det(M) = \sum_{f \in S_n} \text{sg}(f) a_{1f(1)} a_{2f(2)} \cdots a_{nf(n)}.$$

Az egyszerűbb jelölés végett azt tesszük föl, hogy az  $i$ -edik és a  $j$ -edik sor egyenlő. Tehát  $a_{ik} = a_{jk}$  minden  $1 \leq k \leq n$  esetén.

$a_{1f(1)} \cdots a_{if(i)} \cdots a_{jf(j)} \cdots a_{nf(n)} = a_{1f(1)} \cdots a_{jf(i)} \cdots a_{if(j)} \cdots a_{nf(n)}$ ,  
mert  $a_{if(i)} = a_{jf(i)}$  és  $a_{jf(j)} = a_{if(j)}$ .

$a_{1f(1)} \cdots a_{jf(i)} \cdots a_{if(j)} \cdots a_{nf(n)} = a_{1f(1)} \cdots a_{if(j)} \cdots a_{jf(i)} \cdots a_{nf(n)}$   
(megcseréltük a szorzat  $i$ -edik és  $j$ -edik tényezőjét).

Az első indexek sorban vannak, a másodikok permutációja  $g$ .

Ekkor  $g(i) = f(j)$ ,  $g(j) = f(i)$  és  $g(l) = f(l)$ , ha  $l \neq i, j$ .

Ezért  $g = f \circ (i, j)$ . Azaz  $\text{sg}(g) = \text{sg}(f) \text{sg}((i, j)) = -\text{sg}(f)$ .

Tehát a sárga és kék tagok kiejtik egymást.

Láttuk: ez a megfeleltetés párokba állítja a tagokat,

## Két sor egyenlősége (F1.3.3. Tétel)

$$\det(M) = \sum_{f \in S_n} \text{sg}(f) a_{1f(1)} a_{2f(2)} \cdots a_{nf(n)}.$$

Az egyszerűbb jelölés végett azt tesszük föl, hogy az  $i$ -edik és a  $j$ -edik **sor** egyenlő. Tehát  $a_{ik} = a_{jk}$  minden  $1 \leq k \leq n$  esetén.

$a_{1f(1)} \cdots a_{if(i)} \cdots a_{jf(j)} \cdots a_{nf(n)} = a_{1f(1)} \cdots a_{jf(i)} \cdots a_{if(j)} \cdots a_{nf(n)}$ ,  
mert  $a_{if(i)} = a_{jf(i)}$  és  $a_{jf(j)} = a_{if(j)}$ .

$a_{1f(1)} \cdots a_{jf(i)} \cdots a_{if(j)} \cdots a_{nf(n)} = a_{1f(1)} \cdots a_{if(j)} \cdots a_{jf(i)} \cdots a_{nf(n)}$   
(megcseréltük a szorzat  $i$ -edik és  $j$ -edik tényezőjét).

Az első indexek sorban vannak, a másodikok permutációja  $g$ .

Ekkor  $g(i) = f(j)$ ,  $g(j) = f(i)$  és  $g(l) = f(l)$ , ha  $l \neq i, j$ .

Ezért  $g = f \circ (i, j)$ . Azaz  $\text{sg}(g) = \text{sg}(f) \text{sg}((i, j)) = -\text{sg}(f)$ .

Tehát a **sárga** és **kék** tagok kiejtik egymást.

Láttuk: ez a megfeleltetés párokba állítja a tagokat,

mert  $(f \circ (i, j)) \circ (i, j) = f$ .

## Két sor egyenlősége (F1.3.3. Tétel)

$$\det(M) = \sum_{f \in S_n} \text{sg}(f) a_{1f(1)} a_{2f(2)} \cdots a_{nf(n)}.$$

Az egyszerűbb jelölés végett azt tesszük föl, hogy az  $i$ -edik és a  $j$ -edik sor egyenlő. Tehát  $a_{ik} = a_{jk}$  minden  $1 \leq k \leq n$  esetén.

$a_{1f(1)} \cdots a_{if(i)} \cdots a_{jf(j)} \cdots a_{nf(n)} = a_{1f(1)} \cdots a_{jf(i)} \cdots a_{if(j)} \cdots a_{nf(n)}$ ,  
mert  $a_{if(i)} = a_{jf(i)}$  és  $a_{jf(j)} = a_{if(j)}$ .

$a_{1f(1)} \cdots a_{jf(i)} \cdots a_{if(j)} \cdots a_{nf(n)} = a_{1f(1)} \cdots a_{if(j)} \cdots a_{jf(i)} \cdots a_{nf(n)}$   
(megcseréltük a szorzat  $i$ -edik és  $j$ -edik tényezőjét).

Az első indexek sorban vannak, a másodikok permutációja  $g$ .

Ekkor  $g(i) = f(j)$ ,  $g(j) = f(i)$  és  $g(l) = f(l)$ , ha  $l \neq i, j$ .

Ezért  $g = f \circ (i, j)$ . Azaz  $\text{sg}(g) = \text{sg}(f) \text{sg}((i, j)) = -\text{sg}(f)$ .

Tehát a sárga és kék tagok kiejtik egymást.

Láttuk: ez a megfeleltetés párokba állítja a tagokat,  
mert  $(f \circ (i, j)) \circ (i, j) = f$ . Tehát minden tag kiesik. □

## $3 \times 3$ -as: a transzponált determinánása

$$M = ((a_{ij})) \implies a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - \\ - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}.$$

$$M^T = ((b_{ij})) \implies b_{11}b_{22}b_{33} + b_{12}b_{23}b_{31} + b_{13}b_{21}b_{32} - \\ - b_{13}b_{22}b_{31} - b_{11}b_{23}b_{32} - b_{12}b_{21}b_{33}.$$

## $3 \times 3$ -as: a transzponált determinánása

$$M = ((a_{ij})) \implies a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - \\ - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}.$$

$$M^T = ((b_{ij})) \implies b_{11}b_{22}b_{33} + b_{12}b_{23}b_{31} + b_{13}b_{21}b_{32} - \\ - b_{13}b_{22}b_{31} - b_{11}b_{23}b_{32} - b_{12}b_{21}b_{33}.$$

Transzponálásnál az indexeket meg kell cserélni:

## $3 \times 3$ -as: a transzponált determinánása

$$M = ((a_{ij})) \implies a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - \\ - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}.$$

$$M^T = ((b_{ij})) \implies b_{11}b_{22}b_{33} + b_{12}b_{23}b_{31} + b_{13}b_{21}b_{32} - \\ - b_{13}b_{22}b_{31} - b_{11}b_{23}b_{32} - b_{12}b_{21}b_{33}.$$

Transzponálásnál az indexeket meg kell cserélni:  $b_{ij} = a_{ji}$ .

## $3 \times 3$ -as: a transzponált determinánása

$$M = ((a_{ij})) \implies a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - \\ - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}.$$

$$M^T = ((b_{ij})) \implies b_{11}b_{22}b_{33} + b_{12}b_{23}b_{31} + b_{13}b_{21}b_{32} - \\ - b_{13}b_{22}b_{31} - b_{11}b_{23}b_{32} - b_{12}b_{21}b_{33}.$$

Transzponálásnál az indexeket meg kell cserélni:  $b_{ij} = a_{ji}$ .

$$b_{11}b_{22}b_{33} =$$

## $3 \times 3$ -as: a transzponált determinánása

$$M = ((a_{ij})) \implies a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - \\ - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}.$$

$$M^T = ((b_{ij})) \implies b_{11}b_{22}b_{33} + b_{12}b_{23}b_{31} + b_{13}b_{21}b_{32} - \\ - b_{13}b_{22}b_{31} - b_{11}b_{23}b_{32} - b_{12}b_{21}b_{33}.$$

Transzponálásnál az indexeket meg kell cserélni:  $b_{ij} = a_{ji}$ .

$$b_{11}b_{22}b_{33} = a_{11}a_{22}a_{33}.$$



## $3 \times 3$ -as: a transzponált determinánása

$$M = ((a_{ij})) \implies a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - \\ - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}.$$

$$M^T = ((b_{ij})) \implies b_{11}b_{22}b_{33} + b_{12}b_{23}b_{31} + b_{13}b_{21}b_{32} - \\ - b_{13}b_{22}b_{31} - b_{11}b_{23}b_{32} - b_{12}b_{21}b_{33}.$$

Transzponálásnál az indexeket meg kell cserélni:  $b_{ij} = a_{ji}$ .

$$b_{11}b_{22}b_{33} = a_{11}a_{22}a_{33}.$$

$$b_{12}b_{23}b_{31} =$$

## $3 \times 3$ -as: a transzponált determinánása

$$M = ((a_{ij})) \implies a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - \\ - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}.$$

$$M^T = ((b_{ij})) \implies b_{11}b_{22}b_{33} + b_{12}b_{23}b_{31} + b_{13}b_{21}b_{32} - \\ - b_{13}b_{22}b_{31} - b_{11}b_{23}b_{32} - b_{12}b_{21}b_{33}.$$

Transzponálásnál az indexeket meg kell cserélni:  $b_{ij} = a_{ji}$ .

$$b_{11}b_{22}b_{33} = a_{11}a_{22}a_{33}.$$

$$b_{12}b_{23}b_{31} = a_{21}a_{32}a_{13} =$$

## $3 \times 3$ -as: a transzponált determinánása

$$M = ((a_{ij})) \implies a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - \\ - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}.$$

$$M^T = ((b_{ij})) \implies b_{11}b_{22}b_{33} + b_{12}b_{23}b_{31} + b_{13}b_{21}b_{32} - \\ - b_{13}b_{22}b_{31} - b_{11}b_{23}b_{32} - b_{12}b_{21}b_{33}.$$

Transzponálásnál az indexeket meg kell cserélni:  $b_{ij} = a_{ji}$ .

$$b_{11}b_{22}b_{33} = a_{11}a_{22}a_{33}.$$

$$b_{12}b_{23}b_{31} = a_{21}a_{32}a_{13} = a_{13}a_{21}a_{32}.$$

## $3 \times 3$ -as: a transzponált determinánása

$$M = ((a_{ij})) \implies a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - \\ - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}.$$

$$M^T = ((b_{ij})) \implies b_{11}b_{22}b_{33} + b_{12}b_{23}b_{31} + b_{13}b_{21}b_{32} - \\ - b_{13}b_{22}b_{31} - b_{11}b_{23}b_{32} - b_{12}b_{21}b_{33}.$$

Transzponálásnál az indexeket meg kell cserélni:  $b_{ij} = a_{ji}$ .

$$b_{11}b_{22}b_{33} = a_{11}a_{22}a_{33}.$$

$$b_{12}b_{23}b_{31} = a_{21}a_{32}a_{13} = a_{13}a_{21}a_{32}. \text{ Előjel: } +1.$$

## $3 \times 3$ -as: a transzponált determinánása

$$M = ((a_{ij})) \implies a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - \\ - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}.$$

$$M^T = ((b_{ij})) \implies b_{11}b_{22}b_{33} + b_{12}b_{23}b_{31} + b_{13}b_{21}b_{32} - \\ - b_{13}b_{22}b_{31} - b_{11}b_{23}b_{32} - b_{12}b_{21}b_{33}.$$

Transzponálásnál az indexeket meg kell cserélni:  $b_{ij} = a_{ji}$ .

$$b_{11}b_{22}b_{33} = a_{11}a_{22}a_{33}.$$

$$b_{12}b_{23}b_{31} = a_{21}a_{32}a_{13} = a_{13}a_{21}a_{32}. \text{ Előjel: } +1.$$

$$b_{13}b_{21}b_{32} =$$

## $3 \times 3$ -as: a transzponált determinánása

$$M = ((a_{ij})) \implies a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - \\ - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}.$$

$$M^T = ((b_{ij})) \implies b_{11}b_{22}b_{33} + b_{12}b_{23}b_{31} + b_{13}b_{21}b_{32} - \\ - b_{13}b_{22}b_{31} - b_{11}b_{23}b_{32} - b_{12}b_{21}b_{33}.$$

Transzponálásnál az indexeket meg kell cserélni:  $b_{ij} = a_{ji}$ .

$$b_{11}b_{22}b_{33} = a_{11}a_{22}a_{33}.$$

$$b_{12}b_{23}b_{31} = a_{21}a_{32}a_{13} = a_{13}a_{21}a_{32}. \text{ Előjel: } +1.$$

$$b_{13}b_{21}b_{32} = a_{31}a_{12}a_{23} =$$

## $3 \times 3$ -as: a transzponált determinánása

$$M = ((a_{ij})) \implies a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - \\ - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}.$$

$$M^T = ((b_{ij})) \implies b_{11}b_{22}b_{33} + b_{12}b_{23}b_{31} + b_{13}b_{21}b_{32} - \\ - b_{13}b_{22}b_{31} - b_{11}b_{23}b_{32} - b_{12}b_{21}b_{33}.$$

Transzponálásnál az indexeket meg kell cserélni:  $b_{ij} = a_{ji}$ .

$$b_{11}b_{22}b_{33} = a_{11}a_{22}a_{33}.$$

$$b_{12}b_{23}b_{31} = a_{21}a_{32}a_{13} = a_{13}a_{21}a_{32}. \text{ Előjel: } +1.$$

$$b_{13}b_{21}b_{32} = a_{31}a_{12}a_{23} = a_{12}a_{23}a_{31}.$$

## $3 \times 3$ -as: a transzponált determinánása

$$M = ((a_{ij})) \implies a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - \\ - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}.$$

$$M^T = ((b_{ij})) \implies b_{11}b_{22}b_{33} + b_{12}b_{23}b_{31} + b_{13}b_{21}b_{32} - \\ - b_{13}b_{22}b_{31} - b_{11}b_{23}b_{32} - b_{12}b_{21}b_{33}.$$

Transzponálásnál az indexeket meg kell cserélni:  $b_{ij} = a_{ji}$ .

$$b_{11}b_{22}b_{33} = a_{11}a_{22}a_{33}.$$

$$b_{12}b_{23}b_{31} = a_{21}a_{32}a_{13} = a_{13}a_{21}a_{32}. \text{ Előjel: } +1.$$

$$b_{13}b_{21}b_{32} = a_{31}a_{12}a_{23} = a_{12}a_{23}a_{31}. \text{ Előjel: } +1.$$



## $3 \times 3$ -as: a transzponált determinánása

$$M = ((a_{ij})) \implies a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - \\ - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}.$$

$$M^T = ((b_{ij})) \implies b_{11}b_{22}b_{33} + b_{12}b_{23}b_{31} + b_{13}b_{21}b_{32} - \\ - b_{13}b_{22}b_{31} - b_{11}b_{23}b_{32} - b_{12}b_{21}b_{33}.$$

Transzponálásnál az indexeket meg kell cserélni:  $b_{ij} = a_{ji}$ .

$$b_{11}b_{22}b_{33} = a_{11}a_{22}a_{33}.$$

$$b_{12}b_{23}b_{31} = a_{21}a_{32}a_{13} = a_{13}a_{21}a_{32}. \text{ Előjel: } +1.$$

$$b_{13}b_{21}b_{32} = a_{31}a_{12}a_{23} = a_{12}a_{23}a_{31}. \text{ Előjel: } +1.$$

$$b_{13}b_{22}b_{31} =$$

## $3 \times 3$ -as: a transzponált determinánása

$$M = ((a_{ij})) \implies a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - \\ - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}.$$

$$M^T = ((b_{ij})) \implies b_{11}b_{22}b_{33} + b_{12}b_{23}b_{31} + b_{13}b_{21}b_{32} - \\ - b_{13}b_{22}b_{31} - b_{11}b_{23}b_{32} - b_{12}b_{21}b_{33}.$$

Transzponálásnál az indexeket meg kell cserélni:  $b_{ij} = a_{ji}$ .

$$b_{11}b_{22}b_{33} = a_{11}a_{22}a_{33}.$$

$$b_{12}b_{23}b_{31} = a_{21}a_{32}a_{13} = a_{13}a_{21}a_{32}. \text{ Előjel: } +1.$$

$$b_{13}b_{21}b_{32} = a_{31}a_{12}a_{23} = a_{12}a_{23}a_{31}. \text{ Előjel: } +1.$$

$$b_{13}b_{22}b_{31} = a_{31}a_{22}a_{13} =$$

## $3 \times 3$ -as: a transzponált determinánása

$$M = ((a_{ij})) \implies a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - \\ - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}.$$

$$M^T = ((b_{ij})) \implies b_{11}b_{22}b_{33} + b_{12}b_{23}b_{31} + b_{13}b_{21}b_{32} - \\ - b_{13}b_{22}b_{31} - b_{11}b_{23}b_{32} - b_{12}b_{21}b_{33}.$$

Transzponálásnál az indexeket meg kell cserélni:  $b_{ij} = a_{ji}$ .

$$b_{11}b_{22}b_{33} = a_{11}a_{22}a_{33}.$$

$$b_{12}b_{23}b_{31} = a_{21}a_{32}a_{13} = a_{13}a_{21}a_{32}. \text{ Előjel: } +1.$$

$$b_{13}b_{21}b_{32} = a_{31}a_{12}a_{23} = a_{12}a_{23}a_{31}. \text{ Előjel: } +1.$$

$$b_{13}b_{22}b_{31} = a_{31}a_{22}a_{13} = a_{13}a_{22}a_{31}.$$

## $3 \times 3$ -as: a transzponált determinánása

$$M = ((a_{ij})) \implies a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - \\ - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}.$$

$$M^T = ((b_{ij})) \implies b_{11}b_{22}b_{33} + b_{12}b_{23}b_{31} + b_{13}b_{21}b_{32} - \\ - b_{13}b_{22}b_{31} - b_{11}b_{23}b_{32} - b_{12}b_{21}b_{33}.$$

Transzponálásnál az indexeket meg kell cserélni:  $b_{ij} = a_{ji}$ .

$$b_{11}b_{22}b_{33} = a_{11}a_{22}a_{33}.$$

$$b_{12}b_{23}b_{31} = a_{21}a_{32}a_{13} = a_{13}a_{21}a_{32}. \text{ Előjel: } +1.$$

$$b_{13}b_{21}b_{32} = a_{31}a_{12}a_{23} = a_{12}a_{23}a_{31}. \text{ Előjel: } +1.$$

$$b_{13}b_{22}b_{31} = a_{31}a_{22}a_{13} = a_{13}a_{22}a_{31}. \text{ Előjel: } -1.$$

## $3 \times 3$ -as: a transzponált determinánása

$$M = ((a_{ij})) \implies a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - \\ - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}.$$

$$M^T = ((b_{ij})) \implies b_{11}b_{22}b_{33} + b_{12}b_{23}b_{31} + b_{13}b_{21}b_{32} - \\ - b_{13}b_{22}b_{31} - b_{11}b_{23}b_{32} - b_{12}b_{21}b_{33}.$$

Transzponálásnál az indexeket meg kell cserélni:  $b_{ij} = a_{ji}$ .

$$b_{11}b_{22}b_{33} = a_{11}a_{22}a_{33}.$$

$$b_{12}b_{23}b_{31} = a_{21}a_{32}a_{13} = a_{13}a_{21}a_{32}. \text{ Előjel: } +1.$$

$$b_{13}b_{21}b_{32} = a_{31}a_{12}a_{23} = a_{12}a_{23}a_{31}. \text{ Előjel: } +1.$$

$$b_{13}b_{22}b_{31} = a_{31}a_{22}a_{13} = a_{13}a_{22}a_{31}. \text{ Előjel: } -1.$$

$$b_{11}b_{23}b_{32} =$$

## $3 \times 3$ -as: a transzponált determinánása

$$M = ((a_{ij})) \implies a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - \\ - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}.$$

$$M^T = ((b_{ij})) \implies b_{11}b_{22}b_{33} + b_{12}b_{23}b_{31} + b_{13}b_{21}b_{32} - \\ - b_{13}b_{22}b_{31} - b_{11}b_{23}b_{32} - b_{12}b_{21}b_{33}.$$

Transzponálásnál az indexeket meg kell cserélni:  $b_{ij} = a_{ji}$ .

$$b_{11}b_{22}b_{33} = a_{11}a_{22}a_{33}.$$

$$b_{12}b_{23}b_{31} = a_{21}a_{32}a_{13} = a_{13}a_{21}a_{32}. \text{ Előjel: } +1.$$

$$b_{13}b_{21}b_{32} = a_{31}a_{12}a_{23} = a_{12}a_{23}a_{31}. \text{ Előjel: } +1.$$

$$b_{13}b_{22}b_{31} = a_{31}a_{22}a_{13} = a_{13}a_{22}a_{31}. \text{ Előjel: } -1.$$

$$b_{11}b_{23}b_{32} = a_{11}a_{23}a_{32} =$$

## $3 \times 3$ -as: a transzponált determinánása

$$M = ((a_{ij})) \implies a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - \\ - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}.$$

$$M^T = ((b_{ij})) \implies b_{11}b_{22}b_{33} + b_{12}b_{23}b_{31} + b_{13}b_{21}b_{32} - \\ - b_{13}b_{22}b_{31} - b_{11}b_{23}b_{32} - b_{12}b_{21}b_{33}.$$

Transzponálásnál az indexeket meg kell cserélni:  $b_{ij} = a_{ji}$ .

$$b_{11}b_{22}b_{33} = a_{11}a_{22}a_{33}.$$

$$b_{12}b_{23}b_{31} = a_{21}a_{32}a_{13} = a_{13}a_{21}a_{32}. \text{ Előjel: } +1.$$

$$b_{13}b_{21}b_{32} = a_{31}a_{12}a_{23} = a_{12}a_{23}a_{31}. \text{ Előjel: } +1.$$

$$b_{13}b_{22}b_{31} = a_{31}a_{22}a_{13} = a_{13}a_{22}a_{31}. \text{ Előjel: } -1.$$

$$b_{11}b_{23}b_{32} = a_{11}a_{23}a_{32} = a_{11}a_{23}a_{32}.$$

## $3 \times 3$ -as: a transzponált determinánása

$$M = ((a_{ij})) \implies a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - \\ - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}.$$

$$M^T = ((b_{ij})) \implies b_{11}b_{22}b_{33} + b_{12}b_{23}b_{31} + b_{13}b_{21}b_{32} - \\ - b_{13}b_{22}b_{31} - b_{11}b_{23}b_{32} - b_{12}b_{21}b_{33}.$$

Transzponálásnál az indexeket meg kell cserélni:  $b_{ij} = a_{ji}$ .

$$b_{11}b_{22}b_{33} = a_{11}a_{22}a_{33}.$$

$$b_{12}b_{23}b_{31} = a_{21}a_{32}a_{13} = a_{13}a_{21}a_{32}. \text{ Előjel: } +1.$$

$$b_{13}b_{21}b_{32} = a_{31}a_{12}a_{23} = a_{12}a_{23}a_{31}. \text{ Előjel: } +1.$$

$$b_{13}b_{22}b_{31} = a_{31}a_{22}a_{13} = a_{13}a_{22}a_{31}. \text{ Előjel: } -1.$$

$$b_{11}b_{23}b_{32} = a_{11}a_{23}a_{32} = a_{11}a_{23}a_{32}. \text{ Előjel: } -1.$$



## $3 \times 3$ -as: a transzponált determinánása

$$M = ((a_{ij})) \implies a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - \\ - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}.$$

$$M^T = ((b_{ij})) \implies b_{11}b_{22}b_{33} + b_{12}b_{23}b_{31} + b_{13}b_{21}b_{32} - \\ - b_{13}b_{22}b_{31} - b_{11}b_{23}b_{32} - b_{12}b_{21}b_{33}.$$

Transzponálásnál az indexeket meg kell cserélni:  $b_{ij} = a_{ji}$ .

$$b_{11}b_{22}b_{33} = a_{11}a_{22}a_{33}.$$

$$b_{12}b_{23}b_{31} = a_{21}a_{32}a_{13} = a_{13}a_{21}a_{32}. \text{ Előjel: } +1.$$

$$b_{13}b_{21}b_{32} = a_{31}a_{12}a_{23} = a_{12}a_{23}a_{31}. \text{ Előjel: } +1.$$

$$b_{13}b_{22}b_{31} = a_{31}a_{22}a_{13} = a_{13}a_{22}a_{31}. \text{ Előjel: } -1.$$

$$b_{11}b_{23}b_{32} = a_{11}a_{23}a_{32} = a_{11}a_{23}a_{32}. \text{ Előjel: } -1.$$

$$b_{12}b_{21}b_{32} =$$

## $3 \times 3$ -as: a transzponált determinánása

$$M = ((a_{ij})) \implies a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - \\ - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}.$$

$$M^T = ((b_{ij})) \implies b_{11}b_{22}b_{33} + b_{12}b_{23}b_{31} + b_{13}b_{21}b_{32} - \\ - b_{13}b_{22}b_{31} - b_{11}b_{23}b_{32} - b_{12}b_{21}b_{33}.$$

Transzponálásnál az indexeket meg kell cserélni:  $b_{ij} = a_{ji}$ .

$$b_{11}b_{22}b_{33} = a_{11}a_{22}a_{33}.$$

$$b_{12}b_{23}b_{31} = a_{21}a_{32}a_{13} = a_{13}a_{21}a_{32}. \text{ Előjel: } +1.$$

$$b_{13}b_{21}b_{32} = a_{31}a_{12}a_{23} = a_{12}a_{23}a_{31}. \text{ Előjel: } +1.$$

$$b_{13}b_{22}b_{31} = a_{31}a_{22}a_{13} = a_{13}a_{22}a_{31}. \text{ Előjel: } -1.$$

$$b_{11}b_{23}b_{32} = a_{11}a_{23}a_{32} = a_{11}a_{23}a_{32}. \text{ Előjel: } -1.$$

$$b_{12}b_{21}b_{32} = a_{21}a_{12}a_{33} =$$

## $3 \times 3$ -as: a transzponált determinánása

$$M = ((a_{ij})) \implies a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - \\ - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}.$$

$$M^T = ((b_{ij})) \implies b_{11}b_{22}b_{33} + b_{12}b_{23}b_{31} + b_{13}b_{21}b_{32} - \\ - b_{13}b_{22}b_{31} - b_{11}b_{23}b_{32} - b_{12}b_{21}b_{33}.$$

Transzponálásnál az indexeket meg kell cserélni:  $b_{ij} = a_{ji}$ .

$$b_{11}b_{22}b_{33} = a_{11}a_{22}a_{33}.$$

$$b_{12}b_{23}b_{31} = a_{21}a_{32}a_{13} = a_{13}a_{21}a_{32}. \text{ Előjel: } +1.$$

$$b_{13}b_{21}b_{32} = a_{31}a_{12}a_{23} = a_{12}a_{23}a_{31}. \text{ Előjel: } +1.$$

$$b_{13}b_{22}b_{31} = a_{31}a_{22}a_{13} = a_{13}a_{22}a_{31}. \text{ Előjel: } -1.$$

$$b_{11}b_{23}b_{32} = a_{11}a_{23}a_{32} = a_{11}a_{23}a_{32}. \text{ Előjel: } -1.$$

$$b_{12}b_{21}b_{32} = a_{21}a_{12}a_{33} = a_{12}a_{21}a_{33}.$$

## $3 \times 3$ -as: a transzponált determinánása

$$M = ((a_{ij})) \implies a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - \\ - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}.$$

$$M^T = ((b_{ij})) \implies b_{11}b_{22}b_{33} + b_{12}b_{23}b_{31} + b_{13}b_{21}b_{32} - \\ - b_{13}b_{22}b_{31} - b_{11}b_{23}b_{32} - b_{12}b_{21}b_{33}.$$

Transzponálásnál az indexeket meg kell cserélni:  $b_{ij} = a_{ji}$ .

$$b_{11}b_{22}b_{33} = a_{11}a_{22}a_{33}.$$

$$b_{12}b_{23}b_{31} = a_{21}a_{32}a_{13} = a_{13}a_{21}a_{32}. \text{ Előjel: } +1.$$

$$b_{13}b_{21}b_{32} = a_{31}a_{12}a_{23} = a_{12}a_{23}a_{31}. \text{ Előjel: } +1.$$

$$b_{13}b_{22}b_{31} = a_{31}a_{22}a_{13} = a_{13}a_{22}a_{31}. \text{ Előjel: } -1.$$

$$b_{11}b_{23}b_{32} = a_{11}a_{23}a_{32} = a_{11}a_{23}a_{32}. \text{ Előjel: } -1.$$

$$b_{12}b_{21}b_{32} = a_{21}a_{12}a_{33} = a_{12}a_{21}a_{33}. \text{ Előjel: } -1.$$



## $3 \times 3$ -as: a transzponáltbeli permutációk

$$b_{11}b_{22}b_{33} = a_{11}a_{22}a_{33}.$$

$$b_{12}b_{23}b_{31} = a_{21}a_{32}a_{13} = a_{13}a_{21}a_{32}. \text{ Előjel: } +1.$$

$$b_{13}b_{21}b_{32} = a_{31}a_{12}a_{23} = a_{12}a_{23}a_{31}. \text{ Előjel: } +1.$$

$$b_{13}b_{22}b_{31} = a_{31}a_{22}a_{13} = a_{13}a_{22}a_{31}. \text{ Előjel: } -1.$$

$$b_{11}b_{23}b_{32} = a_{11}a_{23}a_{32} = a_{11}a_{23}a_{32}. \text{ Előjel: } -1.$$

$$b_{12}b_{21}b_{32} = a_{21}a_{12}a_{33} = a_{12}a_{21}a_{33}. \text{ Előjel: } -1.$$



## $3 \times 3$ -as: a transzponáltbeli permutációk

$$b_{11}b_{22}b_{33} = a_{11}a_{22}a_{33}.$$

$$b_{12}b_{23}b_{31} = a_{21}a_{32}a_{13} = a_{13}a_{21}a_{32}. \text{ Előjel: } +1.$$

$$b_{13}b_{21}b_{32} = a_{31}a_{12}a_{23} = a_{12}a_{23}a_{31}. \text{ Előjel: } +1.$$

$$b_{13}b_{22}b_{31} = a_{31}a_{22}a_{13} = a_{13}a_{22}a_{31}. \text{ Előjel: } -1.$$

$$b_{11}b_{23}b_{32} = a_{11}a_{23}a_{32} = a_{11}a_{23}a_{32}. \text{ Előjel: } -1.$$

$$b_{12}b_{21}b_{32} = a_{21}a_{12}a_{33} = a_{12}a_{21}a_{33}. \text{ Előjel: } -1. \quad \square$$

$$b_{12}b_{23}b_{31} = a_{13}a_{21}a_{32}.$$

## $3 \times 3$ -as: a transzponáltbeli permutációk

$$b_{11}b_{22}b_{33} = a_{11}a_{22}a_{33}.$$

$$b_{12}b_{23}b_{31} = a_{21}a_{32}a_{13} = a_{13}a_{21}a_{32}. \text{ Előjel: } +1.$$

$$b_{13}b_{21}b_{32} = a_{31}a_{12}a_{23} = a_{12}a_{23}a_{31}. \text{ Előjel: } +1.$$

$$b_{13}b_{22}b_{31} = a_{31}a_{22}a_{13} = a_{13}a_{22}a_{31}. \text{ Előjel: } -1.$$

$$b_{11}b_{23}b_{32} = a_{11}a_{23}a_{32} = a_{11}a_{23}a_{32}. \text{ Előjel: } -1.$$

$$b_{12}b_{21}b_{32} = a_{21}a_{12}a_{33} = a_{12}a_{21}a_{33}. \text{ Előjel: } -1. \quad \square$$

$$b_{12}b_{23}b_{31} = a_{13}a_{21}a_{32}.$$

$$f = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

## $3 \times 3$ -as: a transzponáltbeli permutációk

$$b_{11}b_{22}b_{33} = a_{11}a_{22}a_{33}.$$

$$b_{12}b_{23}b_{31} = a_{21}a_{32}a_{13} = a_{13}a_{21}a_{32}. \text{ Előjel: } +1.$$

$$b_{13}b_{21}b_{32} = a_{31}a_{12}a_{23} = a_{12}a_{23}a_{31}. \text{ Előjel: } +1.$$

$$b_{13}b_{22}b_{31} = a_{31}a_{22}a_{13} = a_{13}a_{22}a_{31}. \text{ Előjel: } -1.$$

$$b_{11}b_{23}b_{32} = a_{11}a_{23}a_{32} = a_{11}a_{23}a_{32}. \text{ Előjel: } -1.$$

$$b_{12}b_{21}b_{32} = a_{21}a_{12}a_{33} = a_{12}a_{21}a_{33}. \text{ Előjel: } -1. \quad \square$$

$$b_{12}b_{23}b_{31} = a_{13}a_{21}a_{32}.$$

$$f = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix} \quad g = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{bmatrix}.$$



## $3 \times 3$ -as: a transzponáltbeli permutációk

$$b_{11}b_{22}b_{33} = a_{11}a_{22}a_{33}.$$

$$b_{12}b_{23}b_{31} = a_{21}a_{32}a_{13} = a_{13}a_{21}a_{32}. \text{ Előjel: } +1.$$

$$b_{13}b_{21}b_{32} = a_{31}a_{12}a_{23} = a_{12}a_{23}a_{31}. \text{ Előjel: } +1.$$

$$b_{13}b_{22}b_{31} = a_{31}a_{22}a_{13} = a_{13}a_{22}a_{31}. \text{ Előjel: } -1.$$

$$b_{11}b_{23}b_{32} = a_{11}a_{23}a_{32} = a_{11}a_{23}a_{32}. \text{ Előjel: } -1.$$

$$b_{12}b_{21}b_{32} = a_{21}a_{12}a_{33} = a_{12}a_{21}a_{33}. \text{ Előjel: } -1. \quad \square$$

$$b_{12}b_{23}b_{31} = a_{13}a_{21}a_{32}.$$

$$f = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix} \quad g = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{bmatrix}. \quad \text{Ezek egymás inverzei.}$$

## $3 \times 3$ -as: a transzponáltbeli permutációk

$$b_{11}b_{22}b_{33} = a_{11}a_{22}a_{33}.$$

$$b_{12}b_{23}b_{31} = a_{21}a_{32}a_{13} = a_{13}a_{21}a_{32}. \text{ Előjel: } +1.$$

$$b_{13}b_{21}b_{32} = a_{31}a_{12}a_{23} = a_{12}a_{23}a_{31}. \text{ Előjel: } +1.$$

$$b_{13}b_{22}b_{31} = a_{31}a_{22}a_{13} = a_{13}a_{22}a_{31}. \text{ Előjel: } -1.$$

$$b_{11}b_{23}b_{32} = a_{11}a_{23}a_{32} = a_{11}a_{23}a_{32}. \text{ Előjel: } -1.$$

$$b_{12}b_{21}b_{32} = a_{21}a_{12}a_{33} = a_{12}a_{21}a_{33}. \text{ Előjel: } -1. \quad \square$$

$$b_{12}b_{23}b_{31} = a_{13}a_{21}a_{32}.$$

$$f = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix} \quad g = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{bmatrix}. \quad \text{Ezek egymás inverzei.}$$

$$b_{13}b_{22}b_{31} = a_{13}a_{22}a_{31}.$$

## $3 \times 3$ -as: a transzponáltbeli permutációk

$$b_{11}b_{22}b_{33} = a_{11}a_{22}a_{33}.$$

$$b_{12}b_{23}b_{31} = a_{21}a_{32}a_{13} = a_{13}a_{21}a_{32}. \text{ Előjel: } +1.$$

$$b_{13}b_{21}b_{32} = a_{31}a_{12}a_{23} = a_{12}a_{23}a_{31}. \text{ Előjel: } +1.$$

$$b_{13}b_{22}b_{31} = a_{31}a_{22}a_{13} = a_{13}a_{22}a_{31}. \text{ Előjel: } -1.$$

$$b_{11}b_{23}b_{32} = a_{11}a_{23}a_{32} = a_{11}a_{23}a_{32}. \text{ Előjel: } -1.$$

$$b_{12}b_{21}b_{32} = a_{21}a_{12}a_{33} = a_{12}a_{21}a_{33}. \text{ Előjel: } -1. \quad \square$$

$$b_{12}b_{23}b_{31} = a_{13}a_{21}a_{32}.$$

$$f = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix} \quad g = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{bmatrix}. \quad \text{Ezek egymás inverzei.}$$

$$b_{13}b_{22}b_{31} = a_{13}a_{22}a_{31}.$$

$$f = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

## $3 \times 3$ -as: a transzponáltbeli permutációk

$$b_{11}b_{22}b_{33} = a_{11}a_{22}a_{33}.$$

$$b_{12}b_{23}b_{31} = a_{21}a_{32}a_{13} = a_{13}a_{21}a_{32}. \text{ Előjel: } +1.$$

$$b_{13}b_{21}b_{32} = a_{31}a_{12}a_{23} = a_{12}a_{23}a_{31}. \text{ Előjel: } +1.$$

$$b_{13}b_{22}b_{31} = a_{31}a_{22}a_{13} = a_{13}a_{22}a_{31}. \text{ Előjel: } -1.$$

$$b_{11}b_{23}b_{32} = a_{11}a_{23}a_{32} = a_{11}a_{23}a_{32}. \text{ Előjel: } -1.$$

$$b_{12}b_{21}b_{32} = a_{21}a_{12}a_{33} = a_{12}a_{21}a_{33}. \text{ Előjel: } -1. \quad \square$$

$$b_{12}b_{23}b_{31} = a_{13}a_{21}a_{32}.$$

$$f = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix} \quad g = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{bmatrix}. \quad \text{Ezek egymás inverzei.}$$

$$b_{13}b_{22}b_{31} = a_{13}a_{22}a_{31}.$$

$$f = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix} \quad g = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}.$$

## $3 \times 3$ -as: a transzponáltbeli permutációk

$$b_{11}b_{22}b_{33} = a_{11}a_{22}a_{33}.$$

$$b_{12}b_{23}b_{31} = a_{21}a_{32}a_{13} = a_{13}a_{21}a_{32}. \text{ Előjel: } +1.$$

$$b_{13}b_{21}b_{32} = a_{31}a_{12}a_{23} = a_{12}a_{23}a_{31}. \text{ Előjel: } +1.$$

$$b_{13}b_{22}b_{31} = a_{31}a_{22}a_{13} = a_{13}a_{22}a_{31}. \text{ Előjel: } -1.$$

$$b_{11}b_{23}b_{32} = a_{11}a_{23}a_{32} = a_{11}a_{23}a_{32}. \text{ Előjel: } -1.$$

$$b_{12}b_{21}b_{32} = a_{21}a_{12}a_{33} = a_{12}a_{21}a_{33}. \text{ Előjel: } -1. \quad \square$$

$$b_{12}b_{23}b_{31} = a_{13}a_{21}a_{32}.$$

$$f = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix} \quad g = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{bmatrix}. \quad \text{Ezek egymás inverzei.}$$

$$b_{13}b_{22}b_{31} = a_{13}a_{22}a_{31}.$$

$$f = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix} = g = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}.$$

## $3 \times 3$ -as: a transzponáltbeli permutációk

$$b_{11}b_{22}b_{33} = a_{11}a_{22}a_{33}.$$

$$b_{12}b_{23}b_{31} = a_{21}a_{32}a_{13} = a_{13}a_{21}a_{32}. \text{ Előjel: } +1.$$

$$b_{13}b_{21}b_{32} = a_{31}a_{12}a_{23} = a_{12}a_{23}a_{31}. \text{ Előjel: } +1.$$

$$b_{13}b_{22}b_{31} = a_{31}a_{22}a_{13} = a_{13}a_{22}a_{31}. \text{ Előjel: } -1.$$

$$b_{11}b_{23}b_{32} = a_{11}a_{23}a_{32} = a_{11}a_{23}a_{32}. \text{ Előjel: } -1.$$

$$b_{12}b_{21}b_{32} = a_{21}a_{12}a_{33} = a_{12}a_{21}a_{33}. \text{ Előjel: } -1. \quad \square$$

$$b_{12}b_{23}b_{31} = a_{13}a_{21}a_{32}.$$

$$f = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix} \quad g = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{bmatrix}. \quad \text{Ezek egymás } \textit{inverzei}.$$

$$b_{13}b_{22}b_{31} = a_{13}a_{22}a_{31}.$$

$$f = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix} = g = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}. \quad \text{Ezek is egymás } \textit{inverzei}.$$

## $3 \times 3$ -as: a transzponáltbeli permutációk

$$b_{11}b_{22}b_{33} = a_{11}a_{22}a_{33}.$$

$$b_{12}b_{23}b_{31} = a_{21}a_{32}a_{13} = a_{13}a_{21}a_{32}. \text{ Előjel: } +1.$$

$$b_{13}b_{21}b_{32} = a_{31}a_{12}a_{23} = a_{12}a_{23}a_{31}. \text{ Előjel: } +1.$$

$$b_{13}b_{22}b_{31} = a_{31}a_{22}a_{13} = a_{13}a_{22}a_{31}. \text{ Előjel: } -1.$$

$$b_{11}b_{23}b_{32} = a_{11}a_{23}a_{32} = a_{11}a_{23}a_{32}. \text{ Előjel: } -1.$$

$$b_{12}b_{21}b_{32} = a_{21}a_{12}a_{33} = a_{12}a_{21}a_{33}. \text{ Előjel: } -1. \quad \square$$

$$b_{12}b_{23}b_{31} = a_{13}a_{21}a_{32}.$$

$$f = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix} \quad g = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{bmatrix}. \quad \text{Ezek egymás } \textit{inverzei}.$$

$$b_{13}b_{22}b_{31} = a_{13}a_{22}a_{31}.$$

$$f = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix} = g = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}. \quad \text{Ezek is egymás } \textit{inverzei}.$$

Az összes többi tagnál is inverz permutációkat kapunk.

## A transzponált determinánása (F1.3.6. Tétel)

$$M = ((a_{ij})) \implies \det(M) = \sum_{g \in S_n} \text{sg}(g) a_{1g(1)} a_{2g(2)} \cdots a_{ng(n)}.$$

$$M^T = ((b_{ij})) \implies \det(M^T) = \sum_{f \in S_n} \text{sg}(f) b_{1f(1)} b_{2f(2)} \cdots b_{nf(n)}.$$



## A transzponált determinánása (F1.3.6. Tétel)

$$M = ((a_{ij})) \implies \det(M) = \sum_{g \in S_n} \text{sg}(g) a_{1g(1)} a_{2g(2)} \cdots a_{ng(n)}.$$

$$M^T = ((b_{ij})) \implies \det(M^T) = \sum_{f \in S_n} \text{sg}(f) b_{1f(1)} b_{2f(2)} \cdots b_{nf(n)}.$$

Transzponálásnál az indexeket meg kell cserélni:

## A transzponált determinánása (F1.3.6. Tétel)

$$M = ((a_{ij})) \implies \det(M) = \sum_{g \in S_n} \text{sg}(g) a_{1g(1)} a_{2g(2)} \cdots a_{ng(n)}.$$

$$M^T = ((b_{ij})) \implies \det(M^T) = \sum_{f \in S_n} \text{sg}(f) b_{1f(1)} b_{2f(2)} \cdots b_{nf(n)}.$$

Transzponálásnál az indexeket meg kell cserélni:  $b_{ji} = a_{ij}$ .

## A transzponált determinánása (F1.3.6. Tétel)

$$M = ((a_{ij})) \implies \det(M) = \sum_{g \in S_n} \text{sg}(g) a_{1g(1)} a_{2g(2)} \cdots a_{ng(n)}.$$

$$M^T = ((b_{ij})) \implies \det(M^T) = \sum_{f \in S_n} \text{sg}(f) b_{1f(1)} b_{2f(2)} \cdots b_{nf(n)}.$$

Transzponálásnál az indexeket meg kell cserélni:  $b_{ji} = a_{ij}$ .

$$b_{1f(1)} b_{2f(2)} \cdots b_{nf(n)} =$$

## A transzponált determinánása (F1.3.6. Tétel)

$$M = ((a_{ij})) \implies \det(M) = \sum_{g \in S_n} \text{sg}(g) a_{1g(1)} a_{2g(2)} \cdots a_{ng(n)}.$$

$$M^T = ((b_{ij})) \implies \det(M^T) = \sum_{f \in S_n} \text{sg}(f) b_{1f(1)} b_{2f(2)} \cdots b_{nf(n)}.$$

Transzponálásnál az indexeket meg kell cserélni:  $b_{ji} = a_{ij}$ .

$$b_{1f(1)} b_{2f(2)} \cdots b_{nf(n)} = a_{f(1)1} a_{f(2)2} \cdots a_{f(n)n}.$$

## A transzponált determinánása (F1.3.6. Tétel)

$$M = ((a_{ij})) \implies \det(M) = \sum_{g \in S_n} \text{sg}(g) a_{1g(1)} a_{2g(2)} \cdots a_{ng(n)}.$$

$$M^T = ((b_{ij})) \implies \det(M^T) = \sum_{f \in S_n} \text{sg}(f) b_{1f(1)} b_{2f(2)} \cdots b_{nf(n)}.$$

Transzponálásnál az indexeket meg kell cserélni:  $b_{ji} = a_{ij}$ .

$$b_{1f(1)} b_{2f(2)} \cdots b_{nf(n)} = a_{f(1)1} a_{f(2)2} \cdots a_{f(n)n}.$$

Rakjuk sorba az első index szerint e szorzat tényezőit:

## A transzponált determinánása (F1.3.6. Tétel)

$$M = ((a_{ij})) \implies \det(M) = \sum_{g \in S_n} \text{sg}(g) a_{1g(1)} a_{2g(2)} \cdots a_{ng(n)}.$$

$$M^T = ((b_{ij})) \implies \det(M^T) = \sum_{f \in S_n} \text{sg}(f) b_{1f(1)} b_{2f(2)} \cdots b_{nf(n)}.$$

Transzponálásnál az indexeket meg kell cserélni:  $b_{ji} = a_{ij}$ .

$$b_{1f(1)} b_{2f(2)} \cdots b_{nf(n)} = a_{f(1)1} a_{f(2)2} \cdots a_{f(n)n}.$$

Rakjuk sorba az első index szerint e szorzat tényezőit:

$$a_{f(1)1} a_{f(2)2} \cdots a_{f(n)n} = a_{1g(1)} a_{2g(2)} \cdots a_{ng(n)}.$$

# A transzponált determinánása (F1.3.6. Tétel)

$$M = ((a_{ij})) \implies \det(M) = \sum_{g \in S_n} \text{sg}(g) a_{1g(1)} a_{2g(2)} \cdots a_{ng(n)}.$$

$$M^T = ((b_{ij})) \implies \det(M^T) = \sum_{f \in S_n} \text{sg}(f) b_{1f(1)} b_{2f(2)} \cdots b_{nf(n)}.$$

Transzponálásnál az indexeket meg kell cserélni:  $b_{ji} = a_{ij}$ .

$$b_{1f(1)} b_{2f(2)} \cdots b_{nf(n)} = a_{f(1)1} a_{f(2)2} \cdots a_{f(n)n}.$$

Rakjuk sorba az első index szerint e szorzat tényezőit:

$$a_{f(1)1} a_{f(2)2} \cdots a_{f(n)n} = a_{1g(1)} a_{2g(2)} \cdots a_{ng(n)}.$$

A  $b_{ji} = a_{ij}$  akkor szerepel a sárga szorzatban,

## A transzponált determinánása (F1.3.6. Tétel)

$$M = ((a_{ij})) \implies \det(M) = \sum_{g \in S_n} \text{sg}(g) a_{1g(1)} a_{2g(2)} \cdots a_{ng(n)}.$$

$$M^T = ((b_{ij})) \implies \det(M^T) = \sum_{f \in S_n} \text{sg}(f) b_{1f(1)} b_{2f(2)} \cdots b_{nf(n)}.$$

Transzponálásnál az indexeket meg kell cserélni:  $b_{ji} = a_{ij}$ .

$$b_{1f(1)} b_{2f(2)} \cdots b_{nf(n)} = a_{f(1)1} a_{f(2)2} \cdots a_{f(n)n}.$$

Rakjuk sorba az első index szerint e szorzat tényezőit:

$$a_{f(1)1} a_{f(2)2} \cdots a_{f(n)n} = a_{1g(1)} a_{2g(2)} \cdots a_{ng(n)}.$$

A  $b_{ji} = a_{ij}$  akkor szerepel a sárga szorzatban, ha  $i = f(j)$ .



# A transzponált determinánása (F1.3.6. Tétel)

$$M = ((a_{ij})) \implies \det(M) = \sum_{g \in S_n} \text{sg}(g) a_{1g(1)} a_{2g(2)} \cdots a_{ng(n)}.$$

$$M^T = ((b_{ij})) \implies \det(M^T) = \sum_{f \in S_n} \text{sg}(f) b_{1f(1)} b_{2f(2)} \cdots b_{nf(n)}.$$

Transzponálásnál az indexeket meg kell cserélni:  $b_{ji} = a_{ij}$ .

$$b_{1f(1)} b_{2f(2)} \cdots b_{nf(n)} = a_{f(1)1} a_{f(2)2} \cdots a_{f(n)n}.$$

Rakjuk sorba az első index szerint e szorzat tényezőit:

$$a_{f(1)1} a_{f(2)2} \cdots a_{f(n)n} = a_{1g(1)} a_{2g(2)} \cdots a_{ng(n)}.$$

A  $b_{ji} = a_{ij}$  akkor szerepel a sárga szorzatban, ha  $i = f(j)$ .

Az  $a_{ij}$  akkor szerepel a kék szorzatban,

# A transzponált determinánása (F1.3.6. Tétel)

$$M = ((a_{ij})) \implies \det(M) = \sum_{g \in S_n} \text{sg}(g) a_{1g(1)} a_{2g(2)} \cdots a_{ng(n)}.$$

$$M^T = ((b_{ij})) \implies \det(M^T) = \sum_{f \in S_n} \text{sg}(f) b_{1f(1)} b_{2f(2)} \cdots b_{nf(n)}.$$

Transzponálásnál az indexeket meg kell cserélni:  $b_{ji} = a_{ij}$ .

$$b_{1f(1)} b_{2f(2)} \cdots b_{nf(n)} = a_{f(1)1} a_{f(2)2} \cdots a_{f(n)n}.$$

Rakjuk sorba az első index szerint e szorzat tényezőit:

$$a_{f(1)1} a_{f(2)2} \cdots a_{f(n)n} = a_{1g(1)} a_{2g(2)} \cdots a_{ng(n)}.$$

A  $b_{ji} = a_{ij}$  akkor szerepel a **sárga** szorzatban, ha  $i = f(j)$ .

Az  $a_{ij}$  akkor szerepel a **kék** szorzatban, ha  $g(i) = j$ .

# A transzponált determinánása (F1.3.6. Tétel)

$$M = ((a_{ij})) \implies \det(M) = \sum_{g \in S_n} \text{sg}(g) a_{1g(1)} a_{2g(2)} \cdots a_{ng(n)}.$$

$$M^T = ((b_{ij})) \implies \det(M^T) = \sum_{f \in S_n} \text{sg}(f) b_{1f(1)} b_{2f(2)} \cdots b_{nf(n)}.$$

Transzponálásnál az indexeket meg kell cserélni:  $b_{ji} = a_{ij}$ .

$$b_{1f(1)} b_{2f(2)} \cdots b_{nf(n)} = a_{f(1)1} a_{f(2)2} \cdots a_{f(n)n}.$$

Rakjuk sorba az első index szerint e szorzat tényezőit:

$$a_{f(1)1} a_{f(2)2} \cdots a_{f(n)n} = a_{1g(1)} a_{2g(2)} \cdots a_{ng(n)}.$$

A  $b_{ji} = a_{ij}$  akkor szerepel a sárga szorzatban, ha  $i = f(j)$ .

Az  $a_{ij}$  akkor szerepel a kék szorzatban, ha  $g(i) = j$ .

A sárga és kék szorzatok tényezői ugyanazok.

# A transzponált determinánása (F1.3.6. Tétel)

$$M = ((a_{ij})) \implies \det(M) = \sum_{g \in S_n} \text{sg}(g) a_{1g(1)} a_{2g(2)} \cdots a_{ng(n)}.$$

$$M^T = ((b_{ij})) \implies \det(M^T) = \sum_{f \in S_n} \text{sg}(f) b_{1f(1)} b_{2f(2)} \cdots b_{nf(n)}.$$

Transzponálásnál az indexeket meg kell cserélni:  $b_{ji} = a_{ij}$ .

$$b_{1f(1)} b_{2f(2)} \cdots b_{nf(n)} = a_{f(1)1} a_{f(2)2} \cdots a_{f(n)n}.$$

Rakjuk sorba az első index szerint e szorzat tényezőit:

$$a_{f(1)1} a_{f(2)2} \cdots a_{f(n)n} = a_{1g(1)} a_{2g(2)} \cdots a_{ng(n)}.$$

A  $b_{ji} = a_{ij}$  akkor szerepel a sárga szorzatban, ha  $i = f(j)$ .

Az  $a_{ij}$  akkor szerepel a kék szorzatban, ha  $g(i) = j$ .

A sárga és kék szorzatok tényezői ugyanazok. Ezért

$$i = f(j) \iff g(i) = j.$$

# A transzponált determinánsa (F1.3.6. Tétel)

$$M = ((a_{ij})) \implies \det(M) = \sum_{g \in S_n} \text{sg}(g) a_{1g(1)} a_{2g(2)} \cdots a_{ng(n)}.$$

$$M^T = ((b_{ij})) \implies \det(M^T) = \sum_{f \in S_n} \text{sg}(f) b_{1f(1)} b_{2f(2)} \cdots b_{nf(n)}.$$

Transzponálásnál az indexeket meg kell cserélni:  $b_{ji} = a_{ij}$ .

$$b_{1f(1)} b_{2f(2)} \cdots b_{nf(n)} = a_{f(1)1} a_{f(2)2} \cdots a_{f(n)n}.$$

Rakjuk sorba az első index szerint e szorzat tényezőit:

$$a_{f(1)1} a_{f(2)2} \cdots a_{f(n)n} = a_{1g(1)} a_{2g(2)} \cdots a_{ng(n)}.$$

A  $b_{ji} = a_{ij}$  akkor szerepel a **sárga** szorzatban, ha  $i = f(j)$ .

Az  $a_{ij}$  akkor szerepel a **kék** szorzatban, ha  $g(i) = j$ .

A **sárga** és **kék** szorzatok tényezői ugyanazok. Ezért

$i = f(j) \iff g(i) = j$ . Ez azt jelenti, hogy  $g = f^{-1}$ .

# A transzponált determinánása (F1.3.6. Tétel)

$$M = ((a_{ij})) \implies \det(M) = \sum_{g \in S_n} \text{sg}(g) a_{1g(1)} a_{2g(2)} \cdots a_{ng(n)}.$$

$$M^T = ((b_{ij})) \implies \det(M^T) = \sum_{f \in S_n} \text{sg}(f) b_{1f(1)} b_{2f(2)} \cdots b_{nf(n)}.$$

Transzponálásnál az indexeket meg kell cserélni:  $b_{ji} = a_{ij}$ .

$$b_{1f(1)} b_{2f(2)} \cdots b_{nf(n)} = a_{f(1)1} a_{f(2)2} \cdots a_{f(n)n}.$$

Rakjuk sorba az első index szerint e szorzat tényezőit:

$$a_{f(1)1} a_{f(2)2} \cdots a_{f(n)n} = a_{1g(1)} a_{2g(2)} \cdots a_{ng(n)}.$$

A  $b_{ji} = a_{ij}$  akkor szerepel a sárga szorzatban, ha  $i = f(j)$ .

Az  $a_{ij}$  akkor szerepel a kék szorzatban, ha  $g(i) = j$ .

A sárga és kék szorzatok tényezői ugyanazok. Ezért

$$i = f(j) \iff g(i) = j. \text{ Ez azt jelenti, hogy } g = f^{-1}.$$

Tehát a  $\det(M^T)$ -ban szereplő,  $f \in S_n$ -hez tartozó tag

# A transzponált determinánása (F1.3.6. Tétel)

$$M = ((a_{ij})) \implies \det(M) = \sum_{g \in S_n} \text{sg}(g) a_{1g(1)} a_{2g(2)} \cdots a_{ng(n)}.$$

$$M^T = ((b_{ij})) \implies \det(M^T) = \sum_{f \in S_n} \text{sg}(f) b_{1f(1)} b_{2f(2)} \cdots b_{nf(n)}.$$

Transzponálásnál az indexeket meg kell cserélni:  $b_{ji} = a_{ij}$ .

$$b_{1f(1)} b_{2f(2)} \cdots b_{nf(n)} = a_{f(1)1} a_{f(2)2} \cdots a_{f(n)n}.$$

Rakjuk sorba az első index szerint e szorzat tényezőit:

$$a_{f(1)1} a_{f(2)2} \cdots a_{f(n)n} = a_{1g(1)} a_{2g(2)} \cdots a_{ng(n)}.$$

A  $b_{ji} = a_{ij}$  akkor szerepel a **sárga** szorzatban, ha  $i = f(j)$ .

Az  $a_{ij}$  akkor szerepel a **kék** szorzatban, ha  $g(i) = j$ .

A **sárga** és **kék** szorzatok tényezői ugyanazok. Ezért

$$i = f(j) \iff g(i) = j. \text{ Ez azt jelenti, hogy } g = f^{-1}.$$

Tehát a  $\det(M^T)$ -ban szereplő,  $f \in S_n$ -hez tartozó tag megegyezik a  $\det(M)$ -beli  $g = f^{-1} \in S_n$ -hez tartozó taggal.

# A transzponált determinánása (F1.3.6. Tétel)

$$M = ((a_{ij})) \implies \det(M) = \sum_{g \in S_n} \text{sg}(g) a_{1g(1)} a_{2g(2)} \cdots a_{ng(n)}.$$

$$M^T = ((b_{ij})) \implies \det(M^T) = \sum_{f \in S_n} \text{sg}(f) b_{1f(1)} b_{2f(2)} \cdots b_{nf(n)}.$$

Transzponálásnál az indexeket meg kell cserélni:  $b_{ji} = a_{ij}$ .

$$b_{1f(1)} b_{2f(2)} \cdots b_{nf(n)} = a_{f(1)1} a_{f(2)2} \cdots a_{f(n)n}.$$

Rakjuk sorba az első index szerint e szorzat tényezőit:

$$a_{f(1)1} a_{f(2)2} \cdots a_{f(n)n} = a_{1g(1)} a_{2g(2)} \cdots a_{ng(n)}.$$

A  $b_{ji} = a_{ij}$  akkor szerepel a sárga szorzatban, ha  $i = f(j)$ .

Az  $a_{ij}$  akkor szerepel a kék szorzatban, ha  $g(i) = j$ .

A sárga és kék szorzatok tényezői ugyanazok. Ezért

$$i = f(j) \iff g(i) = j. \text{ Ez azt jelenti, hogy } g = f^{-1}.$$

Tehát a  $\det(M^T)$ -ban szereplő,  $f \in S_n$ -hez tartozó tag megegyezik

a  $\det(M)$ -beli  $g = f^{-1} \in S_n$ -hez tartozó taggal.

Mivel  $\text{sg}(f^{-1}) = \text{sg}(f)$ ,



# A transzponált determinánása (F1.3.6. Tétel)

$$M = ((a_{ij})) \implies \det(M) = \sum_{g \in S_n} \text{sg}(g) a_{1g(1)} a_{2g(2)} \cdots a_{ng(n)}.$$

$$M^T = ((b_{ij})) \implies \det(M^T) = \sum_{f \in S_n} \text{sg}(f) b_{1f(1)} b_{2f(2)} \cdots b_{nf(n)}.$$

Transzponálásnál az indexeket meg kell cserélni:  $b_{ji} = a_{ij}$ .

$$b_{1f(1)} b_{2f(2)} \cdots b_{nf(n)} = a_{f(1)1} a_{f(2)2} \cdots a_{f(n)n}.$$

Rakjuk sorba az első index szerint e szorzat tényezőit:

$$a_{f(1)1} a_{f(2)2} \cdots a_{f(n)n} = a_{1g(1)} a_{2g(2)} \cdots a_{ng(n)}.$$

A  $b_{ji} = a_{ij}$  akkor szerepel a **sárga** szorzatban, ha  $i = f(j)$ .

Az  $a_{ij}$  akkor szerepel a **kék** szorzatban, ha  $g(i) = j$ .

A **sárga** és **kék** szorzatok tényezői ugyanazok. Ezért

$$i = f(j) \iff g(i) = j. \text{ Ez azt jelenti, hogy } g = f^{-1}.$$

Tehát a  $\det(M^T)$ -ban szereplő,  $f \in S_n$ -hez tartozó tag megegyezik

a  $\det(M)$ -beli  $g = f^{-1} \in S_n$ -hez tartozó taggal.

Mivel  $\text{sg}(f^{-1}) = \text{sg}(f)$ , ezért a két tag előjele is ugyanaz.

# A transzponált determinánása (F1.3.6. Tétel)

$$M = ((a_{ij})) \implies \det(M) = \sum_{g \in S_n} \text{sg}(g) a_{1g(1)} a_{2g(2)} \cdots a_{ng(n)}.$$

$$M^T = ((b_{ij})) \implies \det(M^T) = \sum_{f \in S_n} \text{sg}(f) b_{1f(1)} b_{2f(2)} \cdots b_{nf(n)}.$$

Transzponálásnál az indexeket meg kell cserélni:  $b_{ji} = a_{ij}$ .

$$b_{1f(1)} b_{2f(2)} \cdots b_{nf(n)} = a_{f(1)1} a_{f(2)2} \cdots a_{f(n)n}.$$

Rakjuk sorba az első index szerint e szorzat tényezőit:

$$a_{f(1)1} a_{f(2)2} \cdots a_{f(n)n} = a_{1g(1)} a_{2g(2)} \cdots a_{ng(n)}.$$

A  $b_{ji} = a_{ij}$  akkor szerepel a **sárga** szorzatban, ha  $i = f(j)$ .

Az  $a_{ij}$  akkor szerepel a **kék** szorzatban, ha  $g(i) = j$ .

A **sárga** és **kék** szorzatok tényezői ugyanazok. Ezért

$$i = f(j) \iff g(i) = j. \text{ Ez azt jelenti, hogy } g = f^{-1}.$$

Tehát a  $\det(M^T)$ -ban szereplő,  $f \in S_n$ -hez tartozó tag megegyezik a  $\det(M)$ -beli  $g = f^{-1} \in S_n$ -hez tartozó taggal.

Mivel  $\text{sg}(f^{-1}) = \text{sg}(f)$ , ezért a két tag előjele is ugyanaz.

Az  $f \leftrightarrow f^{-1}$  kölcsönösen egyértelmű megfeleltetés  $S_n$ -en. □

# A tulajdonságok összefoglalása

Ma beláttuk:

Ha  $T = \mathbb{C}, \mathbb{R}, \mathbb{Q}$ , akkor  $T^{n \times n}$ -en értelmezett determinánsra igaz:

# A tulajdonságok összefoglalása

Ma beláttuk:

Ha  $T = \mathbb{C}, \mathbb{R}, \mathbb{Q}$ , akkor  $T^{n \times n}$ -en értelmezett determinánsra igaz:

(1) Minden oszlopában lineáris.

# A tulajdonságok összefoglalása

Ma beláttuk:

Ha  $T = \mathbb{C}, \mathbb{R}, \mathbb{Q}$ , akkor  $T^{n \times n}$ -en értelmezett determinánsra igaz:

- (1) Minden oszlopában lineáris.
- (2) Ha két oszlop egyenlő,

# A tulajdonságok összefoglalása

Ma beláttuk:

Ha  $T = \mathbb{C}, \mathbb{R}, \mathbb{Q}$ , akkor  $T^{n \times n}$ -en értelmezett determinánsra igaz:

- (1) Minden oszlopában lineáris.
- (2) Ha két oszlop egyenlő, akkor a determináns nulla.

# A tulajdonságok összefoglalása

## Ma beláttuk:

Ha  $T = \mathbb{C}, \mathbb{R}, \mathbb{Q}$ , akkor  $T^{n \times n}$ -en értelmezett determinánsra igaz:

- (1) Minden oszlopában lineáris.
- (2) Ha két oszlop egyenlő, akkor a determináns nulla.
- (3) Az egységmátrix determinánása  $1$ ,

# A tulajdonságok összefoglalása

## Ma beláttuk:

Ha  $T = \mathbb{C}, \mathbb{R}, \mathbb{Q}$ , akkor  $T^{n \times n}$ -en értelmezett determinánsra igaz:

- (1) Minden oszlopában lineáris.
- (2) Ha két oszlop egyenlő, akkor a determináns nulla.
- (3) Az egységmátrix determinánsa **1**, sőt felső háromszög-mátrix determinánsa a főátlóbeli elemek szorzata.



# A tulajdonságok összefoglalása

## Ma beláttuk:

Ha  $T = \mathbb{C}, \mathbb{R}, \mathbb{Q}$ , akkor  $T^{n \times n}$ -en értelmezett determinánsra igaz:

- (1) Minden oszlopában lineáris.
- (2) Ha két oszlop egyenlő, akkor a determináns nulla.
- (3) Az egységmátrix determinánsa **1**, sőt felső háromszög-mátrix determinánsa a főátlóbeli elemek szorzata.
- (6) Transzponált determinánsa ugyanaz, mint az eredetié

# A tulajdonságok összefoglalása

## Ma beláttuk:

Ha  $T = \mathbb{C}, \mathbb{R}, \mathbb{Q}$ , akkor  $T^{n \times n}$ -en értelmezett determinánsra igaz:

- (1) Minden oszlopában lineáris.
- (2) Ha két oszlop egyenlő, akkor a determináns nulla.
- (3) Az egységmátrix determinánsa **1**, sőt felső háromszög-mátrix determinánsa a főátlóbeli elemek szorzata.
- (6) Transzponált determinánsa ugyanaz, mint az eredetié (így az oszlopokra kimondott tulajdonságok sorokra is igazak).

# A tulajdonságok összefoglalása

## Ma beláttuk:

Ha  $T = \mathbb{C}, \mathbb{R}, \mathbb{Q}$ , akkor  $T^{n \times n}$ -en értelmezett determinánsra igaz:

- (1) Minden oszlopában lineáris.
- (2) Ha két oszlop egyenlő, akkor a determináns nulla.
- (3) Az egységmátrix determinánsa **1**, sőt felső háromszög-mátrix determinánsa a főátlóbeli elemek szorzata.
- (6) Transzponált determinánsa ugyanaz, mint az eredetié (így az oszlopokra kimondott tulajdonságok sorokra is igazak).

## Állítás

Az (1) és (2) tulajdonságok, valamint az, hogy az egységmátrix determinánsa **1**, a determináns értékét **egyértelműen meghatározzák**.

# A tulajdonságok összefoglalása

## Ma beláttuk:

Ha  $T = \mathbb{C}, \mathbb{R}, \mathbb{Q}$ , akkor  $T^{n \times n}$ -en értelmezett determinánsra igaz:

- (1) Minden oszlopában lineáris.
- (2) Ha két oszlop egyenlő, akkor a determináns nulla.
- (3) Az egységmátrix determinánsa **1**, sőt felső háromszög-mátrix determinánsa a főátlóbeli elemek szorzata.
- (6) Transzponált determinánsa ugyanaz, mint az eredetié (így az oszlopokra kimondott tulajdonságok sorokra is igazak).

## Állítás

Az (1) és (2) tulajdonságok, valamint az, hogy az egységmátrix determinánsa **1**, a determináns értékét **egyértelműen meghatározzák**. **Biz:** Gauss-elimináció.

# A többi tulajdonság

Ha  $T = \mathbb{C}, \mathbb{R}, \mathbb{Q}$ , akkor a  $T^{n \times n}$ -en értelmezett determinánsra igaz:

## A többi tulajdonság

Ha  $T = \mathbb{C}, \mathbb{R}, \mathbb{Q}$ , akkor a  $T^{n \times n}$ -en értelmezett determinánsra igaz:

(4) Ha az egyik oszlophoz egy másik oszlop skalárszorosát adjuk,

## A többi tulajdonság

Ha  $T = \mathbb{C}, \mathbb{R}, \mathbb{Q}$ , akkor a  $T^{n \times n}$ -en értelmezett determinánsra igaz:

- (4) Ha az egyik oszlophoz egy másik oszlop skalárszorosát adjuk, akkor a determináns nem változik.

## A többi tulajdonság

Ha  $T = \mathbb{C}, \mathbb{R}, \mathbb{Q}$ , akkor a  $T^{n \times n}$ -en értelmezett determinánsra igaz:

- (4) Ha az egyik oszlophoz egy másik oszlop skalárszorosát adjuk, akkor a determináns nem változik.
- (5) Bármely két oszlop cseréjekor előjelet vált.



## A többi tulajdonság

Ha  $T = \mathbb{C}, \mathbb{R}, \mathbb{Q}$ , akkor a  $T^{n \times n}$ -en értelmezett determinánsra igaz:

- (4) Ha az egyik oszlophoz egy másik oszlop skalárszorosát adjuk, akkor a determináns nem változik.
- (5) Bármely két oszlop cseréjekor előjelet vált.
- (7)  $\det(MN) = \det(M)\det(N)$  bármely két mátrixra.

## A többi tulajdonság

Ha  $T = \mathbb{C}, \mathbb{R}, \mathbb{Q}$ , akkor a  $T^{n \times n}$ -en értelmezett determinánsra igaz:

- (4) Ha az egyik oszlophoz egy másik oszlop skalárszorosát adjuk, akkor a determináns nem változik.
- (5) Bármely két oszlop cseréjekor előjelet vált.
- (7)  $\det(MN) = \det(M)\det(N)$  bármely két mátrixra.
- (8) Egy mátrix akkor invertálható,

## A többi tulajdonság

Ha  $T = \mathbb{C}, \mathbb{R}, \mathbb{Q}$ , akkor a  $T^{n \times n}$ -en értelmezett determinánsra igaz:

- (4) Ha az egyik oszlophoz egy másik oszlop skalárszorosát adjuk, akkor a determináns nem változik.
- (5) Bármely két oszlop cseréjekor előjelet vált.
- (7)  $\det(MN) = \det(M)\det(N)$  bármely két mátrixra.
- (8) Egy mátrix akkor invertálható, ha determinánsa nem nulla.

## A többi tulajdonság

Ha  $T = \mathbb{C}, \mathbb{R}, \mathbb{Q}$ , akkor a  $T^{n \times n}$ -en értelmezett determinánsra igaz:

- (4) Ha az egyik oszlophoz egy másik oszlop skalárszorosát adjuk, akkor a determináns nem változik.
- (5) Bármely két oszlop cseréjekor előjelet vált.
- (7)  $\det(MN) = \det(M)\det(N)$  bármely két mátrixra.
- (8) Egy mátrix akkor invertálható, ha determinánsa nem nulla.

### Múltkor láttuk:

Az (1) és (2) tulajdonságból a (4) és az (5) **oszlopvektorokkal** való egyszerű számolás.

# A többi tulajdonság

Ha  $T = \mathbb{C}, \mathbb{R}, \mathbb{Q}$ , akkor a  $T^{n \times n}$ -en értelmezett determinánsra igaz:

- (4) Ha az egyik oszlophoz egy másik oszlop skalárszorosát adjuk, akkor a determináns nem változik.
- (5) Bármely két oszlop cseréjekor előjelet vált.
- (7)  $\det(MN) = \det(M)\det(N)$  bármely két mátrixra.
- (8) Egy mátrix akkor invertálható, ha determinánsa nem nulla.

## Múltkor láttuk:

Az (1) és (2) tulajdonságból a (4) és az (5) **oszlopvektorokkal** való egyszerű számolás.

A (8) az **inverz aldeteminánsos képletéből** következik.

## A többi tulajdonság

Ha  $T = \mathbb{C}, \mathbb{R}, \mathbb{Q}$ , akkor a  $T^{n \times n}$ -en értelmezett determinánsra igaz:

- (4) Ha az egyik oszlophoz egy másik oszlop skalárszorosát adjuk, akkor a determináns nem változik.
- (5) Bármely két oszlop cseréjekor előjelet vált.
- (7)  $\det(MN) = \det(M)\det(N)$  bármely két mátrixra.
- (8) Egy mátrix akkor invertálható, ha determinánsa nem nulla.

### Múltkor láttuk:

Az (1) és (2) tulajdonságból a (4) és az (5) **oszlopvektorokkal** való egyszerű számolás.

A (8) az **inverz aldeterminánsos képletéből** következik.

A (7) szorzattartási tulajdonságot jövőre igazoljuk.

# A 7. előadáshoz tartozó vizsgaanyag

Fogalmak (K4.2. szakasz, F1. fejezet)

Permutáció,

## A 7. előadáshoz tartozó vizsgaanyag

Fogalmak (K4.2. szakasz, F1. fejezet)

Permutáció, kompozíció,



## A 7. előadáshoz tartozó vizsgaanyag

Fogalmak (K4.2. szakasz, F1. fejezet)

Permutáció, kompozíció, transzpozíció.

## A 7. előadáshoz tartozó vizsgaanyag

### Fogalmak (K4.2. szakasz, F1. fejezet)

Permutáció, kompozíció, transzpozíció.

Inverzió,

## A 7. előadáshoz tartozó vizsgaanyag

### Fogalmak (K4.2. szakasz, F1. fejezet)

Permutáció, kompozíció, transzpozíció.

Inverzió, permutáció előjele.

## A 7. előadáshoz tartozó vizsgaanyag

### Fogalmak (K4.2. szakasz, F1. fejezet)

Permutáció, kompozíció, transzpozíció.

Inverzió, permutáció előjele.

A determináns definíciója.

## A 7. előadáshoz tartozó vizsgaanyag

### Fogalmak (K4.2. szakasz, F1. fejezet)

Permutáció, kompozíció, transzpozíció.

Inverzió, permutáció előjele.

A determináns definíciója.

### Tételek (K4.2. szakasz, F1. fejezet)

Minden permutáció transzpozíciók szorzata.

## A 7. előadáshoz tartozó vizsgaanyag

### Fogalmak (K4.2. szakasz, F1. fejezet)

Permutáció, kompozíció, transzpozíció.

Inverzió, permutáció előjele.

A determináns definíciója.

### Tételek (K4.2. szakasz, F1. fejezet)

Minden permutáció transzpozíciók szorzata.

A permutációk szorzástétele.

## A 7. előadáshoz tartozó vizsgaanyag

### Fogalmak (K4.2. szakasz, F1. fejezet)

Permutáció, kompozíció, transzpozíció.

Inverzió, permutáció előjele.

A determináns definíciója.

### Tételek (K4.2. szakasz, F1. fejezet)

Minden permutáció transzpozíciók szorzata.

A permutációk szorzástétele. Az inverz permutáció előjele.

## A 7. előadáshoz tartozó vizsgaanyag

### Fogalmak (K4.2. szakasz, F1. fejezet)

Permutáció, kompozíció, transzpozíció.

Inverzió, permutáció előjele.

A determináns definíciója.

### Tételek (K4.2. szakasz, F1. fejezet)

Minden permutáció transzpozíciók szorzata.

A permutációk szorzástétele. Az inverz permutáció előjele.

Transzpozíció előjele.



## A 7. előadáshoz tartozó vizsgaanyag

### Fogalmak (K4.2. szakasz, F1. fejezet)

Permutáció, kompozíció, transzpozíció.

Inverzió, permutáció előjele.

A determináns definíciója.

### Tételek (K4.2. szakasz, F1. fejezet)

Minden permutáció transzpozíciók szorzata.

A permutációk szorzástétele. Az inverz permutáció előjele.

Transzpozíció előjele. A páros permutációk száma.

## A 7. előadáshoz tartozó vizsgaanyag

### Fogalmak (K4.2. szakasz, F1. fejezet)

Permutáció, kompozíció, transzpozíció.

Inverzió, permutáció előjele.

A determináns definíciója.

### Tételek (K4.2. szakasz, F1. fejezet)

Minden permutáció transzpozíciók szorzata.

A permutációk szorzástétele. Az inverz permutáció előjele.

Transzpozíció előjele. A páros permutációk száma.

A transzponált determináns definíciójában szereplő tagok az inverz permutációhoz tartoznak.

## A 7. előadáshoz tartozó vizsgaanyag

### Fogalmak (K4.2. szakasz, F1. fejezet)

Permutáció, kompozíció, transzpozíció.

Inverzió, permutáció előjele.

A determináns definíciója.

### Tételek (K4.2. szakasz, F1. fejezet)

Minden permutáció transzpozíciók szorzata.

A permutációk szorzástétele. Az inverz permutáció előjele.

Transzpozíció előjele. A páros permutációk száma.

A transzponált determináns definíciójában szereplő tagok az inverz permutációhoz tartoznak.

(Több most bizonyított tétel kimondása a múltkor szerepelt.

## A 7. előadáshoz tartozó vizsgaanyag

### Fogalmak (K4.2. szakasz, F1. fejezet)

Permutáció, kompozíció, transzpozíció.

Inverzió, permutáció előjele.

A determináns definíciója.

### Tételek (K4.2. szakasz, F1. fejezet)

Minden permutáció transzpozíciók szorzata.

A permutációk szorzástétele. Az inverz permutáció előjele.

Transzpozíció előjele. A páros permutációk száma.

A transzponált determináns definíciójában szereplő tagok az inverz permutációhoz tartoznak.

(Több most bizonyított tétel kimondása a múltkor szerepelt. Ezeket a bizonyításokat csak a vizsgán kérjük majd számon.)