

# 1. Bevezetés

## A félév anyaga: lineáris algebra

- Vektorterek, alterek
- Függés, függetlenség, bázis, dimenzió
- Skaláris szorzat  $\mathbb{R}^n$ -ben, vektorok hossza és szöge
- Lineáris leképezések, mátrixuk, bázistranszformáció
- Képtér, magtér, dimenziótétel, rang, invertálhatóság
- Sajátérték, karakterisztikus polinom, diagonalizálás
- Minimálpolinom, invariáns alterek, Jordan normálalak
- Euklideszi terek: merőlegesség és skaláris szorzat
- Egybevágósági transzformációk valós és komplex fölött
- Diagonalizálhatóság ortonormált bázisban
- Kvadratikus alak négyzetösszeg alakja

Tankönyv: *Freud Róbert: Lineáris algebra.*

Konzultáció: [ewwkiss@gmail.com](mailto:ewwkiss@gmail.com)

## A gyakorlati jegy

[www.cs.elte.hu/~ewkiss/bboard/12t.n/bev\\_bsc\\_2012I.html](http://www.cs.elte.hu/~ewkiss/bboard/12t.n/bev_bsc_2012I.html)

- A gyakorlat célja az elméleti anyag *megértése*.
  - Módja: önálló feladatmegoldás. Feladatsorok:
  - [www.cs.elte.hu/~ewkiss/bboard/12t.n/gyak.html](http://www.cs.elte.hu/~ewkiss/bboard/12t.n/gyak.html)
  - A begyakorlás otthonra való:
  - gyakorló feladatok Freud Róbert könyvében.
- Csak három hiányzás megengedett.
- Minden gyakorlaton röpdolgozat:
  - az *előző heti* előadás tételeiből, definícióiból
  - (ehhez minden prezentáció legvégén összefoglaló);
  - 7 pontot kell elérni, különben a gyakorlati jegy elégtelen;
  - az első héten és a ZH-k hetében nincs röpdolgozat.
- Két évfolyamzárthelyi:
  - az elégtelen zárthelyiket ki kell javítani;
  - javító a félév végén, a gyakorlatvezető döntése alapján.
  - Ha nem sikerül: gyakorlati jegy utóvizsga.

## A vizsga

- Ez a prezentáció definiálja a vizsgaanyagot.
  - Nyomtatható változat is letölthető. Ezért
  - az előadáson figyelni érdemes, **nem jegyzetelni!**
  - A letöltés helye: [www.cs.elte.hu/~ewkiss/bboard/12t.n/tem.html](http://www.cs.elte.hu/~ewkiss/bboard/12t.n/tem.html)
  - Ez a weblap egyben a vizsgatematika is.
  - Minden prezentáció végén összefoglaló a röpzéhákhoz.
- A vizsgajegy:
  - Csak érvényes gyakorlati jeggyel lehet vizsgázni.
  - Írásbeli vizsga, az anyag megértését is méri. Három részből áll:
    - \* beugró a röpzéhák anyagából;
    - \* megértés-ellenőrző;
    - \* bizonyítás (a tételek listája az utolsó prezentáció végén).
  - Összesen három alkalom és egy UV.
  - A forma, pontozás ugyanaz, mint az előző félévben. Minták: [www.cs.elte.hu/~ewkiss/bboard/11o.n/tem.html](http://www.cs.elte.hu/~ewkiss/bboard/11o.n/tem.html)

## 2. Vektortér

### Oszlopvektorok (ismétlés)

#### Definíció

Legyen  $T$  test. A  $T$  fölötti  $n$  magasságú *oszlopvektorok* az

$$\begin{bmatrix} a_1 \\ \dots \\ a_n \end{bmatrix}$$

alakú mátrixok, ahol  $a_1, \dots, a_n \in T$ . Ezek halmaza  $T^n$ .

#### Definíció

Legyen  $T$  test, és értelmezzük  $T^n$ -en az

$$\begin{bmatrix} a_1 \\ \dots \\ a_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b_1 \\ \dots \\ b_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 + b_1 \\ \dots \\ a_n + b_n \end{bmatrix} \text{ és } \lambda \begin{bmatrix} a_1 \\ \dots \\ a_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda a_1 \\ \dots \\ \lambda a_n \end{bmatrix}$$

képletekkel az *összeadást* és a  $\lambda$  *skalárral szorzást* ( $\lambda \in T$ ). Azaz összeadni és skalárral szorozni *komponensenként* kell.

### Az összeadás tulajdonságai

#### Tétel (HF ellenőrizni)

Tetszőleges  $u, v, w \in T^n$  vektorokra

(1)  $(u + v) + w = u + (v + w)$  (az összeadás *asszociatív*).

(2)  $u + v = v + u$  (az összeadás *kommutatív*).

(3)  $u + 0 = 0 + u = u$  (0 a *nullvektor*).

(4)  $u + (-u) = (-u) + u = 0$  ( $-u$  az  $u$  *ellentettje*).

A *nullvektor*  $0 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dots \\ 0 \end{bmatrix}$  és az *ellentett*:  $-\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \dots \\ a_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -a_1 \\ -a_2 \\ \dots \\ -a_n \end{bmatrix}$   
(minden komponens  $T$  nulleleme) (komponensenkénti ellentett)

### A skalárral szorzás tulajdonságai

#### Tétel (HF ellenőrizni)

Tetszőleges  $u, v \in T^n$  vektorokra, és  $\lambda, \mu$  skalárokra

(5)  $(\lambda + \mu)u = \lambda u + \mu u$ .

(6)  $\lambda(u + v) = \lambda u + \lambda v$ .

(7)  $(\lambda\mu)u = \lambda(\mu u)$ .

(8)  $1 \cdot u = u$  (ahol 1 a  $T$  test *egységeleme*).

További példák ilyen tulajdonságú műveletekre.

- A  $T^{n \times m}$ -beli mátrixok.
- $T[x]$  polinomjai:  $\lambda(a_0x + \dots + a_nx^n) = (\lambda a_0) + \dots + (\lambda a_n)x^n$ .
- Valós függvények (a *pontonkénti* műveletekre):  
 $(f + g)(x) = f(x) + g(x)$  és  $(\lambda f)(x) = \lambda(f(x))$ .

## A vektortér fogalma

### Definíció (F4.1.1. Definíció)

$T$  test (elemei a *skalárok*),  $V$  halmaz (elemei a *vektorok*).  $V$  vektortér  $T$  fölött, ha értelmezett a  $V$ -beli  $+$  összeadás, továbbá a skalárral szorzás (skalárszor vektor = vektor) úgy, hogy tetszőleges  $u, v, w \in V$  és  $\lambda, \mu \in T$  esetén

- (1)  $(u + v) + w = u + (v + w)$  (az összeadás *asszociatív*).
- (2)  $u + v = v + u$  (az összeadás *kommutatív*).
- (3)  $u + 0 = 0 + u = u$  (*LÉTEZIK*  $0$  *nullvektor*).
- (4)  $u + (-u) = (-u) + u = 0$  (*LÉTEZIK*  $-u$ , az  $u$  *ellentettje*).
- (5)  $(\lambda + \mu)u = \lambda u + \mu u$ .
- (6)  $\lambda(u + v) = \lambda u + \lambda v$ .
- (7)  $(\lambda\mu)u = \lambda(\mu u)$ .
- (8)  $1 \cdot u = u$  (ahol  $1$  a  $T$  test *egységeleme*).

## A sík és a tér vektorai

### Ismétlés

A vektorok irányított szakaszok, de két vektor *egyenlő*, ha párhuzamosak, egyenlő hosszúak és irányúak. Így minden vektor kezdőpontja az  $O$  origóba tolható. Az  $A$  pont és az  $\vec{OA}$  vektor közötti megfeleltetés kölcsönösen egyértelmű. Az  $\vec{OA}$  az  $A$  pont *helyvektora*. Ha  $A = (a, b, c)$ , akkor  $\vec{OA}$  jele is  $(a, b, c)$ . Tehát  $(a, b, c)$  nemcsak egy pont a térben, hanem térvektor is.

A térvektorok az összeadásra (paralelogrammaszabály) és a skalárral szorzásra vektorteret alkotnak (**HF**). A helyvektoroknál ezek a műveletek a komponensenkénti műveleteknek felelnek meg. Ezért a térvektorok vektortere „ugyanolyan”, mint az oszlopvektorok  $\mathbb{R}^3$  vektortere.

### Elemi következmények

#### Tétel (F4.1.2. Tétel)

Legyen  $V$  vektortér a  $T$  test fölött,  $\lambda \in T$ ,  $v \in V$ .

- (1) A  $V$  nulleleme egyértelműen meghatározott.
- (2) Minden vektor ellentettje egyértelműen meghatározott.
- (3) Minden  $v$  vektorra  $0v = 0$  (itt  $0$  skalár is, vektor is).
- (4) Minden  $\lambda$  skalárra  $\lambda 0 = 0$  (itt  $0$  a nullvektor).
- (5) Ha  $\lambda v = 0$ , akkor  $\lambda = 0$  vagy  $v = 0$ .
- (6) Minden  $v$  vektorra  $(-1)v = -v$  (a  $v$  ellentettje).

#### Mintabizonyítás (5)-re

Ha  $\lambda v = 0$ , de  $\lambda \neq 0$ , akkor létezik  $\lambda^{-1}$ .

Így  $0 = \lambda^{-1}0 = \lambda^{-1}(\lambda v) = (\lambda^{-1}\lambda)v = 1v = v$ . □

A fenti (4) miatt.

A (7) vektortéraxióma miatt.

A (8) vektortéraxióma miatt.

## 3. Altér, generátorrendszer

### Az altér fogalma

#### Definíció (F4.2.1. Definíció)

Legyen  $V$  vektortér a  $T$  test fölött. A  $W \subseteq V$  részhalmaz *altér*, ha maga is vektortér  $V$  műveleteire nézve.

#### Példák

- (1)  $V$  a sík vektorai  $\mathbb{R}$  fölött.  $W$  az  $x$ -tengellyel párhuzamos vektorok.  
Azaz  $W$  az  $x$ -tengely (a megfelelő helyvektorok végpontjai).
- (2)  $V = \mathbb{Q}[x]$  a  $\mathbb{Q}$  fölött.  $W$  azok a polinomok, amelyeknek az 1 gyöke.
- (3)  $V$  a valós függvények  $\mathbb{R}$  fölött.  $W$  a folytonos függvények.
- (4)  $V$  a kétszer kettős komplex mátrixok  $\mathbb{C}$  fölött.  
 $W$  a felső háromszögmátrixok.

### Az altér jellemzése

#### Tétel (F4.2.2. Tétel, HF)

Legyen  $V$  vektortér a  $T$  test fölött. A  $W \subseteq V$  nem üres részhalmaz akkor és csak akkor altér, ha

- (1)  $W$  zárt az összeadásra, azaz tetszőleges  $w_1, w_2 \in W$  esetén  $w_1 + w_2 \in W$ .
- (2)  $W$  zárt a skalárral szorzásra, azaz tetszőleges  $\lambda \in T$  és  $w \in W$  esetén  $\lambda w \in W$ .

Segítség:  $0 = 0v$ , és az ellentett  $-v = (-1)v$ .

F4.2.15. és F4.2.12. Feladat, HF:

- (1) Altér nulleleme ugyanaz, mint az eredeti vektortéré.
- (2) Alterek metszete is altér.
- (3) Két altér uniója *csak akkor* altér, ha valamelyikük tartalmazza a másikat.

### Altér készítése

#### Kérdés

Adott egy  $v$  vektor a síkon. Mely vektorokat kell hozzávennünk (minél kevesebbet), hogy alteret kapjunk?

A  $v$  skalárszorosait (azaz a  $\lambda v$  vektorokat) be kell venni. Ez elég, mert ezek halmaza zárt mindkét műveletre.

Ezek pont a  $v$ -vel párhuzamos vektorok. A megfelelő helyvektorok végpontjai egy origón átmenő egyenest alkotnak.

Adottak az  $x$  és  $x^2$  polinomok  $\mathbb{R}[x]$ -ben. Mely polinomokat kell hozzávennünk (minél kevesebbet), hogy alteret kapjunk?

Az  $ax + bx^2$  alakú polinomok már alteret alkotnak ( $a, b \in \mathbb{R}$ ).

### Generált altér

#### Tétel (F4.3.4. Tétel)

Legyen  $V$  vektortér a  $T$  test fölött és  $v_1, v_2, \dots, v_m \in V$ .

Ekkor a  $\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \dots + \lambda_m v_m$  alakú vektorok, ahol  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m \in T$ , alteret alkotnak  $V$ -ben. Ez a  $v_1, v_2, \dots, v_m \in V$  által *generált altér*, jele  $\langle v_1, v_2, \dots, v_m \rangle$ .

#### Elnevezések

A  $v_1, \dots, v_m$  vektorok neve: *generátorok*.

$\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \dots + \lambda_m v_m$  a  $v_1, \dots, v_m$  egy *lineáris kombinációja*.

A  $\lambda_1, \dots, \lambda_m$  ennek a lineáris kombinációnak az *együtthatói*.

A  $v_1, \dots, v_m$  *generátorrendszer* a  $V$  vektortérben, ha  $\langle v_1, v_2, \dots, v_m \rangle = V$ .

A *generált altér* a *generátorok lineáris kombinációinak halmaza*.

Egy vektortérnek általában sok generátorrendszere van!

### Példák generátorrendszerre

Legyen  $V$  a legfeljebb elsőfokú polinomok vektortere  $\mathbb{R}$  fölött.

Ebben  $\{1, x\}$  generátorrendszer, mert  $\lambda \cdot 1 + \mu \cdot x$  alakban pontosan ezeket a polinomokat kapjuk ( $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ ). De generátorrendszer  $\{1 + x, x\}$  is, mert

$$ax + b = b(1 + x) + (a - b)x,$$

vagyis  $\lambda(1 + x) + \mu x$  alakban  $V$  minden eleme megkapható.

Egy altér generátorrendszerének elemei az altérben vannak! Például  $\{1, x, x^2\}$  *nem* generátorrendszer a fenti  $V$ -ben, noha  $V$  elemei felírhatók ezek lineáris kombinációjaként.

### Házi feladat (fizikából tudjuk)

Ha  $v$  és  $w$  nem párhuzamos síkvektorok, akkor generátorrendszert alkotnak a sík vektorainak vektorterében.

### A tétel bizonyítása

#### F4.3.4. Tétel: kiegészítés

$\langle v_1, \dots, v_m \rangle$  a *legsűkebb*  $v_1, \dots, v_m$ -et tartalmazó altér.

Azaz ha  $W$  altér és  $v_1, \dots, v_m \in W$ , akkor  $\langle v_1, \dots, v_m \rangle \subseteq W$ .

#### Bizonyítás

Legyen  $V$  vektortér a  $T$  test fölött és  $v_1, v_2, \dots, v_m \in V$ .

$U = \langle v_1, \dots, v_m \rangle$  nem üres, mert  $0 = 0v_1 + \dots + 0v_m \in U$ .

Ha  $u = \lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_m v_m \in U$  és  $\lambda \in T$ , akkor  $\lambda u \in U$ , mert

$\lambda u = (\lambda \lambda_1) v_1 + \dots + (\lambda \lambda_m) v_m$ . Így  $U$  skalárral szorzásra zárt.

Az összegre zárttság bizonyítása hasonló, HF.

Ha  $v_1, \dots, v_m \in W$ , akkor  $\lambda_1 v_1, \lambda_2 v_2, \dots, \lambda_m v_m \in W$ , mert  $W$  zárt a skalárral szorzásra. Ezért  $\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \dots + \lambda_m v_m \in W$ , mert  $W$  zárt az összeadásra.

Így  $\langle v_1, \dots, v_m \rangle$  minden eleme  $W$ -ben van.  $\square$

### Lineáris függetlenség

#### Ismétlés (Freud, 4.4. szakasz)

Legyen  $V$  vektortér a  $T$  test fölött és  $v_1, \dots, v_m \in V$ . Ezek a vektorok *lineárisan függetlenek*, ha tetszőleges  $\lambda_1, \dots, \lambda_m \in T$  skalárookra  $\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_m v_m = 0$  CSAK *ÚGY* teljesülhet, ha  $\lambda_1 = \dots = \lambda_m = 0$ .

#### Elnevezés

*Triviális* lineáris kombináció: minden együttható nulla. Vagyis  $v_1, \dots, v_m$  akkor és csak akkor lineárisan független, ha CSAK a triviális lineáris kombinációjuk nulla.

Például  $1, x, x^2$  lineárisan független  $\mathbb{R}[x]$ -ben  $\mathbb{R}$  fölött, mert ha  $a \cdot 1 + b \cdot x + c \cdot x^2 = 0$  (a nullapolinom), akkor minden együttható nulla, azaz  $a = b = c = 0$ .

## 4. Bázis

### A bázis fogalma

#### Definíció (F4.5.1. Definíció)

Egy vektorrendszer *bázis*, ha lineárisan független és generátorrendszer.

#### Tétel (F4.5.2. Tétel)

Legyen  $V$  vektortér a  $T$  test fölött és  $b_1, \dots, b_n \in V$ .

Ez pontosan akkor bázis  $V$ -ben, ha  $V$  minden eleme *egyértelműen felírható* a  $b_1, \dots, b_n$  lineáris kombinációjaként.

#### Példa

$\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$  és  $\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$  bázis  $\mathbb{R}^2$ -ben  $\mathbb{R}$  fölött, mert  $\begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \lambda \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \mu \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$  akkor és csak akkor, ha  $\lambda = a$  és  $\mu = b$  (azaz egyértelmű is).

#### Példák bázisra

$\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$  és  $\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$  is bázis  $\mathbb{R}^2$ -ben  $\mathbb{R}$  fölött, mert  $\begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \lambda \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} + \mu \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

akkor és csak akkor, ha  $a = \lambda$  és  $b = \lambda + \mu$ , azaz ha  $\lambda = a$  és  $\mu = b - a$  (egyértelmű megoldás  $\lambda$ -ra és  $\mu$ -re).

Legyen  $V$  a legfeljebb másodfokú polinomok vektortere  $\mathbb{R}$  fölött.

Ebben  $\{1, x, x^2\}$  bázis, mert minden  $V$ -beli polinom egyértelműen felírható  $\alpha \cdot 1 + \beta \cdot x + \gamma \cdot x^2$  alakban ( $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$ ).

$\{1 + x, 1 + x^2, x^2\}$  is bázis  $V$ -ben. Valóban:

$ax^2 + bx + c = \alpha(1 + x) + \beta(1 + x^2) + \gamma x^2 = (\alpha + \beta) + \alpha x + (\beta + \gamma)x^2$  pontosan akkor, ha  $a = \alpha + \beta$ ,  $b = \alpha$  és  $c = \beta + \gamma$ , azaz ha  $\alpha = b$ ,  $\beta = a - b$  és  $\gamma = c - a + b$ .  
*Lineáris egyenletrendszer az  $\alpha, \beta, \gamma$  ismeretlenekre.*



### Szokásos bázisok

Néhány fontos vektortérben az alábbi konkrét bázisokat sokszor használjuk. Ezeket *szokásos* bázisnak nevezzük.

A sorrend lényeges (koordinátázás legközelebb).

- (1) A síkon, mint  $\mathbb{R}$  feletti vektortéren az  $(1, 0)$ ,  $(0, 1)$  pontok.
- (2) A  $T$  test feletti  $T^n$  vektortérben azon  $e_1, \dots, e_n$  vektorok, melyekre  $e_i$ -nek az  $i$ -edik komponense 1, a többi nulla. Speciálisan  $T$ -ben, mint önmaga feletti vektortérben az 1.
- (3) A  $\mathbb{C}$ -ben, mint  $\mathbb{R}$  feletti vektortérben az 1 és az  $i$ .
- (4) A  $T^{m \times n}$  vektortérben azok a mátrixok, melyeknek egyetlen eleme 1, a többi nulla (ezeket a sorfolytonosság sorrendjében tekintjük).
- (5) A  $T[x]$  legfeljebb  $n$ -edfokú elemeiből álló vektortérben az  $(1, x, x^2, \dots, x^n)$  bázis.

### A bázis elemszáma

#### Tétel (F4.5.3. Tétel)

Minden vektortérben bármely két bázis elemszáma ugyanaz.

#### Definíció (F4.6.1. Definíció)

A  $V$  vektortér bázisainak közös elemszámát a tér *dimenziójának* nevezzük. Jele  $\dim V$  (vagy  $\dim_T V$ ).

- (1) A sík kétdimenziós  $\mathbb{R}$  fölött.
- (2)  $\dim_T T^n = n$ .
- (3)  $\dim_{\mathbb{R}} \mathbb{C} = 2$ .
- (4)  $\dim_T T^{m \times n} = mn$ .
- (5) A  $T[x]$  legfeljebb  $n$ -edfokú elemeiből álló vektortér  $n + 1$ -dimenziós  $T$  fölött.

## 5. Összefoglaló

**Az 1. előadáshoz tartozó vizsgaanyag**

### **Fogalmak**

A nyolc vektortéraxióma, nullelem, ellentett. A sík és a tér mint vektortér, helyvektorok. Altér, generált altér, generátorrendszer. Függetlenség, bázis, dimenzió.

### **Tételek**

Vektorterek elemi tulajdonságai (F4.1.2). Altér jellemzése zártsággal, altér null-eleme (F4.2.15. Feladat). A lineáris kombinációk alteret alkotnak, ez a legszűkebb, az adott elemeket tartalmazó altér. Bázis jellemzése a lineáris kombinációk egyértelműségével. Bármely két bázis elemszáma ugyanaz.