

1. Alterek direkt összege

Egyértelmű felírás összegként

Állítás (F4.3.6. Tétel)

Legyenek U és W alterek a V vektortérben.

Ekkor $U + W$ elemeinek $u + w$ ($u \in U$, $w \in W$) alakú fölírása akkor és csak akkor *egyértelmű*, ha $U \cap W = \{0\}$.

Bizonyítás

Tegyünk föl, hogy $U \cap W = \{0\}$. Ha $u_1 + w_1 = u_2 + w_2$, ahol $u_1, u_2 \in U$, $w_1, w_2 \in W$, akkor $u_1 - u_2 = w_2 - w_1$.

A bal oldal U -ban, a jobb oldal W -ben van. Tehát

$u_1 - u_2 = w_2 - w_1 \in U \cap W = \{0\}$, azaz $u_1 - u_2 = w_2 - w_1 = 0$.

Innen $u_1 = u_2$ és $w_1 = w_2$, tehát a fölírás egyértelmű.

Megfordítva, ha $0 \neq v \in U \cap W$, akkor $v = 0 + v = v + 0$ két különböző, megfelelő fölírás, így ez *nem egyértelmű*. \square

Direkt összeg

Definíció (F4.3.7. Definíció)

Legyenek U és W alterek a V vektortérben.

Ha az $U + W$ elemeinek $u + w$ ($u \in U$, $w \in W$) alakú fölírása *egyértelmű*, azaz ha $U \cap W = \{0\}$, akkor $U + W$ az U és W *direkt összege*, jele $U \oplus W$.

A sík bármely két különböző, origót tartalmazó egyenes direkt összege.

U egy sík a térben, ami az origót tartalmazza. W egy origón átmenő egyenes, ami nem része U -nak. Ekkor a tér $U \oplus W$.

U azon polinomok, melyekben minden tag foka páros. W azon polinomok, melyekben minden tag foka páratlan. Ekkor $T[x] = U \oplus W$.

A direkt összeg bázisa és dimenziója

Állítás

Tegyünk föl, hogy U, W alterek V -ben és $U \cap W = \{0\}$.

Ha b_1, \dots, b_n bázis U -ban és c_1, \dots, c_m bázis W -ben,

akkor $b_1, \dots, b_n, c_1, \dots, c_m$ bázis $U \oplus W$ -ben.

Következmény: $\dim(U \oplus W) = \dim U + \dim W$.

Bizonyítás

Generátorrendszer: Ha $u + w \in U + W$ (ahol $u \in U$, $w \in W$),

akkor $u = \lambda_1 b_1 + \dots + \lambda_n b_n$ és $w = \mu_1 c_1 + \dots + \mu_m c_m$, és így

$u + w = \lambda_1 b_1 + \dots + \lambda_n b_n + \mu_1 c_1 + \dots + \mu_m c_m$.

Független: Ha $\lambda_1 b_1 + \dots + \lambda_n b_n + \mu_1 c_1 + \dots + \mu_m c_m = 0$,

akkor $\lambda_1 b_1 + \dots + \lambda_n b_n = -(\mu_1 c_1 + \dots + \mu_m c_m) \in U \cap W = \{0\}$,

azaz $\lambda_1 b_1 + \dots + \lambda_n b_n = 0$ és $\mu_1 c_1 + \dots + \mu_m c_m = 0$.

Mivel b_1, \dots, b_n független, ezért $\lambda_1 = \dots = \lambda_n = 0$.

Mivel c_1, \dots, c_m független, ezért $\mu_1 = \dots = \mu_m = 0$. \square

Direkt kiegészítő altér

Definíció

Tegyük föl, hogy U, W altérek V -ben és $U \oplus W = V$. Ekkor W az U (egyik) *direkt kiegészítő altére*.

Állítás

Minden altérnek van direkt kiegészítő altére.

Bizonyítás a véges dimenziós esetben

Legyen U altér V -ben és b_1, \dots, b_n bázis U -ban.

Ezt egészítsük ki a c_1, \dots, c_m vektorokkal V egy bázisává.

Megtehető: minden független rendszer kiegészíthető bázissá.

Legyen $W = \langle c_1, \dots, c_m \rangle$. Ekkor $V = U \oplus W$.

A bizonyítás hasonló az előző tételéhez: HF. □

Ortogonalis kiegészítő altér

Definíció (F8.1.6. Definíció)

Legyen $H \subseteq V$. Ekkor H^\perp jelöli azon vektorok halmazát, amelyek *minden* H -beli vektorra merőlegesek. Ez altér (HF).

Ha H altér, akkor H^\perp a H *ortogonalis kiegészítő altére*.

Tétel (F8.1.7. Tétel)

Minden U altérre $V = U \oplus U^\perp$. Azaz V minden eleme egyértelműen felírható egy U -beli és egy U -ra merőleges vektor összegeként.

Bizonyítás

Nyilván $v \in U \cap U^\perp$ esetén $\langle v, v \rangle = 0$. Innen $v = 0$, tehát $U \cap U^\perp = \{0\}$.

Kell még: $U + U^\perp = V$.

Ortogonalis kiegészítő altér: bizonyítás

Bizonyítás (folytatás)

Legyen b_1, \dots, b_m ortonormált bázis U -ban.

Ha $v \in V$, akkor legyen $u = \langle b_1, v \rangle b_1 + \dots + \langle b_m, v \rangle b_m$. A Gram-Schmidt-eljárásban láttuk, hogy $w = v - u$ merőleges mindegyik b_j -re, és ezért az összes lineáris kombinációikra is. Így $w \in U^\perp$, és $u \in U$ miatt $v = u + w$ a kívánt felbontás. □

Az u -t a v vektor U -ra vett *merőleges vetületének* hívjuk.

Megjegyzés: Egészítsük ki b_1, \dots, b_m -et a Gram-Schmidt-eljárással

V egy b_1, \dots, b_n ortonormált bázisává.

Ekkor U^\perp a b_{m+1}, \dots, b_n által generált altér (HF).

F8.1.9. Feladat (HF)

$(U^\perp)^\perp = U$, $(U_1 \cap U_2)^\perp = U_1^\perp + U_2^\perp$, $(U_1 + U_2)^\perp = U_1^\perp \cap U_2^\perp$.

2. Invariáns altér és blokkfelbontás

Invariáns altér

Definíció (F6.4.1. Definíció)

A $W \leq V$ altér az $A \in \text{Hom}(V)$ transzformációnak *invariáns altere*, ha minden $w \in W$ esetén $A(w) \in W$.

Azaz A nem tud W -ből vektort kivinni.

Állítás (F8.4.3. Tétel)

Ha a $W \leq V$ altér A -invariáns, akkor a W^\perp altér A^* -invariáns.

Bizonyítás

Legyen $v \in W^\perp$, be kell látni, hogy $A^*(v) \in W^\perp$. Ez azt jelenti, hogy $A^*(v)$ merőleges minden W -belire, azaz tetszőleges $w \in W$ -re $\langle w, A^*(v) \rangle = 0$. Ez igaz, mert $\langle w, A^*(v) \rangle = \langle A(w), v \rangle = 0$, hiszen $A(w) \in W$ és $v \in W^\perp$. \square

Mátrixok blokkfelbontása

Kiss: Bevezetés az algebrába, 7.6.1. Állítás (HF)

Legyen b_1, \dots, b_n bázis a V vektortérben, U a b_1, \dots, b_m és W a b_{m+1}, \dots, b_n által generált altér. Ekkor $V = U \oplus W$. Legyen $A \in \text{Hom}(V)$. Az U és W alterek pontosan akkor A -invariánsak, ha

$$[A]_{\mathbf{b}} = \begin{bmatrix} K & O_1 \\ O_2 & L \end{bmatrix},$$

ahol a K blokk $m \times m$ -es, az L blokk $(n-m) \times (n-m)$ -es, az O_1 és O_2 mátrixok pedig csupa nullából állnak.

Ilyenkor az A leképezés megszorítható U -ra,

és a megszorítás mátrixa a b_1, \dots, b_m bázisban K .

Hasonlóan A megszorítható W -re, és ennek mátrixa b_{m+1}, \dots, b_n -ben L .

Diagonális mátrix sajátalterei

Állítás

Legyen b_1, \dots, b_n bázis, melyben A mátrixa diagonális. Azaz mindegyik b_j sajátvektor: $A(b_j) = \lambda_j b_j$. Ekkor a $\lambda = \lambda_j$ -hez tartozó sajátalteret azok a b_k -k generálják, amelyekre $\lambda_k = \lambda$. Ha b_1, \dots, b_n ortonormált, akkor A sajátalterei páronként merőlegesek.

Bizonyítás

Legyen $v = \mu_1 b_1 + \dots + \mu_n b_n$. Ekkor

$$A(v) = \mu_1 A(b_1) + \dots + \mu_n A(b_n) = \mu_1 \lambda_1 b_1 + \dots + \mu_n \lambda_n b_n,$$

és $\lambda v = \mu_1 \lambda b_1 + \dots + \mu_n \lambda b_n$.

Tehát $A(v) = \lambda v$ akkor és csak akkor, ha $\mu_k = 0$ minden k -ra, melyre $\lambda_k \neq \lambda$.

Ha a bázis ortonormált, akkor a bázis két diszjunkt részhalmaza két merőleges alteret generál (HF). \square

3. Szép alak komplex felett

A fő eredmény

V komplex feletti véges dimenziós vektortér és $A \in \text{Hom}(V)$.

Emlékeztető: Az A normális transzformáció, ha $AA^* = A^*A$.

Tétel (F8.5.2. Tétel, F8.5.8. Feladat)

Az A pontosan akkor diagonalizálható ortonormált bázisban, ha normális.

Ekkor A sajátalterei páronként merőlegesek, és V ezeknek a direkt összege.

Ugyanezek A^* sajátalterei is, és a sajátértékek az A megfelelő sajátértékeinek konjugáltjai.

A triviális irány bizonyítása

Az A^* mátrixa az $[A]_{\mathcal{B}}$ transzponált konjugáltja. Ha $[A]_{\mathcal{B}}$ diagonális, akkor a transzponált konjugáltja is. Diagonális mátrixok felcserélhetők, így A és A^* is. Az előző Állítás miatt A sajátalterei páronként merőlegesek.

HF: Ha $[A]_{\mathcal{B}}$ diagonális, akkor A és A^* sajátalterei ugyanazok.

Az adjungált sajátvektorai

Lemma (a bizonyítás kulcsa)

Tegyük fel, hogy $AA^* = A^*A$ és $A(w) = \lambda w$. Ekkor $A^*(w) = \bar{\lambda}w$.

Bizonyítás

Belátjuk, hogy $\|A^*(w) - \bar{\lambda}w\| = 0$ (ekkor tehát $A^*(w) - \bar{\lambda}w = 0$.)

$$\begin{aligned} \|A^*(w) - \bar{\lambda}w\|^2 &= \langle A^*(w) - \bar{\lambda}w, A^*(w) - \bar{\lambda}w \rangle = \\ &= \langle A^*(w), A^*(w) \rangle - \bar{\lambda} \langle A^*(w), w \rangle - \lambda \langle w, A^*(w) \rangle + \lambda \bar{\lambda} \langle w, w \rangle. \end{aligned}$$

Az adjungált skaláris szorzattal való jellemzése miatt

$$\langle A^*(w), w \rangle = \langle w, A(w) \rangle = \langle w, \lambda w \rangle = \lambda \langle w, w \rangle \text{ és}$$

$$\langle w, A^*(w) \rangle = \langle A(w), w \rangle = \langle \lambda w, w \rangle = \bar{\lambda} \langle w, w \rangle.$$

Tudjuk, hogy $AA^* = A^*A$, ezért

$$\langle A^*(w), A^*(w) \rangle = \langle w, AA^*(w) \rangle = \langle w, A^*A(w) \rangle = \langle A(w), A(w) \rangle,$$

ami $\langle \lambda w, \lambda w \rangle = \lambda \bar{\lambda} \langle w, w \rangle$. Összevonva minden kiesik. □

Normális transzformációk sajátalterei

Következmény

Legyen W az A -nak a λ sajátértékhez tartozó sajátaltere. Ha $AA^* = A^*A$, akkor W az A^* -nak a $\bar{\lambda}$ -hoz tartozó sajátaltere.

Bizonyítás

Jelölje U az A^* transzformáció $\bar{\lambda}$ -hoz tartozó sajátalterét.

A Lemma miatt $W \subseteq U$. A lemmát A helyett A^* -ra

és λ helyett $\bar{\lambda}$ -ra alkalmazva kapjuk, hogy $U \subseteq W$. □

Házi feladat

Mutassuk meg, hogy ha A és B komplex fölötti lineáris transzformációk, és $AB = BA$, akkor A minden sajátaltérére B -invariáns, és ezért van közös sajátvektoruk.

A diagonalizálhatóság bizonyítása

Tegyük fel, hogy $AA^* = A^*A$. Indukcióval bizonyítunk $\dim(V)$ szerint.

1-dimenzióban igaz. Az algebra alaptétele miatt \mathbb{C} -ben van λ sajátértéke A -nak. Legyen W a hozzá tartozó sajátaltér (így $W \neq 0$). Az előbbi Következmény miatt W sajátaltérére A^* -nak is, ezért W egyszerre A -invariáns és A^* -invariáns. Emiatt W^\perp A^* -invariáns és $(A^*)^* = A$ -invariáns.

A és A^* a W^\perp altéren is adjungáltak és felcserélhetőek, mert a $\langle w_1, A^*(w_2) \rangle = \langle A(w_1), w_2 \rangle$ és $A(A^*(w)) = A^*(A(w))$ azonosságok a W^\perp altér vektoraira is öröklődnek.

Mivel $W \neq 0$, ezért $\dim(W^\perp) = \dim(V) - \dim(W) < \dim(V)$. Az indukciós feltevés miatt van W^\perp -ban b_{k+1}, \dots, b_n ONB, mely A sajátvektoraiból áll. Legyen b_1, \dots, b_k ONB W -ben. Ekkor b_1, \dots, b_n ONB V -ben, mert W ortogonális W^\perp -re, és $V = W \oplus W^\perp$. Ez a bázis A sajátvektoraiból áll. \square

Felső háromszögmátrix alak

Tétel (F8.5.15. Feladat)

Komplex fölött minden $A \in \text{Hom}(V)$ transzformáció mátrixa alkalmas *ortonormált* bázisban felső háromszögmátrix.

Bizonyításvázlat

Legyen b_n nem nulla sajátvektora A^* -nak.

Ekkor a b_n által generált altér A^* -invariáns, ezért a W ortogonális komplementere altérére $(A^*)^* = A$ -invariáns. Az indukciós feltevés miatt W -ben van egy b_1, \dots, b_{n-1} bázis, amelyben az A (W -re vett megszorításának) mátrixa felső háromszögmátrix. Ekkor b_1, \dots, b_n ortonormált rendszer, ezért független, így bázis V -ben. HF: ebben a bázisban A mátrixa felső háromszögmátrix.

4. Szép alak valós felett

A főtengetéltétel bizonyítása

Már láttuk, hogy ha A diagonalizálható, akkor szimmetrikus.

Megfordítva: tegyük föl, hogy A szimmetrikus, azaz $A^* = A$. Legyen \mathbf{b} ONB és $M = [A]_{\mathbf{b}}$, ekkor M szimmetrikus mátrix. Mivel M valós mátrix, ezért önadjungált. Bizonyítottuk korábban, hogy ilyenkor a komplex sajátértékek mind valósak. Tehát M karakterisztikus polinomjának gyökei valósak, és így A -nak is van egy λ *valós* sajátértéke. Ha v ehhez tartozó sajátvektor, és W az általa generált altér, akkor W A -invariáns, ezért W^\perp $A^* = A$ -invariáns. Ezért hasonló indukció működik, mint normális transzformációkra.

Megjegyzés: Mivel M normális, komplexben diagonalizálható.
 Minden sajátérték valós, ezért van hozzá valós sajátvektor is.
 Azt igazoltuk, hogy van „elegendő” ortonormált valós sajátvektor.
 HF: $A = A^*$, $Av = \lambda v$, $Aw = \mu w \implies \lambda = \mu$ vagy $v \perp w$.

A főtengeteltétel elnevezés magyarázata

Miért nevezzük az előbbi eredményt főtengeteltételnek?

Tekintsük az $x^2 + 2y^2 = 1$ egyenletű ellipszist a síkon. A két tengely a két koordinátatengely, így merőlegesek. A fenti egyenletet átírhatjuk skaláris szorzat segítségével.

$$\text{Legyen } v = \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} \text{ és } M = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}, \text{ ekkor } Mv = \begin{bmatrix} x \\ 2y \\ -1 \end{bmatrix},$$

és így $0 = x^2 + 2y^2 - 1 = \langle v, Mv \rangle$. A két tengelyirány éppen M két sajátvektorának felel meg. Hasonlóan felírhatunk minden másodfokú síkgörbét, és a tengelyeket a mátrix sajátvektoraiként kapjuk. Merőlegesek, mert a mátrixot szimmetrikusnak választhatjuk! Jobb az $x^2 + 2y^2 = z^2$ egyenletet nézni: ez egy kúp. Az ellipszist ebből a $z = 1$ sík metszi ki.

5. A tehetetlenségi tétel bizonyítása

A tehetetlenségi tétel

F7.2.6. Sylvester tehetetlenségi tétele

Legyen B valósban szimmetrikus, komplexben Hermite-féle bilineáris függvény. Bárhogy veszünk egy B -ortogonális bázist, az ebben felírt mátrix főátlójában szereplő pozitív, nulla és negatív elemek száma csak B -től függ, a bázistól nem.

Bizonyítás

Elég belátni, hogy a pozitív elemek száma nem függ a bázistól. Ezt ugyanis $-B$ -re alkalmazva kapjuk, hogy a negatív elemek száma sem függ a bázistól. A nullák számát a főátlóban pedig úgy kapjuk, hogy a pozitív és a negatív elemek számát kivonjuk a tér dimenziójából, tehát akkor a nullák száma sem függ a bázistól.

Lemma a tehetetlenségi tételhez

Lemma

Legyen v_1, \dots, v_k és w_1, \dots, w_ℓ két független, B -ortogonális vektorrendszer. Tegyük föl, hogy $B(v_i, v_i) > 0$ és $B(w_j, w_j) \leq 0$ minden i, j -re. Ekkor ezek a vektorok együtt is függetlenek.

Bizonyítás

Tegyük föl, hogy $\sum x_i v_i + \sum y_j w_j = 0$ (ahol x_i, y_j skalárok).

Legyen $v = \sum x_i v_i$ és $w = \sum y_j w_j$, ekkor $v = -w$. Innen

$$B(v, v) = \sum B(v_i, v_i) |x_i|^2 \geq 0$$

$$B(w, w) = \sum B(w_j, w_j) |y_j|^2 \leq 0.$$

De $B(v, v) = B(-w, -w) = B(w, w)$, így mindkét összeg nulla.

Mivel $B(v_i, v_i) > 0$, ez csak úgy lehet, ha $x_1 = \dots = x_k = 0$.

Ezért $\sum y_j w_j = 0$, így a függetlenség miatt minden $y_j = 0$. □

A tehetetlenségi tétel bizonyítása

Tegyük föl, hogy adott két B -ortogonális bázis. Legyen $n = \dim(V)$, továbbá M_1 és M_2 a B mátrixa az első, illetve a második bázisban. Jelölje k_1 , illetve k_2 rendre az M_1 , illetve M_2 főátlójában a pozitív elemek számát. Be kell látni, hogy $k_1 = k_2$.

Az M_i főátlójában nyilván $n - k_i$ nempozitív elem van. Legyenek v_1, \dots, v_{k_1} az első bázisból azok a vektorok, melyekre $B(v_i, v_i) > 0$ (ezek száma tehát k_1), továbbá w_1, \dots, w_{n-k_2} a második bázisból azok a vektorok, melyekre $B(w_j, w_j) \leq 0$ (ezek száma $n - k_2$).

A lemma miatt ezek együtt is függetlenek, így $k_1 + (n - k_2) \leq \dim(V) = n$, ahonnan $k_1 \leq k_2$. A két bázist megcserélve $k_2 \leq k_1$. □

6. Összefoglaló

A 9. előadáshoz tartozó vizsgaanyag

Fogalmak

Altérak direkt összege. Direkt és ortogonális kiegészítő altér. Invariáns altér.

Tételek

A direkt összeg jellemzése a felírás egyértelműségével. A direkt összeg bázisa és dimenziója. Direkt és ortogonális kiegészítő altér létezése. Ha W A -invariáns, akkor W^\perp A^* -invariáns. Invariáns altérak és mátrixok blokkfelbontása. Normális transzformáció sajátaltérrei.

7. A vizsgán kért bizonyítások listája

Vektorterek, lineáris leképezések

1. Független rendszer elemszáma kisebb vagy egyenlő, mint egy generátorrendszer elemszáma.
2. Valódi altér dimenziója.
3. A rang a maximális függetlenek elemszáma.
4. Az elérhetőségi tétel.
5. A bázistranszformáció képlete.
6. A dimenziótétel.
7. Az invertálhatóság jellemzői.
8. Különböző sajátértékhez tartozó sajátvektorok lineárisan függetlenek.
9. Minden sajátérték gyöke a minimálpolinomnak.
10. Sorrang = oszloprang.
11. Szorzat rangjának két felső becslése.

Euklideszi terek

12. A CBS-egyenlőtlenség.
13. Nem nulla vektorok ortogonális rendszere független.
14. Az egybevágósági transzformációk jellemzői.
15. Az adjungált jellemzése skaláris szorzattal.
16. Ha W A -invariáns, akkor W^\perp A^* -invariáns.
17. Normális transzformáció adjungáltjának sajátvektorai.
18. Normális transzformáció ONB-ben diagonalizálható.
19. A főtengeteltétel.
20. Ortonormált bázisban a kvadratikus alak négyzetösszeggé válik.
21. A tehetetlenségi tétel.

A felsorolt 21 bizonyítás szerepelhet a vizsga *harmadik* részében.