

Bsc algebra2 gyakorlat
Első gyakorlat — elvek és megoldások

1. LINEÁRIS FÜGGETLENSÉG

Emlékeztető: a tér pontjait olyan helyvektoroknak képzeljük, amelyek az origóból az adott pontba mutatnak. Meg lehet mutatni, hogy ha v_1, v_2, v_3 ilyen vektorok, akkor a végpontjaik akkor és csak akkor vannak egy origón átmenő síkban (másképp fogalmazva: ezek a vektorok akkor és csak akkor vannak egy síkban), ha léteznek olyan $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ valós számok, amelyek nem mindhárman egyenlők nullával, de $\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \alpha_3 v_3 = 0$. Ismételjük át ezzel kapcsolatban a **lineáris függetlenség** fogalmát az előadásjegyzetből.

Lineárisan függetlenek-e (külön-külön) az alábbi mátrixok oszlop-, illetve sorvektorai?

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 6 \\ 2 & 0 & 5 \\ 3 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 3 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix}$$

A függetlenség megállapításához felírunk ismeretlen, általános együtthatókkal egy lineáris kombinációt, és nullával tesszük egyenlővé. Ez egy lineáris egyenletrendszerre vezet. Az első mátrix oszlopai esetében ez a következő:

$$\alpha_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \alpha_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \alpha_3 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_3 \\ \alpha_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

(ismételjük át, hogyan adunk össze, és hogyan szorzunk skalárral oszlopvektorokat: *komponensenként*). Nyilván $\alpha_1 = \alpha_3 = \alpha_2 = 0$, így az első mátrix oszlopai lineárisan függetlenek.

A második mátrix esetében a kapott lineáris egyenletrendszer mátrixa, illetve a **Gauss-elimináció** végeredménye a következő:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 4 & 5 & 6 & 0 \\ 7 & 8 & 9 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} \textcircled{1} & 0 & -1 & 0 \\ 0 & \textcircled{1} & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

(vegyük észre, hogy a bal oldalon maga a mátrix szerepel). Vagyis α_3 szabad változó, hiszen az oszlopában nincs karika, a másik kettő kötött, és ezek kifejezhetők a szabad változóval: $\alpha_1 = \alpha_3$ és $\alpha_2 = -2\alpha_3$. Az α_3 tetszőlegesen megválasztható, ha pl. az értéke 1, akkor $\alpha_2 = -2$ és $\alpha_1 = 1$. Ez egy olyan megoldás, ahol nem mindegyik együttható nulla, és ezért a második mátrix oszlopai lineárisan összefüggenek.

Melyik pontja az a fenti számításnak, amikor már megállapíthattuk volna, hogy az oszlopok összefüggők? Ha nincs szabad változó, akkor az egyenletrendszernek egyértelmű a megoldása, és ez csak az azonosan nulla lehet, ezért ilyenkor a vektorok függetlenek. Ha viszont van szabad változó, akkor annak adhatunk nem nulla értéket is, ezért a vektorok összefüggők. Ezért **a vektorok pontosan akkor függetlenek, ha minden oszlopban van karika.**

Még hamarabb is észrevehettük volna, hogy a második mátrix három oszlopvektora összefüggő. A sorok ugyanis számtani sorozatok, és ezért a középső oszlop a két szélső oszlop átlaga, azaz $v_1 - 2v_2 + v_3 = 0$. (Ha egy feladat megoldására látunk algoritmust, akkor is *a számolás megkezdése előtt mindig érdemes kis időt azzal eltölteni, hogy meggondoljuk, nincs-e ügyesebb, rövidebb, esetleg számolásmentes megoldás.*)

A harmadik mátrix esetében a két szélső oszlopot vehetjük nulla együtthatóval, a középsőt 1 együtthatóval, ezért ezek összefüggenek. *Tanulság:* ha egy rendszerben szerepel a nullvektor, akkor az összefüggő.

A negyedik mátrix esetében a középső oszlopot vehetjük nulla együtthatóval, a két szélsőt pedig 1, illetve -1 együtthatóval, ezért ez a rendszer is összefüggő. *Tanulság:* ha a rendszerben van két egyenlő vektor, akkor a rendszer összefüggő. Sőt, akkor is, ha a rendszer egyik vektora egy másik vektor skalárszorosa.

Általában is, ha a rendszerben néhány vektorról látjuk, hogy összefüggő, akkor az egész rendszer az, hiszen a többi vektort nulla együtthatóval vehetjük.

A hatodik mátrixban bármely két oszlop egymás skalárszorosa, ezért itt az oszlopok összefüggenek. Az ötödik mátrix oszlopai függetlenek. Ez is látható számolásmentesen: bebizonyítjuk majd, hogy **egy négyzetes mátrix oszlopai akkor és csak akkor összefüggők, ha a determinánsa nulla**. Az ötödik mátrix felső háromszögmátrix, a determinánsa 1.

Nemcsak oszlopvektorokat tudunk összeadni és számmal szorozni, hanem például polinomat is. Ezért a lineáris függetlenség fogalma polinomokra is értelmezhető.

Lineárisan függetlenek-e (külön-külön) az alábbi polinomrendszerek?

$\{1, x, x^2\}$, $\{1 + x, 1 + x^2, x + x^2\}$, $\{x, 2x, x^2, x^3\}$, $\{1 + x, 1 + 2x, 1 + 3x\}$.

Mit jelent az, hogy $\alpha_1 \cdot 1 + \alpha_2 \cdot x + \alpha_3 \cdot x^2 = 0$? Ez két polinom egyenlősége, aminek az a feltétele, hogy a megfelelő együtthatók megegyezzenek. Ezért $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = 0$, tehát az első polinomrendszer független.

A második polinomrendszerrel az a kérdés, hogy az $\alpha_1(1+x) + \alpha_2(1+x^2) + \alpha_3(x+x^2) = 0$ összefüggés milyen $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ esetén teljesül. Úgy kapunk lineáris egyenletrendszert, hogy rendre felírjuk az $x^2, x, 1$ együtthatóját, azaz x hatványai szerint rendezzük a polinomot. Az eredmény: $\alpha_1 + \alpha_2 = \alpha_1 + \alpha_3 = \alpha_2 + \alpha_3 = 0$. Ennek az egyenletrendszernek is csak a triviális, csupa nulla megoldása van, ezért a második polinomrendszer is független.

A harmadik rendszer összefüggő, hiszen x és $2x$ egymás skalárszorosa. A negyedik rendszer is összefüggő, hiszen ez a három polinom számtani sorozatot alkot.

Lineárisan független-e \mathbb{R} fölött $1 + i, 2 + i, 4 + i$?

A **fölött** szó azt árulja el, honnan vesszük az együtthatókat. Ezért azt kell megvizsgálni, hogy mely $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ valós számokra teljesül, hogy $\alpha_1(1+i) + \alpha_2(2+i) + \alpha_3(4+i) = 0$. Két komplex szám akkor egyenlő, ha a valós és képzetes részük is egyenlő. Ezért két egyenletet kapunk: a valós részből $\alpha_1 + 2\alpha_2 + 4\alpha_3 = 0$, a képzetes részből pedig $\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = 0$. Ha az eliminációt elvégeznénk, akkor biztosan lenne olyan oszlop, ahol nincs karika, hiszen két sor van csak, és így legfeljebb két karika szerepelhet. Ezért általában is azt kapjuk, hogy **bármely három komplex szám összefügg \mathbb{R} fölött**.

Igazoljuk, hogy ha $\{v_1, v_2, v_3\}$ független, akkor $\{v_1 - 3v_2, v_2, v_3\}$ is független.

Ebben a feladatban az az újdonság, hogy immáron „általános” „vektorokról” van szó, amikről semmit nem tudunk, lehetnek polinomok, térvektorok, stb. Most is egy lineáris kombinációt írunk fel, és nullává tesszük: $\alpha_1(v_1 - 3v_2) + \alpha_2 v_2 + \alpha_3 v_3 = 0$. Ha itt elakadunk, akkor kérdezzük meg magunktól, hogyan használhatnánk ki azt a feltételt, hogy $\{v_1, v_2, v_3\}$ független? Ehhez v_1, v_2, v_3 egy lineáris kombinációjáról kellene tudnunk, hogy nullával egyenlő. Az előző egyenletet a v_j -k szerint rendezve ilyen kapunk: $\alpha_1 v_1 + (\alpha_1 - 3\alpha_2)v_2 + \alpha_3 v_3 = 0$. Itt tehát minden együttható nulla, ahonnan $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = 0$ adódik.

Hasonlóan igazolhatjuk általában is, hogy egy rendszer független mivolta nem változik meg akkor, ha az egyik vektorból kivonjuk egy másik vektor számszorosát. Ez hasonló ahhoz, hogy a determináns sem változik meg, ha egyik sorából kivonjuk egy másik sor számszorosát, és egy egyenletrendszer megoldásainak a halmaza sem változik meg, ha az egyik egyenletből kivonjuk egy másik egyenlet számszorosát.

Mikor lesz független két vektor?

A választ óvatosan kell megfogalmazni, mert az nem igaz, hogy pontosan akkor, ha egymás skalárszorosai. Ha ugyanis $v \neq 0$, akkor $\{0, v\}$ összefüggő, és a 0 tényleg skalárszorosa (nullaszorosa) v -nek, de v nem skalárszorosa a nullvektornak. A helyes válasz: akkor összefüggők, ha *valamelyik* a másiknak skalárszorosa. Valóban, ha $\alpha v + \beta w = 0$, de például $\alpha \neq 0$, akkor $v = (\beta/\alpha)w$. Érdekes végiggondolni, hogy ha egyik vektor sem nulla, akkor viszont már pontosan akkor összefüggők, ha mindegyik a másiknak skalárszorosa. Oszlopvektorok esetében ez ránézésre látszik abból, hogy a bennük lévő számok egyenesen arányosak-e. Három vektornál már semmi ilyen könnyítés nincs.

2. NEHEZEBB FELADATOK

1. Igazoljuk, hogy páronként különböző fokú polinomok rendszere mindig független.

Ha egy lineáris kombináció nulla, akkor vegyük a legmagasabb fokú polinom főtagját. Ilyen fokú tag az egész összegben csak egy van, és ezért a legmagasabb fokú polinom együtthatója a lineáris kombinációban nulla. Folytassuk az eljárást a második legmagasabb fokú polinommal.

2. Legyenek $a, b, c \in \mathbb{R}$ páronként különbözők. Igazoljuk, hogy $(x-a)(x-b)$, $(x-b)(x-c)$, $(x-a)(x-c)$ lineárisan függetlenek.

Tegyünk nullával egyenlővé egy általános lineáris kombinációt, és a kapott összefüggésben helyettesítsünk x helyére rendre a -t, b -t, c -t.

3. Független-e \mathbb{Q} fölött $\{\lg 2, \lg 3, \lg 6\}$, illetve $\{\lg 2, \lg 3, \lg 5\}$? Általánosítsunk!

Nyilván $\lg 2 + \lg 3 - \lg 6 = 0$. Ha viszont $r_2 \lg 2 + r_3 \lg 3 + r_5 \lg 5 = 0$, ahol $r_i = p_i/q_i$, akkor átrendezéssel $2^{p_2 q_3 q_5} 3^{p_3 q_2 q_5} 5^{p_5 q_2 q_3} = 1$. A számelmélet alaptételének egyértelműségi állítása miatt itt mindegyik kitevő nulla. Általában a prímek logaritmusai függetlenek \mathbb{Q} fölött.

4. (*) Előáll-e a $\sqrt{3}$ az 1 és $\sqrt{2}$ számok racionális együtthatós lineáris kombinációjaként? Lineárisan függetlenek-e 1, $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$ és $\sqrt{6}$ a racionális számok teste fölött? Általánosítsunk!

Ha $\sqrt{3} = a + b\sqrt{2}$, akkor emeljük négyzetre, és próbáljuk meg $\sqrt{2}$ -t kifejezni az egyenletből. Ha $a + b\sqrt{2} + c\sqrt{3} + d\sqrt{6} = 0$, akkor ezt írjuk $a + b\sqrt{2} + \sqrt{3}(c + d\sqrt{2})$ alakba, osszunk $c + d\sqrt{2}$ -vel és gyöktelenítsük a nevezőt.

5. (*) Tegyük fel, hogy egy vektortér a, b, c, d vektoraira $\{a, b, d\}$, $\{a, c, d\}$, $\{b, c, d\}$ mindegyike összefüggő, de $\{a, b, c\}$ független. Határozzuk meg d -t.

Mutassuk meg, hogy d kifejezhető a, b, c közül bármely kettő lineáris kombinációjaként. Ezeket egyenlővé téve használjuk fel, hogy $\{a, b, c\}$ független. Az eredmény $d = 0$.

6. Van-e három olyan vektor \mathbb{R}^2 -ben, melyek három darab kételemű részhalmaza közül rendre 1, 2, 3 független? És ha a vektorok egyike sem nulla?

Ha csak 1 kételemű független, akkor a kimaradó vektor nulla kell, hogy legyen.