

**Bsc algebra2 gyakorlat**  
*Harmadik gyakorlat — elvek és megoldások*

1. KOORDINÁTARENSZER, BÁZIS

*Emlékeztető:* Egy koordinátarendszer azt teszi lehetővé, hogy általános vektorok (pontok, polinomok) helyett oszlopvektorokkal számoljunk. A félév egyik fő célja az, hogy megtanuljunk, hogyan választható egy-egy feladathoz alkalmas koordinátarendszer.

A koordinátarendszer tengelyeit egy-egy vektorral adjuk meg, legyenek ezek  $b_1, \dots, b_n$ . (Egyelőre sem a távolság, sem a szög fogalmát nem értelmezzük.) Azt szeretnénk, hogy minden  $v$  vektor **egyértelműen felírható** legyen  $\lambda_1 b_1 + \dots + \lambda_n b_n$  alakban alkalmas skalárok segítségével. Az ilyen  $\mathbf{b} = (b_1, \dots, b_n)$  vektorrendszereket **bázisnak** nevezzük. Ekkor

$$[v]_{\mathbf{b}} = \begin{bmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{bmatrix}$$

a  $v$  **koordinátavektora** a  $\mathbf{b}$  bázisban (helyspórolás végett  $[\lambda_1, \dots, \lambda_n]^T$  alakban írhatjuk). A bázisvektorok sorrendje fontos, ha cserélgetjük őket, akkor a koordináták és cserélődnek.

Az egyértelműség akkor teljesül, ha  $b_1, \dots, b_n$  **független**, a felírhatóság pedig akkor, ha generálja az egész vektorteret, azaz **generátorrendszer**. Sok bázis van, de ezek mind ugyanannyi vektorból állnak, ez a vektortér **dimenziója**. Fontos, hogy a dimenziót intuitíven le tudjuk olvasni, mielőtt bázist kezdenének keresni. Ebben segítenek a következő példák.

Ha egy autópályán haladunk, és valaki telefonon megkérdezi, hogy hol járunk, akkor elég annyit mondani neki, hogy az M7-esen a 90-es kilométerkőnél. Ha egy hegységben bolyongunk, akkor már két számot kell megtelefonálni: a GPS-koordinátákat. Ha pedig helikopteren ülünk, akkor még a magasságot is. Vagyis az autópályán egy szám jelöli ki a helyzetünket, a föld felszínén két szám, a térben pedig három szám. Ezért az autópálya egydimenziós, a felszín pedig kétdimenziós. Vagyis ha a partnerünk is ismeri a vektorteret, amiben dolgozunk, akkor a dimenzió azt jelenti, hogy *hány számot kell megtelefonálni neki, hogy ki tudja találni azt a konkrét vektort, amire gondolunk*. Fontos hangsúlyozni, hogy ez csak intuíció, ha biztosak akarunk lenni a dimenzió értékében, akkor bázist kell keresni.

---

*Hány dimenziós a legfeljebb másodfokú, valós együtthatós polinomok vektortere  $\mathbb{R}$  fölött?*

Az  $f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2$  polinom esetében három számot érdemes megtelefonálni: az együtthatókat. Ezért a dimenzió várhatóan 3 lesz. Bázist úgy kereshetünk, hogy a polinomot *olyan lineáris kombinációra bontjuk, ahol az együtthatók a megtelefonálandó számok*. Az  $f$  polinom már eleve így van felírva, ezért várhatóan  $1, x, x^2$  lesz bázis. Ez tényleg bázis, hiszen minden legfeljebb másodfokú polinom egyértelműen írható ezek lineáris kombinációjaként.

---

*Hány dimenziós  $\mathbb{R}^{2 \times 2}$  az  $\mathbb{R}$  fölött?*

A mátrix négy elemét érdemes megtelefonálni. Ha bázist keresünk, akkor egy általános mátrixot kell olyan lineáris kombinációra bontani, ahol az együtthatók a mátrix elemei.

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = a \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + b \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + c \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} + d \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Ez a négy mátrix könnyen láthatóan bázist alkot, a dimenzió 4.

---

Hány dimenziós alteret alkotnak  $\mathbb{R}^{2 \times 2}$  szimmetrikus mátrixai?

$$\begin{bmatrix} a & b \\ b & d \end{bmatrix} = a \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + b \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} + d \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \text{azaz } 3.$$

Hány dimenziós a komplex számok vektortere  $\mathbb{R}$  fölött?

A „fölött” szó arra utal, hogy valós számokat telefonálhatunk, a  $c + di$  esetében a  $c$  és  $d$  számokat érdemes. Nyilván  $1$  és  $i$  bázist alkot, a dimenzió  $2$ .

## 2. BÁZIS KERESÉSE

Olyan tétéleket ismételünk át, amelyek lerövidíthetik annak ellenőrzését, hogy egy vektorrendszer bázis-e. Különösen az lehet számolós, hogy generátorrendszerrel van-e szó.

Bázist alkot-e a síkon  $(1, 1)$  és  $(1, 2)$ ?

A két vektor független, hiszen nem egymás skalárszorosai. Azt kell ellenőrizni, hogy minden  $(a, b)$  előáll-e  $\lambda_1(1, 1) + \lambda_2(1, 2)$  alakban. A kapott egyenletrendszer  $\lambda_1 + \lambda_2 = a$ ,  $\lambda_1 + 2\lambda_2 = b$ . Ez lineáris, a Gauss-elimináció is működik, de a jobb oldalon paraméterek vannak. Van megoldás,  $\lambda_1 = 2a - b$  és  $\lambda_2 = b - a$ , ezért  $(1, 1)$  és  $(1, 2)$  bázis.

- (1) **Egy  $n$ -dimenziós vektortérben minden  $n$  elemű független rendszer bázis.**
- (2) **Egy  $n$ -dimenziós vektortérben minden  $n$  elemű generátorrendszer bázis.**
- (3) **Egy  $n$ -dimenziós vektortér minden valódi altere legfeljebb  $n - 1$ -dimenziós.**
- (4) **Ha egy vektortérben van  $k$  független vektor, akkor a dimenzió legalább  $k$ .**
- (5) **Ha egy vektortér generálható  $k$  vektorral, akkor a dimenzió legfeljebb  $k$ .**

A sík kétdimenziós, hiszen  $(1, 0)$ ,  $(0, 1)$  bázis. Az  $(1, 1)$  és  $(1, 2)$  függetlenek, és két darab, tehát ez is bázis a fenti (1) állítás miatt. A paraméteres Gauss-eliminációra nincs szükség.

Hány dimenziós alteret alkotnak  $\mathbb{R}$  fölött azok a legfeljebb harmadfokú, valós együtthatós polinomok, melyeknek gyöke az  $1$ ?

Az  $f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3$  polinom négy együtthatója közül most nem kell mind a négyet megtelefonálni, hiszen a partnerünk is tudja, hogy  $f(1) = a_0 + a_1 + a_2 + a_3$  értéke nulla, ezért ha három együtthatót ismer, akkor a negyediket ki tudja számolni. Ezért azt tippelhetjük, hogy a dimenzió  $3$ . Tehát három polinomot kell keresni, amik bázist alkotnak, **mindegyiket ebből az altérből**, azaz gyökük kell, hogy legyen az  $1$ .

Az I/4. feladat szerint különböző fokú polinomok rendszere független. Ezért például  $x - 1$ ,  $x(x - 1)$ ,  $x^2(x - 1)$  függetlenek. Két megoldást is adunk arra, hogy bázist alkotnak.

Az  $f$  polinom  $(x - 1)(bx^2 + cx + d)$  alakban írható, hiszen a gyöktényező kiemelhető, és ezért  $x - 1$ ,  $x(x - 1)$ ,  $x^2(x - 1)$  egy lineáris kombinációja. Ezért ez a három polinom generátorrendszert alkot. Ez a megoldás csak erre a konkrét bázisra működik.

A második megoldásban észrevesszük, hogy a vektorterünk dimenziója legalább  $3$ , hiszen van három független vektor. Továbbá valódi altere a legfeljebb harmadfokú polinomok négydimenziós vektortérének, hiszen például az  $x$  polinom nincs benne. Ezért dimenziója kisebb, mint  $4$ . Így csak  $3$  lehet. De akkor a kiválasztott háromelemű független rendszer bázis. (Menet közben intenzíven használtuk a fenti öt tételt.)

Ha már tudjuk, hogy a dimenzió  $3$ , akkor bármely három független polinom bázist alkot. Például  $x - 1$ ,  $(x - 1)^2$ ,  $(x - 1)^3$  is bázis. Érdemes bebizonyítani ezzel a technikával, hogy minden polinom felírható  $(x - 1)$  polinomjaként is (vö. iterált Horner, Taylor-polinom).

Hány dimenziós  $U$  alteret alkotnak  $\mathbb{R}$  fölött azok a legfeljebb negyedfokú, valós együtthatós polinomok, melyeknek gyöke az 1 és a 2 is?

Itt  $(x-1)(x-2)$ ,  $(x-1)^2(x-2)$ ,  $(x-1)^3(x-2)$  függetlenek, hiszen különböző a fokuk, és így a dimenzió legalább 3. Ez is valódi altér, ezért a dimenzió kisebb, mint 5 (ami a legfeljebb negyedfokú polinomok  $V$  terének dimenziója.) Hogyan döntsük el, hogy 3 vagy 4-e a helyes?

Iktassunk közbe egy  $W$  alteret, legyen ez azoknak a legfeljebb negyedfokú polinomoknak a halmaza, melyeknek gyöke az 1. A  $W$ -ben benne van  $x-1$ , aminek 2 nem gyöke, ezért  $U$  valódi altere  $W$ -nek. Az  $x$  polinom mutatja, hogy  $W$  valódi altere  $V$ -nek. Ezért kettőt kell legalább lelépnünk 5-ről, azaz a helyes válasz a 3.

### 3. TOVÁBBI FELADATOK

1. Melyik bázis  $\mathbb{R}^3$ -ben? (a)  $\{(1, 2, 3), (1, 2, 4), (1, 2, 5)\}$ ; (b)  $\{(1, 2, 3), (0, 1, 0), (3, 2, 1)\}$ ; (c)  $\{(1, 1, 1), (1, 2, 4), (1, 3, 9)\}$ ; (d)  $\{(1, 2, 3), (4, 5, 6), (7, 8, 9)\}$ . Mik  $(1, 0, 0)$  koordinátái?

A fenti (1) tétel miatt elég a függetlenséget ellenőrizni, amit például úgy tehetünk meg, hogy a vektorokat egy mátrix oszlopaiba írjuk, és megnézzük, hogy ennek determinánsa nulla-e. Az (a) eset azért érdekes, mert semelyik két vektor sem összefüggő, de lesz két sor, ami egymás skalárszorosa. A (b) determinánst fejtsük ki aszerint az oszlop szerint, amelyben két nulla is van. A (c) esetben Vandermonde-determinánsról van szó. Az  $(1, 0, 0)$  koordinátáit lineáris egyenletrendszer megoldásával kapjuk.

2. Határozzuk meg az alábbi vektorterek dimenzióját, és adjunk meg egy-egy bázist.

(1) A legfeljebb  $n$ -edfokú  $\mathbb{C}$  feletti polinomok  $\mathbb{R}$  felett. Mi általában az összefüggés egy vektortér  $\mathbb{R}$  és  $\mathbb{C}$  feletti dimenziója között?

(2) Azon legfeljebb  $n$ -edfokú  $\mathbb{Q}$  feletti polinomok  $\mathbb{Q}$  felett, melyeknek  $\sqrt{2}$  gyöke.

(3) Az  $\mathbb{R}^n$  azon elemei  $\mathbb{R}$  felett, ahol az első koordináta is, a koordináták összege is 0.

Az (1) esetben minden együtthatóhoz két valós számot kell megtelefonálni. Bázis például  $1, i, x, ix, \dots, x^n, ix^n$ . A valós fölötti dimenzió kétszerese a komplex fölöttinek.

A (2) nehezebb, a dimenzió  $n-1$ , bázis például  $(x^2-2)x^i$ , ahol  $0 \leq i \leq n-2$ . A kulcs annak észrevétele, hogy ha egy racionális együtthatós polinomnak gyöke a  $\sqrt{2}$ , akkor gyöke a  $-\sqrt{2}$  is. (Ha  $\sqrt{2}$ -t behelyettesítünk, akkor válasszuk szét a páros és páratlan fokú tagokat.) Ez hasonló ahhoz, hogy ha egy valós együtthatós polinomnak gyöke az  $i$ , akkor a  $-i$  is.

A (3) esetén is kettőt kell lelépnünk az  $n$ -dimenziós  $\mathbb{R}^n$  vektortérből, az eredmény  $n-2$ . Az  $n-2$  darab független vektor megadása történhet úgy, hogy az  $x^2-x, x^3-x, \dots, x^n-x$  független polinomrendszer koordinátáit vesszük a szokásos bázisban.

3. Hány  $n-1$ -dimenziós altere van egy  $\mathbb{R}$  fölötti  $n$ -dimenziós vektortérnek  $n \geq 2$  esetén?

Végtelen sok. Legyen  $b_1, \dots, b_n$  bázis, és mutassuk meg, hogy a  $\langle b_1, \dots, b_{n-2}, b_{n-1} + \lambda b_n \rangle$  alterek páronként különbözők, és  $n-1$ -dimenziósak. Ez a feladat hasonló ahhoz, ahogy végtelen sok alteret konstruáltunk minden valós fölötti kétdimenziós altérben.

4. (\*) Egy  $\mathbb{R}$  fölötti vektortérben egy 100 elemű vektorrendszer elemei közül bármely 21 darab összefüggő. Legalább hány olyan vektor van a rendszerben, ami függ a többitől?

81. Egy  $F$  maximális független részrendszernek legfeljebb 20 eleme lehet, és minden más vektor függ tőle. Ha  $0 \neq v \notin F$ , akkor  $v$ -nek  $F$ -fel való felírásából  $F$  egyik eleme kifejezhető. A 81 megvalósítható: legyen  $b_1, \dots, b_{20}$  bázis és a többi vektor  $b_{20}$ -nak skalárszorosa.