

**Bsc algebra2 gyakorlat**  
*Hetedik feladatsor (8. prezentáció)*

1. Legyen  $A = ((a_{ij})) \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$  és  $u^T = (x_1, x_2, x_3)$ . Számítsuk ki az  $u^T A u$  szorzatot.
2. Írjuk föl az alábbi kvadratikus alakok szimmetrikus mátrixát, hozzuk őket négyzetösszeg alakra, és határozzuk meg a karakterüket:  $x^2 + y^2$ ,  $x^2 - y^2$ ,  $xy$ ,  $x^2 - 2xy + y^2$ ,  $x^2 - xy + y^2$ ,  $x^2 - 3xy + y^2$ ,  $x^2 + xy$ ,  $-x^2 + 10xy - y^2 - z^2$ ,  $xy + yz$ ,  $xy + yz + xz$ ,  $-x^2 + 2xy + 2xz$ .
3. Négyzetösszeg alakú-e az  $x^2 + y^2 + (x + y)^2 = (\sqrt{3}x)^2 + (\sqrt{3}y)^2 - (x - y)^2$  kvadratikus alak? Mi a karaktere (és az értékkészlete)?
4. Legyen  $A = ((a_{ij})) \in \mathbb{C}^{3 \times 3}$ ,  $u^T = (x_1, x_2, x_3)$  és  $v^T = (y_1, y_2, y_3)$ . Számítsuk ki az  $u^* A v$  mátrix-szorzatot, továbbá a  $\langle A^* u, v \rangle$  és  $\langle u, A v \rangle$  skaláris szorzatokat.
5. (\*\*) Tekintsük a  $-3x\bar{x} + 4ix\bar{y} - 4i\bar{x}y + 3y\bar{y} - z\bar{z}$  kvadratikus alakot  $\mathbb{C}$  felett. Írjuk fel a mátrixát, transzformáljuk négyzetösszeggé, végül határozzuk meg a karakterét.
6. (\*\*) Igazoljuk, hogy minden komplex bilineáris függvény egyértelműen írható  $B_1 + iB_2$  alakban, ahol  $B_1$  és  $B_2$  Hermite-féle.
7. (\*\*) Legyen  $Q$  kvadratikus alak egy valós feletti vektortéren,  $e_1, \dots, e_n$  egy  $Q$ -ortogonális bázis, és  $U = \langle e_i \mid Q(e_i) > 0 \rangle$ ,  $V = \langle e_i \mid Q(e_i) \geq 0 \rangle$ ,  $W = \langle e_i \mid Q(e_i) = 0 \rangle$ . E három altér közül melyek függetlenek az  $e_1, \dots, e_n$  bázistól?
8. (\*\*) Mely valós szimmetrikus bilineáris függvényekre eleme minden nem nulla vektor egy ortogonális bázisnak?
9. (\*\*) Legyen  $B$  nem elfajuló bilineáris függvény egy  $V$  euklideszi téren. (Ez azt jelenti, hogy minden  $v \neq 0$ -hoz van  $w$ , hogy  $B(v, w) \neq 0$ , és olyan  $u$  is, hogy  $B(u, v) \neq 0$ .) Igaz-e, hogy tetszőleges  $v_1, \dots, v_n$  vektorok akkor és csak akkor lineárisan függetlenek, ha a  $|((B(v_i, v_j)))|$  úgynevezett Gram-determináns nullától különböző?
10. (\*\*) Legyen  $B$  szimmetrikus bilineáris függvény egy (véges dimenziós),  $K$  test fölötti  $V$  vektortéren,  $U \leq V$  pedig egy tetszőleges altér. Igazoljuk az alábbiakat:
  - (1)  $\dim U + \dim U^\perp \geq \dim V$  mindig, és ha  $B$  nem elfajuló, akkor egyenlőség áll fenn.
  - (2)  $U \subseteq (U^\perp)^\perp$  és ha  $B$  nem elfajuló, akkor egyenlőség van.
11. (\*\*) Legyen  $B$  egy bilineáris függvény. Bizonyítsuk be, hogy  $u \perp_B v$  akkor és csak akkor szimmetrikus reláció, ha  $B$  szimmetrikus vagy alternáló. Mi a helyzet  $\mathbb{C}$  fölött?
12. (\*\*) A  $P_n(x)$  Legendre-polinomok a következőképpen vannak definiálva:

$$P_0(x) := 1, \quad P_n(x) := \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n ((x^2 - 1)^n)}{dx^n} \quad (n \geq 1).$$

Igazoljuk, hogy  $\mathbb{R}[x]$ -ben ezek ortogonális rendszert alkotnak az  $(f, g) := \int_{-1}^1 f(t)g(t)dt$  skaláris szorzatra. Bizonyítsuk be, hogy  $P_n(1) = 1$  minden  $n$ -re, továbbá hogy  $P_n(x)$ -nek pontosan  $n$  különböző valós gyöke van, amelyek mind a  $(-1, 1)$  nyílt intervallumba esnek.

13. (\*\*) Keressünk olyan skaláris szorzást az  $\mathbb{R}[x]$  vektortéren, melyre a  $T_n(\cos \alpha) = \cos n\alpha$  képlettel definiált Csebisev-polinomok ortogonális rendszert alkotnak.